

Rapport fra lrsk for Oslo og Akershus for 2001

Per Gylseth

Dette er den 18. rapporten fra Lokal rapport- og sjeldenhetskomité for Oslo og Akershus. Den forrige sto i Toppdykker'n 2/2002. Rapporten bygger på samme lest som de seneste rapportene.

LRSK Oslo og Akershus finner du på internettsiden "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/lrsk.html>".

Rapporten er svært omfattende. E-post gruppa for fugleinteresserte i Oslo og Akershus (Oafugl), og internettsiden med oppdaterte nyheter "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/siste.html>" har bidratt til dette. Nytt av året er internettsiden "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/nattsanger.html>", med oppdatert oversikt over "nattsangere". Denne siden har nok både bidratt til økt rapportering og økt feltinnsats.

Observasjoner fra 1997-2001 skal rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 3/1997 og "http://www.naturnett.org/nofoa/html/gml_lrsk.html", tidligere funn i henhold til lister som gjaldt da funnet ble gjort. Fra og med 1.1.2002 skal observasjoner rapporteres i henhold til liste publisert i Toppdykker'n 4/2002 og "<http://www.naturnett.org/nofoa/html/LRSK2002.html>". Funn som er vurdert av Norsk sjeldenhetskomité for fugler (NSKF) følger listen på internettsiden "<http://www.nskf.org>".

LRSK har siden forrige rapport bestått av Trond Aspelund, Enebakk; Per Gylseth (sekretær), Bærum; Magne Klann, Vestby og Geir Sverre Andersen, Bærum. Nye funn skal sendes til Per Gylseth, Stasjonsveien 69, 1365 Blommenholm eller som e-post til lrskoa@naturnett.org.

Det er godkjent to nye former for vårt område i perioden: mellomskarv (underart av storskarv) *Phalacrocorax carbo sinensis* og ringnebbmåke *Larus delawarensis*, se rapporten for detaljer. Samtidig fikk vi vårt andre funn gulbrynsanger. Horndykker ble funnet hekkende for første gang siden 1984. Også trelerke ble funnet hekkende. Forrige hekkefunn var i 1952.

De aller fleste "nattsangerartene" hadde ett godt år i 2001. Det var også en solid opptreden av sjøfugl, særlig ultimo oktober og i november. Dette ga blant annet tre funn av polarlomvi. Også for bemerkelsesverdig mange andre arter var året en toppsesong.

Tegnbruken i rapporten er som følger: For arter der alle funn skal rapporteres er det i parentes etter det vitenskapelige navnet først gitt antall funn til og med 2000, deretter antall funn i 2001, altså:

Norsk navn *Vitenskapelig navn* (N - n).

For arter der alle funn er listet, men der vi ikke lenger har oversikt over hvor mange funn som er gjort totalt, står det *ingenting* etter det vitenskapelige navnet.

For arter der bare utvalgte funn er vist er det angitt hva slags funn som er listet, f.eks.:

Norsk navn *Vitenskapelig navn* Hekkefunn og vinterfunn

For observasjoner hentet fra inernett er det ofte uklart hvem som har sett hvilke fugler. Det vil derfor forekomme en del feil observatørnavn.

Omkring 145 arter er omtalt i rapporten, og omkring 165 ulike observatører har vært med som rapportører eller medobservatører. En hjertelig takk rettes til alle som har bidratt med funn, og som slik er med på å øke kunnskapen om fuglelivet i Oslo og Akershus og å styrke grunnlaget for et faktabasert naturvernarbeid.

Takk til Geir Sverre Andersen for kommentarer til masuskriptet.

Smålom *Gavia stellata* Vinterfunn, høyt antall

2000: 1 ex 13.2 Drøbaksund, Frogn (JNY, FJA).

2001: 1 ex 24.3 Fornebo, Bærum (FNB); 5 ex 31.10 Krokstrand, Vestby (FJA).

- Vårtrekket starter normalt ultimo april, så ett funn ultimo mars kan like gjerne kategoriseres som ett vinterfunn. Med februar og nærsfunnene over er nå arten sett i alle årets måneder. 5 ex er nytt høstmaksimum, tidligere er kun enkeltindivider sett.

Islom *Gavia immer* (5-1)

2001: 1 2k 30.5-3.9 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA, JNY, PGY, PTA).

- En bemerkelsesverdig observasjon av en oversomrende ung islom. For første gang har en islom blitt registrert på mer enn en dato.



Islom
Kragtorpvika,
Hemnessjøen.
Foto Per Tangen ©

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* (84-6)

2001: 1 M 1.5-1.9 Stordammen, Asker (PGY); 1 ex 13.5 (GSA), par med gjentatte hekkforsøk 22.5-13.9 (PGY, FGG, ALA, SST, ROL, MBR, JBA) Syverstaddammen, Asker; 1 ex 3.11 Glitredammen, Bærum (KEI); 2 ex 25.4 (HBI), 1 ex 10.5 (GOH, HRE), 1 ex 6.10 (BBR), 1 ex 13.10 (ABR) Østensjøvann, Oslo; 1 ex 28.10 Autenvann, Aurskog-Høland (SDA).

- Sommerfunn fra to lokaliteter. Dessverre var hekkforsøkene mislykkede i Syverstaddammen. Trolig delvis på grunn av menneskelig forstyrrelse. Tross et brukbart år, mangler vinterfunn.

Toppdykker *Podiceps cristatus* Vinterfunn, ny hekkelokalitet

2000: 1 ex 9.12 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (SDA).

2001: 2 ad 1 pull 30.6 sørvestenden av Hurdalsjøen, Eidsvoll (SDA).

- Ved Hemnessjøen ser det ut til at de siste toppdykkerne drøyer avreisen til isen legger seg.

Horndykker *Podiceps auritus*

2001: 1 ex 29.4 (PGY, TEB, NOF), 1 1k 8-14.8 (MBR, JBA, PGY, GSA, THE), 1 1k 12-15.9 (PGY, GHA) Fornebo, Bærum; 2 ex 12.5 Engervann, Bærum (PGY, GHA); 1 ex 1.5 Langøyene, Nesodden (AGU); 1 ex 7.5 (KKN), 1 ex 16.9-14.10 (BBR, TST, ØHA, HBI) bestemt til 1k 23.9 (FGU) Østensjøvann, Oslo; 1 1k 24.8 Årnestangen, Rælingen (SDA); 2 ex 29.4 (ØHA, TST), 1 ex 11.5 (ØHA), 1 1k 11.8 (ØHA, JNY) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 1k 18.8 Srukkelisjøen, Hurdal (SDA); 1 ad 23.6 (PGY, GSA), 1 ad og 2 pull 4.7 (PGY), 2 ex 3.8 (JNY), 2 1k 5.8 (PGY) Ljøgodttjern, Ullensaker.



Horndykker Fornebo. Foto Morten Brandt ©

- Nok et godt år for arten. Hele 5 høstfunn er bemerkelsesverdig. Horndykker ble i 2001 funnet hekkende. Forrige sikre hekkfunn var ved Hellesjøvann, Aurskog-Høland i 1984.

Havhest *Fulmarus glacialis* (163-3)

2001: 1 ex 7.6 Huk, Oslo (ØMO); 1 ex 13.7 Halden brygge, Bærum (GHA); 1 ex 29.7 Krokstrand, Vestby (MKL).

- En art som kan dukke opp når som helst. Funnet fra Oslo er vårt første juni funn. Nå mangler arten kun i august.

Havsule *Morus bassanus* (27-1)

2001: 2 ex 2.10 Hulvik, Vestby (PTA).

- Ny maksimumsnotering for vårt område. De fleste havsuler blir hos oss sett i oktober og november.

Storskarv *Phalacrocorax carbo* Innlandsfunn, vinterfunn

1998: 1 ex 15.5 Storsand, Fet (TAS, JAS).

1999: 2 ex 26.4, 1 ex 24.7 Årnestangen, Rælingen (TAS mfl.).

2000: 1 ex 15.8, 2 ex 4.9, 1 ex 16.9 Mjær, Enebakk (TAS); 4 ex 10.9, 3 ex 25.10, 1 ex 15.11 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2001: 1 ex 1.5, 1 ex 9.5, 3 ex 11.5, 8 ex 14.5, 1 ex 17.5, 1 ex 30.5, 1 ex 6.6, 1 ex 16.6, 1 ex 12.8, 4 ex 19.8, 7 ex 29.5, 1 ex 30.9, 2 ex 13.10, 1 ex 17.10 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA, JNY, SDA, PGY, TST, HBI, VBJ, EIG); 1 ex 5.8, 2 ex 9.8, 2 ex 12.8, 2 ex 30.8, 1 ex 2.9, 1 ex 29.9, 1 ex 13.10, 4 ex 28.10 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (MBR, JBA, JNY, PGY, PTA, SDA, ØHA, TST, TAS, KTR); 1 ex 16.4, 1 ex 9.9 (KEI), 1 rastende og 11 på trekk 5.10 (JLA) Nestangen, Nes; 1 ex 30.6 Andelva ved E6, Eidsvoll (SDA); 1 ex mot nord 20.5 Enebakk kirke (TAS); 1 ex 15.4, 1 ex 21.4, 4 ex 30.4, 2 ex 3.5, 2 ex 9.5, 4 ex 13.5, 3 ex 14.5, 5 ex 19.5, 1 ex 21.5, 1 ex 27.5, 1 ex 21.7, 1 ex 24.7, 4 ex 27-28.7, 3 ex 1.8, 4 ex 2.8, 7 ex 4.8, 30 ex 5.8, 3 ex 6.8, 6 ex 7.8, 5 ex 9.8, 5 ex 15.8, 7 ex 18.8, 5 ex 24.8, 5 ex 27.8, 11 ex 2.9, 9 ex 3.9, 3 ex 9.9, 7 ex 22-23.9, 1 ex 17.10 Nordre Øyeren (JNY, KEI, ØHA, TSÆ, HRE, KJO, GHA, ROL, GUH, ØSY, JPL, TAS, HBI, SAO, GOH, TRU, KBS, TST, FRH, GKL, KTR, JØD, YKV, TØD); 1 ex 12.5 Østensjøvann, Oslo (BBR, KKN, HBI, FGU); 1 ex 14.4, 1 ex 12.5, 2 ex 29.6, 2 ex 22.7, 10 ex 25.8, 8 ex 26.8, 8 ex 2.11, 6 ex 3.11 Engervann, Bærum (PGY, GHA, AHQ, KEI); 1 ex flere uker mai-juni Bogstadvann, Bærum (TKÅ); 1 ex 28.8 Burudvann, Bærum (AHQ); 2 ex 23.9 Stovivann, Bærum (GHA); 24 ad på trekk 6.10, 2 ex 12.10 Årungen, Ås (FJA); 10 ex 1.1, 5 ex 7.1, 5 ex 27.1, 3 ex 10.2, 18 ex 18.2 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, ØSY, AGU, THE); 2 ex 7.1 Lysaker, Bærum (AGU, PGY); 3 ex 28.1 Gressholmen, Oslo (JNY, PGY).

- Antall storskarv i innlandet øker. 24.7 og 1.8 ble det observert storskarv med fargering i Øyeren. Ringen kunne ikke avleses i noen av tilfellene, men det dreier seg høyst sannsynlig om en fugl ringmerket i Danmark. Dette sammen med funnmønster ellers gjør det klart at underarten mellomskarv *P.c.sinensis* forekommer hos oss. Derimot vil vi ikke uten videre bestemme enkeltindivider til underart. Mellomskarven har økt kraftig i Sverige og Danmark de senere årene.

Gråhegre *Ardea cinerea* Hekkefunn

1999: 6-7 par hekket i Enebakk; 22+ par hekket i Fet (TAS).

2000: 7 par hekket i Enebakk (TAS).

2001: 2 reir 21.4 nordenden av Bjørkelangsjøen, Aurskog-Høland (SDA, KEI, NOF); 14 hekkende par 9.6 nord for Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA).

Dvergsvane *Cygnus columbianus* (37-2)

2000: 2 ad og 3 1k 5.11 og 11.11 Tøyen-Løren Aurskog-Høland; 2 ad og 2 1k 3.12 Bergsjø, Aurskog-Høland (SDA).

Sangsvane *Cygnus cygnus* Sommerfunn

2001: 2 ex 8.6 Fautøya, Rælingen (TAS, YKV); 1 ex 16.7 Årnestangen, Rælingen (HBI); 2 ad og 6 pull fra 3.6 (THE, OLU, OOL mfl.), 2 ad og 4 juv frem til 30.8 (PTA mfl.) Hellesjøvann, Aurskog-Høland.

- Hekkebestanden av sangsvane i Oslo og Akershus er ett par.

Sædgås *Anser fabalis* (62-4)

2000: 4 ex 30.9, 1 ex 5-11.11 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (SDA).

2001: 2 ex 7-15.4 (SDA), 3 ex 21.4 (SDA, KEI) Haneborg, Aurskog-Høland; 1 ad 29.8 Årnestangen, Rælingen (OSK); 1 ex 19.10 på trekk i kortnebbgåsflokk Fornebo, Bærum (ROL).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

1999: 1 ex 16.10 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2000: 265 ex 15.10 Nordre Øyeren (TAS, JØD).

2001: 70+ ex pt 9.5 Årungen, Ås; 20 ex pt 5.10 Østensjøvann, Ås; 300+ ex pt Eldor, Ås (FJA); 150 ex pt 18.4 (BBR), 300 ex pt 28.4 (AGU) Kolsås, Bærum; 150 ex pt 19.4 Grav, Bærum (MBE); 100 ex pt 19.4 (GSA), 120 ex pt 20.4 (RAN), 204 ex pt 21.4, 73 ex pt 22.4 (TLY, GSA), 50 ex pt 28.4 (PGY), 100 ex pt 29.4 (PGY, TEB, NOF), 37 ex 6.5 (AGU, GSA), 300 ex 9.5, 100 ex 24.9 (GSA), 125 ex

19.10 (ROL, OSK, PGY), 31 ex 27.10 (THE, GSA, SDA, PGY mfl.) Fornebo, Bærum; 100++ ex pt 3.5 Åsterud, Bærum (TEB); 100 ex pt 19.4 Økern, Oslo (HAK); 200 ex pt 3.5 Maridalen, Oslo (JNY); 750 ex pt 3.5 Sørkedalen, Oslo (TST); 1 ex 13.5 Østensjøvann, Oslo 13.5 (BBR, FGU, MBE, ABR); 1 ex 19.5 (GHA, TAS, JØD), 30 ex 23.9 (PST, OSK, CSU), 10 ex 29.9 (TST, ØHA), 70 ex 10.10, 114 ex 12.10 (ROL), 50 ex 13.10 (GHA), 6 ex 17.10 (TAS) Årnestangen, Rælingen; 3 ex 18.11 Rælingen kirke, Rælingen (THE); 1 ex 15.4 (SDA), 1 ex 21.4 (SDA, KEI, NOF) Haneborg, Aurskog-Høland; 3 ex 21.4 (SDA, KEI, NOF), 12 ex 29.9 (ØHA, TST, SDA) Kragtorpvika, Aurskog-Høland; 16 ex 10.5 Korgvika, Aurskog-Høland (ØHA); 14 ex 31.5 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (PTA); 107 ex 13.10 Kollerudvika, Aurskog-Høland (SDA); 100 ex pt 25.9 Eie, Nes (KEI).

- Dette er siste året alle kortnebbgåsobservasjonene blir listet opp. Fra 2002 skal bare funn fra desember til mars rapporteres.

Grågås *Anser anser* Ny hekkelokalitet

2001: 4 ad og 10 pull 16.6 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA).

Grågås x kanadagås *Anser anser x Branta canadensis*

2001: 2 ex 25.4-19.5 (HBI, JRG, ROL), par (grågås og kanadagås) med 3 pull 21.6, 1 ad 21.6 (LEJ, FFA), 2 ex 4.7, 1 ex 10.10 (HBI), 3 ex 24.12 (PGY) Østensjøvann, Oslo.

Stripegås *Anser indicus* (10-1)

2001: 1 ex 22-23.9 Øvredammen, Frogn (UTB); 1 ad 26.9 Årungen, Ås (FJA, LTP).

- Første funn siden 1997. Stripegås plasseres nå normalt i kategori E (funn av arter som regnes som rømlinger). Også fasan plasseres merkelig nok i denne kategorien, selv om arten har vært i vårt område siden første utsetting i 1875. Tidligere ble begge arter plassert i kategori C (Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger).

Snøgås *Anser caerulescens*

2001: 1 ex 30.4 Fornebo, Bærum (PGY, TEB, MBE, GOH); 1 ex 3.5 Langøyene, Nesodden (AGU); 1-4 ex 21.4-30.7 (4 ex 21.6, 4.7, 30.7) Østensjøvann, Oslo (JRG, HBI, KKN, JLA mfl.); 3 ex Valle Hovin, Oslo 17.8 (CST).

- Snøgås plasseres nå normalt i kategori D (Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp), men Oslofjordbestanden vil måtte plasseres i kategori E (funn av arter som regnes som rømlinger).

Hvitkinngås *Branta leucopsis* Vinterfunn, hekkefunn, høyt antall

2001: 6 ad og 4 pull 18.7 Fornebo, Bærum (TEB, PGY); 2 ex 6.1-27.2 (GSA, GOH, ATH, SDA, GHA, TST, ØHA mfl.), 10 1k 19.7 (HBI), 3 ex 4.12, 4 ex 7.12, 5 ex 16.12, 6 ex 24.12, 3 ex 30.12 (KEV, NCL, PGY mfl.) Østensjøvann, Oslo; 521 ex 22-23.9 Nordre Øyeren (TSÆ); 4 ex 16.6 Hemnessjøen, Aurskog-Høland (ØHA).

- Ingen opptelling av hekkende par dette året. 521 ex er det høyeste antallet som er notert hos oss.

Ringgås *Branta bernicla* (31-2)

2000: 1 ex ua. B.b.bernicla 5-11.11 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (SDA).

2001: 2 ad ua. B.b.bernicla og ua. B.b.hrota 27.5 Sandøya, Fet (ØHA).

Gravand *Tadorna tadorna* Hekking innlandet

2001: Par med 9 pull 16.6 Sandøya, Fet (ØHA); par med 2 pull 16.7 Årnestangen, Rælingen (HBI).

- Andre og tredje innlandshekkefunn. Første var på Årnestangen i 1995. Arten hekker riktignok også i Engervann, Bærum. Men Engervann ligger i brakkvannsonen.

Brunnakke *Anas penelope* Vinterfunn, høyt antall

2001: 1363 ex 30.4 Nordre Øyeren (KEI); 1 ex 4.12 (NCL), 1 1k M 7.12 (ROL), 1 ex 16.12 (GEF) Østensjøvann, Oslo; 1 ex 16.12 Akerselva, Oslo (JRG).

Snadderand *Anas strepera* (39-20)

1998: 1 ex 4.10 Merkja, Fet; 1 ex 4.10 Dynovika, Skedsmo (TAS, JØD).

1999: 1 M 17.4 Dynovika, Skedsmo (TAS, YKV, JØD).

2000: 1 ex 9.9 Dynovika, Skedsmo (TAS, YKV, JØD).

2001: 1 ex 22.8 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 par 5.5 Fornebo, Bærum (PGY, GSA); 1 par 12-14.5 (BBR, FGU, JEB, KKN, MBE, SRI, HBI, FGU, ABR), 1 M 25.9-28.10 (BBR, HBI, ØTR, JNY), 2 ex 5.10 (TJO) Østensjøvann, Oslo; 1 par 28.4 Monsrudvika, Fet (ØHA, NOF, GHA), 1 par 30.4 Rossholmen, Fet (JNY, KEI, ØHA); 1 M 9.9 Svindal, Fet (JNY); 2 M 1 F 26.4, 2 ex 28.4 (ØHA), 1 par 30.4 (KEI), 2 M 1.5 (HKV, ØSY, GSA, AJF), 3 par 2.5 (ØHA), 3 ex 3.5 (HRE, KJO), 2 M 1 F 5.5 (THA, GHA), 1 M 7.5 (HFA, ERU, TOV), 1 M 9.5 (ERU, BBR), 2 par 11.5 (GOH mfl.), 1 par 17.5 (ØSY, TAS, JØD), 1 ex 7.8 (ROL, JNY), 1 M 31.8 (FJA)



Snadderand Østensjøvann, Oslo.
Foto Ketil Knudsen ©

Årnestangen, Rælingen; 3 ex 11.5 Fautøya, Rælingen (TAS); 1 ex 22.7 Tangen, Nitelva, Rælingen (SAO); 1 par 21.4 (KEI, SDA, NOF), 1 ex 30.9 (HBI, VBJ) Kragtorpvika, Aurskog-Høland; 1 M 3.6 (THE, OLU, OOL), 1 par 6.6 (SDA), 1 M 7.6, 1 M 6.7 (ØHA), 1 ex 22.8 (PTA) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 ex 30.9 nordenden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland (HBI, VBJ).

- 2001 ble ett utrolig bra år med 20 funn!

Krikkand *Anas crecca* Vinterfunn

2001: 1 F 6.1 Åbydammen, Asker (PGY); 1 M 28.1 Frognerparken, Oslo (JRG); 1 F Østensjøvann, Oslo 16.2 (HBI, TST); 1 ex 16.12 Årnestangen, Rælingen (HBI, VBJ).

Stjertand *Anas acuta* Vinterfunn, sommerfunn

2001: 1 ex 25.12 Børsholmen, Asker (SDA); 1 M 12.6 Rossholmen, Fet (ØHA); 1 F 6.1-8.3 (GSA, GOH, HBI mfl.), 1 F 11.6 (ABR), 1 F 19.11-31.12 (BBR, HBI, KEV, GEF mfl.) Østensjøvann, Oslo; 1 2k M 21-28.1 Akerselva, Oslo (JRG); 1 M 10.12 Årungen, Ås 10.12 (PTA).

Knekkand *Anas querquedula*

1998: 1 M 26.4 Dynovika, Skedsmo (TAS).

2001: 1 par 17.5 Årungen, Ås (FJA); 1 par Nydammen, Gjersjøelva, Oppegård; 2 M 1 F 19.5 Slorene, Oppegård/Ås (PEG); 1 M 1.6 Østensjøvann, Oslo (SRI); 2 M 1 F 11.5 (GOH, THE, JNY, KJM, SSÆ), 1 M 17.5 (ØSY), 1 M 2 F 19.5 (TAS, JØD, GHA), 1 par 21-22.5 (PGY, ROL), 1 ex 28.7 (PGY), 1 ex 14.10 (ROL) Årnestangen, Rælingen; 1 par 14.5 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); 1 M 17.5 nordenden av Bjørkelangsjøen (SDA).

- Anslagsvis 15 individer er over gjennomsnittet.

Skjeand *Anas clypeata*

1998: 1 par 26.4 og 29.4 Snekkervika, Rælingen (TAS); 2 M 2.5 Svelle, Fet (TAS, JØD).

2001: 1 par 13.5 (FJA, PGY, EIG), 1 F 10.10 Østensjøvann, Ås; 1 ex 31.10 Årungen, Ås (FJA); 1 ex 14.10 Glitredammen, Bærum (SDA); 14 ex 16.9 (BBR), 5 ex 22.9, 7 ex 23.9 (FGU), 9 ex 25.9 (BBR), 3 ex 26.9 (ERU), 1 ex 29.9, 3 ex 1.10, 4 ex 3.10, 11 ex 6.10 (BBR), 1 ex 13.10 (ABR), 3 ex 14.10, 2 ex 19-20.10 (BBR, EIG), 1 ex 21.10 (JNY) Østensjøvann, Oslo; 1 par 28.4 Monsrudvika, Fet (GHA, ØHA, NOF); 1 par 26.4 (ØHA), 1 M 1.5 (HKV, ØSY, GSA, AJF), 1 par 7.5 (HFA, ERU, TOV), 1 M 21.5 (ROL), 2 ex 5.8 (SAO, ROL, SDA), 1 ex 24.8 (SDA), 3 ex 3.9 (GKL, KJO), 2 ex 4.9 (THA), 3 ex 5.9 (EIG, KBS), 13 ex 21.9 (FJA, PTA), 3 ex 13.10 (GHA) Årnestangen, Rælingen; 2 ex 2.5 Fautøya, Rælingen (ØHA); 1 par 9.5 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, JNY); 1 ex 17.10 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (PGY, EIG).

- Anslagsvis 52 individer er ny årsrekord.

Taffeland *Aythya ferina*

1998: 18 ex 27.8 Svelle, Fet (TAS, YKV, JAE); 2 ex 4.10 Fautøya, Rælingen (TAS, JØD).

1999: 1 ex 3.10 Dynovika, Skedsmo (TAS).

2000: 15 ex 10.9, 61 ex 1.10 Årnestangen, Rælingen; 1 ex 15.10 Dynovika, Skedsmo (TAS, JØD).

2001: 1 par 7.4 Bråtevann, Auskog-Høland (SDA); 1 M 15.4 (SDA), 1 M 21.4 (SDA, KEI, NOF) Bergsjø, Aurskog-Høland; 1 M 1 F 25.4, 4 M 1 F 29.4 (ØHA), 6 M 2 F 1.5 (TAS, PGY, JNY), 1 M 26.5 (PGY, JNY), 2 M 27-30.5 (ØHA), 5 M 3.6 (THE, OOL, OLU), 5 M 4.6 (ØHA), 4 M 6.6 (SDA), 9M 1F 7-9.6 (ØHA), 6 M 14.6 (GHA), 9 ex 16.6 (TST, ØHA, VBU), 11 M 27.6 (GOH), 21 M 1 F 6.7 (ØHA), 39 M 5 F 21.7 (GSA, THE), 70 ex 5.8 (MBR, JBA), 32 M 13 F 9.8 (JNY), 80 ex 11.8 (ØHA, JNY), 45 ex 12.8 (PGY), 15 ex 19.8 (SDA), 2 M 22.8 (PTA), 20 ex 26.8 (TST, ØHA), 1 M 1 F 30.8 (PTA), 46 ex 29.9 (SDA, ØHA), 86 ex 30.9 (HBI, VBJ), 15 ex 7.10 (JNY), 51 ex 13.10 (SDA), 20 ex 17.10 (PGY, EIG), 2 ex 28.10 (SDA, TST, ØHA) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 2 M 30.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA, JNY); 1 ex 1.5 Songa, Skedsmo (TES); 3 M 1 F 9.5 Svindal, Fet (ØHA); 3 M 11.5 (GOH, THE, KJM, SSÆ), 1 par 19.5 (GHA), 35 ex 31.8 (FJA), 40 ex 1.9 (ROL), 43 ex 3.9 (GKL, KJO), 1 M 9.9 (TST, ØHA), 45 ex 11.9 (ROL), 12 M 1 F 21.9 (FJA, PTA), 5 ex 28.10 (ØHA, TST) Årnestangen, Rælingen; 50 ex 22-23.9 Nordre Øyeren (TSÆ); 1 F 27.4 (PGY, GSA); 1 M 28.4 (NN) Fornebo, Bærum.

- 86 ex 30.9 er det høyeste antallet notert på Hellesjøvann, og det nest høyeste i Oslo og Akershus. Det høyeste er 89 ex, og kommer fra Nordre Øyeren 23.9-2000. Et meget forsiktig anslag gir en årstotal på 144 taffelender.

Toppand *Aythya fuligula* Vinterfunn, ny hekkelokalitet

2001: 1 M 1 F 20.1 Sonsbukta, Vestby (MKL); 4 ex 1.1 (GHA), 7 ex 7.1 (AGU), 1 F 15.1 (TST, ØHA), 1 ex 10.2 (SDA), 21 ex 9.12, 7 ex 21.12 (PGY), 7 ex 25.12 (SDA) Sandvika, Bærum; 2 ex 2.12 (PGY, GSA, THE), 4 ex 8.12 (PGY, NOF) Fornebo, Bærum; 1 M 6.1-22.2 (BBR, GSA, GOH, HBI, SDA, TST, ØHA mfl.), 1 F 16.2 (HBI, TST) Østensjøvann, Oslo; 1 ex 28.1 Akerselva, Oslo; 3 ex 28.1 (JRG); 1 F 30.12 (GSA) Frognerparken, Oslo; 2 ex 10.2 (SDA), 3 ex 30.12 (THE) Kongshavn, Oslo; 2 ex 16.12 Årnestangen, Rælingen (HBI, VBJ); 25 ex 4.2 Vorma ved Eidsvoll, Eidsvoll (KEI); 1 kull 18.8 Skrukkelisjøen, Hurdal (SDA).

Ærfugl *Somateria mollissima* Vinterfunn, høyt antall, innlandsfunn

2001: 1 ex 1.1 (PGY, GSA, ØSY), 5 ex 2.1 (THE, JNY, JST), 2 ex 27.1 (GSA, THE, PGY), 12 ex 18.2 (PGY, AGU) Fornebo, Bærum; 17 ex 9.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (AGU); 250 ex 24.7 Gåsungene, Bærum (AGU).

Havelle *Clangula hyemalis* Sommerfunn

2001: 1 ex 28.7 Årnestangen, Rælingen (PGY).

- Julifunn er høyst uvanlig.

Svartand *Melanitta nigra* Sommerfunn, vinterfunn

2001: 34 ex 17.6 Storegrunn, Nesodden (GSA, MBE); 15 ex 30.6 Krokstrand, Vestby (PGY); 45 ex 2.12, 2 ex 15.12 (PGY, THE, GSA mfl.); 5 ex 10.12 Drøbaksund, Frogn (PTA).

- 2001 ga de største juniflokkene vi kjenner hos oss.

Sjørørre *Melanitta fusca* Vinterfunn

2001: 5 ex 2.12, (PGY, GSA, THE), 12 ex 15.12 (GSA, THE, PGY, PST, TEB) Fornebo, Bærum.

Kvinand *Bucephala clangula* Mulig kysthekking, høyt antall

2001: F med 3 store pull 18.7 Fornebo, Bærum (PGY); 525 ex 30.12 Sjursøya, Oslo (THE).

- Første hekkeindikasjon fra fjorden, men siden ungene var store er det nærliggende å tro at ungene har tilbrakt de første ukene ved ferskvann.

Lappfiskand *Mergellus albellus*

1999: 1 par 31.3 Skura, Enebakk; 1 M 1 F 3.11 Svelle, Fet (TAS, JØD).

2000: 1 ex 25.10 Årnestangen, Rælingen (TAS).

2001: 1 F 4.4 Bergsjø, Aurskog-Høland (BHL); 1 F 11.1-1.5 Sandvika, Bærum (ØHA, AJF, PGY, GHA, TST, SSA, AHQ, MBE, JNY); 1 F 6.5-12.5 Østensjøvann, Oslo (BBR, ABR, HBI, GOH, HRE, FGU, KKN); 1 M 20-25.3 (THA, ROL, THE, KEI, GSA), 1 ex 12-14.10 (ROL), 2 ex 28.10 (FRH, ACO, KAJ); 3 ex 7-9.11 (FJA, BES, FGU, HCW) Årungen, Ås.

Havørn *Haliaeetus albicilla* (etter 1900 8-1)

2001: 1 ex 9.4 Oslo sentrum, Oslo (ØHA).

- Havørna blir stadig oftere sett i våre fylker.

Sivhauk *Circus aeruginosus*

1998: 1 2k M 16.5, 1 ex 13.8, 3 ex 23.8, 1 ex 25.8, 1 ex 27.8, 1 1k 30.8, 1 ex 3.9 Årnestangen, Rælingen; 1 ex 27.8 Tuentangen, Fet (TAS mfl.).

1999: 2 ex 2.9, 1 ex 5.9 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2000: 1 ex 24.8, 1 ex 10.9 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2001: 1 ad M 1.5 (JNY, ØHA, GSA, AJF), 1 ex 22.8 (PTA) Kragtorpvika, Aurskog-Høland; 1 ad F 11.5 (ØHA), 1 M 21.7 (GSA, THE), 23 ex 5.8 (MBR, JBA); 1 2k M 9.8 (JNY), 1 2k 11.8 (ØHA, JNY), 1 ex 19.8 (SDA) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 ex 19.8 Kollerudvika, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 1.5 Rossholmen/Jørholmen, Fet (BJV); 1 1k 5.9 Monsrudvika, Fet (EIG, KBS); 1 ex 7.5 (HFA, ERU, TOV), 1 ad F 13.5 (TAS), 1 F 17.5 (ØSY), 1 F 20.5 (OSK), 1 ad F og 1 1k 24.7-4.8 (KEI, ØSY, JPL, HBI, KKN), 1 1k 5.8 (SAO, ROL, SDA), 1 ad F 6.8 (TAS), 1 ad F og 2k M 11.8 (ROL), 2 ex 15.8 (JNY, TRU, KBS), 3 ex 18.8 (ROL), 1-2 ex 19.8 (KJO), 1 ex 24.8 (SDA), 1 ad og 1 1k 25.8 (TOV, OSK, ROL), 1 ex 29.8 (GHA), 1 ad F og 1k 2.9 (TST, FRH), 1-2 ex 3.9 (GKL, KJO), 1 ex 4.9 (THA), 1 1k 21.9 (FJA, PTA), 1 ex 6.10 (TGR) Årnestangen, Rælingen; 3 ex 6.9 (AGU), 1 ex 22-23.9 (TSÆ) Nordre Øyeren; 1 ex 2.5 (HBI, ROL), 1 F 6.5 (BBR), 1 2k F 16.5 (HBI, SRI), 1 ex 18.5 (KKN, ROL), 1 F 1.6 (SRI) Østensjøvann, Oslo; 1 3k+ F 9.4 (FNB), 1 3k+ M 28.4 (PGY), 1 ex 29.4 (PGY, GHA, TEB, NOF), 1 F 16.5 (CKA, JTL, AJO, GUM, PGY), 7+ ex 17.5 (PGY), 3 ex 18.5 (PGY, GSA, ROL), 1 ex 25.8 (GSA, THE, MBE), 1 ad F 27.8 (PGY), 1 ex 7.9 (OSK) Fornebo, Bærum; 1 ad F 13.5 (PGY, EIG, FJA), 1 2k M 17.6, 1 1k 22.8 (FJA) Østensjøvann, Ås.

- 7+ ex 17.5 på Fornebo er det høyeste antallet noen gang hos oss. Den gamle rekorden (6 ex) var på samme lokalitet 24.4-2000. Fuglene som blir sett på Fornebo er i motsetning til i Nordre Øyeren oftest på direkte trekk. Årstotalen vurderes til 39 ex, som er ny rekord.

Myrhauk *Circus cyaneus*

2000: 1 ex 10.9 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2001: 1 F 11.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 28.4 (ØHA, NOF), 1 F 30.4 (KEI, JNY), 1 ex 28.8, 1 ex 11.9 (ROL) Årnestangen, Rælingen; 1 M 5.4 (TEB, KAJ), 1 ex 25.4 (ERU), 1 F 29.4 (PGY, TEB, NOF), 1 ex 7.10 (PGY) Fornebo, Bærum; 1 ad F 24.5 Østensjøvann, Ås (FJA).

- 9 individer gir ett godt år for arten.

Musvåk *Buteo buteo* Vinterfunn

2001: 1 ex 1.1-3.3, 1 ex 9.11-31.12 Fornebo, Bærum (FNB).

Fjellvåk *Buteo lagopus* Vinterfunn

2001: 1 ex 5.1-31.1 (bestemt til 2k 21.1 (FJA) Årungen, Ås og Frogn (THE, GSA, GSO, SDA, FJA, MKL); 1 1k 14.11 (FJA), 1 ex 1.12 (GOH) Årungen, Ås.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (etter 1970 28-1)

2001: 1 ad 9.4 Årungen, Ås (FJA, PTA).

- Det har ikke vært samme økning av kongeørn- som havørnobservasjoner.

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Vinterfunn

2000: 1 ex 10.12 Kløfta, Ullensaker (TAS, JAS).

2001: 1 ex 1.1-3.3 Fornebo, Bærum (FNB).

Aftenfalk *Falco vespertinus* (5-1)

2001: 1 1k 5.9 Furuneset, Fet (EIG, KBS mfl.)

- Andre høstfunn, forrige var 1 1k 29.8-1999 Østensjøvann, Ås.

Dvergfalk *Falco columbarius* Vinterfunn

2001: 1 M 7.1 Tuen, Fet (JNY); 1 ex 14.12 Fornebo, Bærum (TOV); 1 F 26.12 Sagdalen, Lørenskog (THØ).

Lerkfalk *Falco subbuteo*

1998: 1 ex 12.8 Årnestangen, Rælingen (TAS).

2001: 1 ad 18.8 Skrukelisjøen, Hurdal (SDA); 1 ex 23.6 Gardermoen, Ullensaker (SDA, THE); 1 ex 27.7 Trandum, Ullensaker (ATU); 1 ex 3.8 Jessheim, Ullensaker (JNY); 1 ad 4.8 Sessvollmoen, Ullensaker; 1 ad 4.8 Enga, Ullensaker (SDA); 1 ex 16.5 Rød, Nes; 1 ex 20.5 Grenimåsan, Nes; 1 ex 20.5, 1 ex 5.8 Eie, Nes (KEI); 2 ex 5.8 Vormsund, Nes (JNY); 1 ex 1.5 (THE), 1 ex 17.6 (ØSY), 1 ex 2.9 (TAS, KTR) Hemnes, Aurskog-Høland; 1 ex 9.5 (ØHA, JNY), 1 ex 26-27.5 (PGY, JNY), 1 ex 4.6 (ØHA, JNY, FNI, THE), 1 ex 5.8 (MBR, JBA), 1 1k 30.8 (PTA) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 ex 17.5 Bergsjø, Aurskog-Høland (SDA); 2 kraftig varslende ad 30.5 Aurskog-Høland (ØHA, JNY); 1 ex 9.6 Jørholmen, Fet (KEI); 1 ex 26.6 Fetsund, Fet (GOH); 1 ex 5.9 Monsrudvika, Fet (EIG, KBS); 1 ad 5.8 (SAO, ROL, SDA), 1 ad 11.8 (ROL), 1 ex 4.9 (THA) Årnestangen, Rælingen; 1 ex 6.5 Mønevann, Lørenskog (TAS, JØD); 1 ex 16-17.6 Stilla, Skedsmo (ØHA, VBU); 1 ex 29.6 Burstad, Enebakk (SDA); 1 ex 27.8 Flateby, Enebakk (TAS, JØD); 1 ex 22.4 Maridalen, Oslo (BJV); 1 ex 16.5 (HBI, SRI), 1 ex 11.6 (BBR, ABR) Østensjøvann, Oslo; 1 ex 18.5 (PGY), 1 ex 26.8 (GSA, THE, PST, PGY mfl.) Fornebo, Bærum; 1 ex 22.6 Fossum, Bærum (TKÅ); 1 ex Kokkerudåsen, Bærum primo august (TSY); 1 ex 8.6 Årungen, Ås; 1 1k 5.9 Østensjøvann, Ås; 1 1k 23.9 Eldor, Ås (FJA).

- Kraftig varslende fugler i Aurskog-Høland kan tyde på hekking i området, noe som ikke er særlig overraskende.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

1998: 1 ex 8.5 Fautøya, Rælingen; 1 1k 3.9, 1 1k 20.9, 1 1k 4.10 Årnestangen, Rælingen; 1 1k 27.9 Rossholmen, Fet; 1 1k 27.9 Bukkesand, Fet (sett samtidig som Rossholmen-fuglen) (TAS mfl.).

1999: 1 ex 28.8, 1 1k 31.8 Tuentangen, Fet (TAS, JØD).

2001: 1 1k 23.9 Østensjøvann, Ås (FJA); 1 ex 16.4 Lathusåsen, Bærum (TKÅ); 1 ex 21.8 Fornebo, Bærum (OSK); 1 ad M 3.11 Jongsåsen, Bærum (TLY); 1 ex 8.1 Haraløkkka, Oslo (ROL); 1 ex 10.1 (ØMO); 1 ad M 12-13.2 (AGU, PGY); 1 ex 15.2 (ØHA), 1 ex 20-21.2 (AGU), 1 ex 23.3 (JRG), 1 ex 27.3 (THE), 1 ex 17.7 (LGR), 1 ex 11-18.12 (ØMO) Oslo sentrum, Oslo; 1 2k F 30.3 Uranienborg, Oslo (JNY), 1 ex 31.3 Frognerparken, Oslo (JRG), 1 ad 6.5 Gressholmen, Oslo (JNY); 2 ex 3.11, 1 ex 25.11 Østensjøvann, Oslo (GEF); 1 ex 5.12 Økern, Oslo (JNY); 1 ex 5.5 (GHA), 1 ex 16.7 (HBI), 1 ad 9.9 (TST, ØHA), 1 ex 5.10 (JNY) Årnestangen, Rælingen; 1 ex 1.5 Rossholmen - Jørholmen, Fet (BJV); 1 ad F 5.9 (EIG, KBS) Monsrudvika, Fet; 1 ex 6.9 (AGU), 1 ad 22-23.9 (TSÆ) Nordre Øyeren; 1 ex 15.4 Nestangen, Nes (KEI); 1 ex 5.10 Årnes, Nes (JLA).

- Ca. 17 individer er bra oppfølger til fjordårets rekord med 19 individer.

Rapphøne *Perdix perdix* (etter 1975 4-1)

2001: 1 M 12-16.6 Årungen, Ås (MBI, PTA, TGU, ROL).

- Forrige funn var fra 1993.

Vaktel *Coturnix coturnix* (etter 1902 22-6)

2001: 1 M 10-17.6 Hauger - Sebjørnrud, Asker (PGY); 1 M 3-4 kvelder medio juni Fossum, Bærum (FGR); 1 M 21.7 Østby, Lørenskog (SAO); 1 M 1.6 Korsegården, Ås (PEG); 1 M 4-6.7 Eldor, Ås (FJA); 1 M 11-12.8 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, JNY, PGY).

- Ett godt år med 6 syngende hanner. Dette er ny rekord, og en god oppfølger til de foregående årene (1998 3 ex, 1999 4 ex og 2000 4 ex).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

2001: 1 ex 30.4-8.5 (FRH, ROL); 1 ex 30.8 (PTA), 2 ex 29.9 (ØHA, SDA) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 ex 10.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland; 1 ex 9.6 Kollerudvika, Aurskog-Høland (ØHA); 1 ex 6.4 Tuentangen, Fet (EHO, KJH, ELH, GUL); 1 ex 13.6-10.7 Stilla, Skedsmo (RFJ, ØHA, KWA, TST mfl.); 1 ex 20.6 Nebbursvollen, Skedsmo (TST); 1 ex 30.4 (BBR), 1 ex 11.6 (FGU, HBL, AKV, PFE), 1 ex 24.6 (JRG, EIG, KBS) vestsiden av Østensjøvann, Oslo; 1 ex 16.5 Bogerudmyra, Oslo (HBI, SRI); 2 ex 1.1-9.2, 1 ex 11.3-16.4, 1-4 ex 19.10-31.12 (maksimum 45 ex 11.11 og 4 ex 18.11) Fornebo, Bærum (FNB).

- Gledelig med mai-julifunn fra hele sju lokaliteter.

Myrrikse *Porzana porzana* (52-4)

1998: 1 ex 12.6 Tuentangen, Fet (TAS).

2001: 1 M 14-15.6 Langevannet, Lørenskog (ØHA); 1 M 15.6 Tuentangen, Fet (TAS, JØD); 1 M 18.5-19.6 Østensjøvann, Oslo (BBR, KKN, ROL, FGU mfl.); 1 M 17.6 Maridalen, Oslo (BJV).

Åkerrikse *Crex crex* (etter 1960 83-16)

1998: 1 ex 12.6 Fautøya, Rælingen (TAS).

2001: 1 M 20-22.5 Studentsamfunnet, Ås (MBI, SST, FJA); 1 M 31.5-3.6 Brønnerud, Ås (JPS, HPK); 1 M 22-23.7 Ås stasjon mot Kroer, Ås (MBI); 1 M 15.7 Bråte - Teigen, Ås/Vestby (PEG); 1 M 19-20.6 Søndre Ski, Ski (FJA), 1 M 19.6-15.7 sør for Ski flyplass, Ski (FJA, PEG); 1 M 15.7 Oppsal, Ski (PEG); 1 M 24.5-4.6 Stilla - Sørumsfjord, Skedsmo (THØ, EHO, KJH, ELH, GUL); 1 M 16-17.6 Rotnes, Nittedal (ØHA, VBU, GSA); 1 M ca.13.7 sør for Sørums kirke, Sørums; 1 M ca.13.7 sørvest for Lørenfallet kirke, Sørums; 1 M juni-9.7 Kolby, Ullensaker (HEV); 1 M 6.9 sør for Hemnes, Aurskog-Høland (KEI); 1 M 15.6 Nordby gård/sagbruk, Aurskog-Høland (SDA); 1 M 20.6 Hedum, Lierfoss, Aurskog-Høland (RFJ); 1 ex 18.9 Jahr, Aurskog-Høland (EBH).

- 15 syngende fugler pluss ett høstfunn gir det nest beste året, bare slått av 2000 med 26 ex.

Sivhøne *Gallinula chloropus* Vinterfunn

2001: 1 ex 26.11-30.12 Langtjern, Lørenskog (THE, JNY); 1 ex 6.1-4.3 Akerselva, Oslo (THE, GSA).

Sothøne *Fulica atra* Vinterfunn, høyt antall

2001: 16-31 ex 6.1-27.2 (maksimum 31 ex 14.2 og 16.2) (SDA, TST mfl.), 190 ex 5.11, 100 ex 13.11, 14 ex 19.11 (BBR), 8-12 ex 7.12-31.12 (maksimum 12 ex 31.12) (BBR mfl.) Østensjøvann, Oslo.

- Næringstilgangen på Østensjøvann må være upåklagelig når så mange fugler drøyer avreisen i det lengste.

Trane *Grus grus* Vinterfunn, tidlig vårfunn

2000: 2 ex 3-9.12 Tøyen - Løren, Aurskog-Høland (SDA)

2001: 1 ex 2.4 Fornebo, Bærum (PGY, TEB, BBR).

Tjeld *Haematopus ostralegus* Hekkefunn innlandet, vinterfunn

2001: Parring 1.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (ØHA); 3 ex 2.12 Fornebo, Bærum (PGY, GSA, THE).

Dverglo *Charadrius dubius* Hekkefunn, hekkeindikasjoner på nye lokaliteter

2001: Rugging 9.6 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA); spillende par 11.6 Gardermoen, Ullensaker; 1 ex 24.6 Vibergmoen grustak, Ullensaker (SDA); hekkefunn, 18.7 Fornebo, Bærum (PGY, TEB).

Sandlo *Charadrius hiaticula* Hekkeindikasjoner

1999: Varslende par 19-23.6 Østensjøvann, Ås (FJA).

- Arten hekket i Ås i 1978. Dette var siste hekkefunn i Oslo og Akershus.

Boltit *Charadrius morinellus* (etter 1900 4-2)

2001: 1 ex 16.5 Årungen, Ås (FJA); 6 ex 17.5 Brautmet, Aurskog-Høland (SDA).

- Første år med mer enn én observasjon. Typiske datoer.

Polarsnipe *Calidris canutus* Vårfunn

2001: 1 ex 20.5 Djupalen, Asker (GSA, MBE).

Brushane *Philomachus pugnax* Høyt antall

1998: 1310 ex 27.8, Nordre Øyeren (TAS, YKV, JAE).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* Vinterfunn

2001: 1 ex 16-17.12, Årungen, Ås (FJA).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago* Vinterfunn

2001: 1 ex 12-18.1 Årungen, Ås (FJA).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

2001: 2 ex 6.5 (AGU, GSA), 1 ex 7.5 (ROL, TEB, OSK), 4 ex 8.5 (PGY), 1 ex 9.5 (GSA), 2 ex 10.5 (HBI, KKN), 2 ex 11.5 (GSA, PGY, MBE, HKV) Fornebo, Bærum; 2 ex 7.5 (HFA, ERU, TOV), 3 ex 8.5 (ERU), 4 ex 9.5 (ERU, BBR, ROL), 1 ex 11.5 (GOH, THE, JNY, TAS) Årnestangen og Snekkervika, Rælingen; 2 M 10.5 Østensjøvann, Ås (FJA).

Svarthalespove *Limosa limosa*

1998: 1 ex 9.5 Årnestangen, Rælingen (TAS, YKV); 3 ex 27.8 Tuentangen, Fet (TAS, YKV, JAE).

2001: 1 ex 18-21.7 Fornebo, Bærum (TEB, PGY, GSA, THE).

Lappspove *Limosa lapponica*

1998: 1 ex 27.4, 8 ex 12.8, 2 ex 13.8, 1 ex 27.8 Tuentangen, Fet (TAS, JØD, YKV, JAE).

2001: 1 ex 27.4 (PGY, GSA), 1 F 30.4 (PGY, TEB, MBE, GOH), 1 ex 17.5 (PGY), 1 ex 21-22.7 (GSA, THE, HBI) Fornebo, Bærum.

Skogsnipe *Tringa ochropus* Tidlig vårfunn

2001: 1 ex 3-4.4 (HFA, CJA, TEB) Fornebo, Bærum; 1 ex 5.4 Østensjøvann, Ås (FJA).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* Tidlig vårfunn, høyt antall

1998: 60 ex 18.8 Årnestangen, Rælingen (TAS, YKV).

2001: 1 ex 6.4 Årnestangen, Rælingen (HBI).

Steinvender *Arenaria interpres*

2001: 6 ex 20.5 Rauskjæra, Asker; 2 ex 20.5 Ytre Vassholmen, Bærum (GSA, MBE); 3 ex 5.8 Årnestangen, Rælingen (SAO, ROL, SDA).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus* (34-2)

1998: 1 ex 18.8 Årnestangen, Rælingen (TAS, YKV).

2001: 1 ex 27.7 (JNY), 1 1k 31.7 (ROL), 1 ex 6.8 (TAS) Årnestangen, Rælingen (JNY, ROL); 1 ex 25.8 Fornebo, Bærum (GSA, THE, MBE).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius* (6-1)

2001: 1 ad 19-20.10 Østensjøvann, Oslo (BBR mfl.).

- Forrige funn og det eneste i det 20'de århundre var ved Storegrunn, Asker 1.11-1986.



Polarsvømmesnipe Østensjøvann, Oslo.
Foto Andreas Gullbera ©

Polarjo *Stercorarius pomarinus* (etter 1970 4-1)

2001: 1 imm 26.10 Rolfstangen, Bærum (PGY).

- Typisk dato.

Tyvjo *Stercorarius parasiticus* (etter 1970 32-1)

2001: 1 ad 11.7 Rolfstangen, Bærum (PGY).

Jo ubestemt *Stercorarius sp.*

2001: 1 ex 15.8 Årnestangen, Rælingen (JNY, TRU, KBS).

Dvermåke *Larus minutus* (127-11)

1998: 6 1k 12.8, 9 1k 13.8, 2 1k 3.9 Årnestangen, Rælingen; 1 1k 27.8 Svelle, Fet (TAS, YKV, JAE, JØD, TØD).

1999: 2 1k 28.8, 1 1k 31.8 Svelle, Fet; 1 1k 31.8 Årnestangen, Rælingen (TAS, JØD).

2000: 2 1k 13.8
Årnestangen, Rælingen
(TAS, JØD).

2001: 1 3k 3.6
Hellesjøvann, Aurskg-
Høland (THE, OLU,
OOL); 1 1k 11.11
Fornebo, Bærum (JNY
mfl.); 2 1k 2.8 (JNY,
KJO, PGY), 1 2k 4.8
(HBI, KKN), 4 1k 5.8
(SAO, ROL, SDA), 2 1k
6.8 (GOH), 1 ex 14.10, 1
ad 27.10 (ROL)
Årnestangen, Rælingen; 1
1k 2.10, 1 1k 27.10
Hulvik, Vestby (PTA).



Ringnebbmåke Frognerparken. Foto Per Gylseth ©

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* (0-1)

2001: 1 2k 31.3-28.4
Frognerparken, Oslo
(JRG, PGY mfl.).

- Første funn i Oslo og
Akershus av denne
måkearten fra Nord-
Amerika.

Sildemåke *Larus fuscus* Vinterfunn

2001: 1 ad 7.1, 1 ad 28.11 Ulven, Oslo
(ROL).

Polarmåke *Larus hyperboreus* (16-1)

2001: 1 2k 11-28.3 Sandvika, Bærum
(PGY).



Polarmåke Sandvika. Foto Per Gylseth ©

Krykkje *Rissa tridactyla*

2001: 4 ad 1 2k 30.5 (PGY), 2 ad 2 1k
11.11 (PGY, GSA, ØTR mfl.) Fornebo,
Bærum; 15 ex Oslo havn, Oslo (TRU); 1
ad 1 1k 2.10 (PTA), 10 ad 8 1k 31.10

(PTA, FJA) Hulvik, Vestby; 20 ex 31.10 (FJA), 15 ad 2 1k 4.11 (PTA, MKL), 1 ex 11.11 (PTA), 2 ad 2 1k 15.11 (FJA, PTA) Krokstrand, Vestby.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

2001: 1 ad 27.5 Jørholmen, Fet (HBI, VBJ); 2 ex 5.5 Nesset, Ås; 1 1k 12.10 Nebba, Ås (FJA).

Lomvi *Uria aalge* Sommerfunn

2001: 3 ex 9.6 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY).

Polarlomvi *Uria lomvia* (13-4)

2001: 1 ad 31.5 Snarøya, Bærum (FJA); 1 ad 10.11 Rolfstangen, Bærum (PGY, THE, GSA); 1 ad 11.11-28.11 Sjøflyhavna-Rolfstangen (PGY, PCH, OSK, FJA, GHA, HFA mfl.); 1 ex 7.11 Bygdøy, Oslo (ROL).

- 31.5 er seneste "vårfunn" av arten. Polarlomvi er sett i samtlige måneder bortsett ifra juni. Antall fugler i November er vurdert ut i fra utseende.



Polarlomvi Lysakerfjorden.
Foto Per Gylseth ©

Alke *Alca torda*

2000: 1 ex 11.11 Bogstadvann, Bærum (TKÄ).

2001: 1 ex 10.3 Brønnøya, Asker (SDA); 2 ex 7.6 Rolfstangen, Bærum (GSA); 1 ad 10.11 (PGY, GSA, THE, LEJ), 1 1k 11.11 (PGY, GSA, ØTR mfl.), 2 ex 16.11 (PGY, ROL, EIG), 7 ex 17.11 (GSA, THE, SAO, SRI, OJL), 3 1k 18.11 (PGY, SRI), 4 1k 2.12 (PGY, GSA, THE) Fornebo, Bærum; 1 1k 11.11 Lysaker, Bærum (PGY); 2 ex 3.11 "fjorden", Nesodden, Oslo og Bærum (NOF, PGY); 3 ex 17.11 Fjellstrand, Nesodden (EIG); 2 ex 16.11 Malmøya og Bunnefjorden, Oslo og Nesodden (EIG); 1 ex 29.01 Gressholmen, Oslo (JNY, PGY); 1 1k 2.10 (PTA), 1 ex 26.10 (FJA), 3 ex 27.10 (PTA), 22 ex 31.10 Hulvik, Vestby (FJA, PTA); 20 ex 31.10 (FJA), 19 ex 4.11 (PTA, MKL), 4 ex 10.11, 11 ex 11.11 (PTA), 4 ex 13.11 (MKL, EIG), 5 ad og 1 1k 15.11 (PTA, FJA), 1 ex 17.11 (SDA) Krokstrand, Vestby; 4 ex 13.11 Kjørvangen, Vestby (EIG); 1 1k 12.10 Nebba, Ås (FJA).

- For flere arter sjøfugl kan en legge merke til de "nye" lokalitetene Krokstrand, Hulvik og Kjørvangen, alle i Vestby kommune. Dette skyldes ikke nødvendigvis mer sjøfugl på disse lokalitetene i 2001, men heller økt satsing.

Teist *Cepphus grylle* (15-2)

2001: 1 ex 17.6 Kavringen, Oslo (GSA, MBE); 1 ad medio august Bleikøya - Hovedøya, Oslo (OSK).

Alkekonge *Alle alle*

2000: 1 ex 02.11 Bogstadvann, Bærum (TKÄ).

2001: 1 ex 17.11 Holmen, Asker (GSA, THE); 1 ex 4.11 (THE, GSA, SSA, SRI, PGY), 1 ex 10.11 (PGY, GSA, THE, LEJ), 1 ex 11.11 (PGY, GSA, ØTR mfl.), 6 ex 16.11 (PGY, ROL, EIG), 2 ex 17.11 (GSA, THE, SAO, SRI, OJL), 2 ex 18.11 (PGY, SRI), 2 ex 23.11 (ROL), 1 ex 25.11 (SRI, TOV, GSA) Fornebo, Bærum; 8 ex 3.11 Drøbak, Frogn (THE, GSA); 8 ex 3.11 "fjorden", Nesodden, Oslo og Bærum (NOF, PGY); 1 ex 15.11 Aker brygge, Oslo (LAM); 1 ex 18.11 Gresshomen, Oslo (JNY); 1 ex 26.10 (FJA), 45 ex 31.10 (FJA, PTA) Hulvik, Vestby; 45 ex 31.10 (FJA), 26 ex 4.11 (PTA, MKL), 17 ex 10.11, 22 ex 11.11 (PTA), 2 ex 13.11 (MKL, EIG), 22 ex 15.11 (FJA, PTA) Krokstrand, Vestby; 6 ex 13.11 Kjørvangen, Vestby (EIG).

Lunde *Fratercula arctica* (etter 1970 15-2)

2001: 2 ad 15.11 Krokstrand, Vestby (FJA, PTA); 1 ex 17.11 Kjørvangen, Vestby (SDA).

- Det har vært økt satsing på sjøfugl i Vestby, og dette har blant annet ført til to nye funn av lunde.

Skogdue *Columba oenas* Høyt antall

2001: 75 ex 2.9 Tronderud, Ås; 30 ex 6.9 Eldor, Ås (FJA).

Hubro *Bubo bubo*

2000: 1 par hekket vellykket ved fjorden (NN).

2001: 2 ex januar ved fjorden (NN).

Haukugle *Surnia ulula* (44-0)

1999: Rettelse: 1 ex 3.10 Oppkuven, Oslo skal være Oppkuven, Buskerud. Og derfor ikke i vårt område.

Nattravn *Caprimulgus europaeus* (etter 1970 29-5)

2001: 1 M 10.6, 2+ M 22-23.6 (PEG), 1 M 5.7 (TOV) Hyttåsen/Jervikåsen Ski; 1 M 22-23.6 (PEG), 1+ M 5.7 (TOV) Bråteåsen, Enebakk (PEG, TOV); 1 M 13.6 Trasop, Oslo (ROL); 1 ex 3.6 Snekkervika, Rælingen (TAS, JØD).

- Lokalitetene i Ski og Enebakk er nye for LRSK, men i følge PEG dreier dette seg om tradisjonelle lokaliteter.

Isfugl *Alcedo atthis*

2001: 1 ex 22.5 Semsvann, Asker (KAB); 1 ex 7.9 Gjermåa ved Hellen, Gjerdrum (SDA); Flere sett hele sommeren Leira, Nannestad/Ullensaker (MEN).

Hærfugl *Upupa epops* (22-1)

1976: 1 ex 9.5 mellom Aurskog og Årnes (JAL).

2001: 1 ex 20.9 Rustad/Tronderud, Ås (FJA).

Vendehals *Jynx torquilla*

2000: 2 ex 15-29.5 Lindås, Enebakk (TAS).

2001: 1 par 4.5, 1 M 8.5 Søndre Grytland, Ås (FJA); 1 ex 23.5 NLH, Ås (NCL); 1 ex 31.8 Fornebo, Bærum (THE); 1 ex ca. 5.5 Kopperhaugen, Oslo (NOF); 1 ex 5.5 Furuset, Oslo (JNY), 1 M 10.5 Brenna, Sørkedalen, Oslo (GHA); 1 ex 3.6 Turteråsen, Oslo (TLO); 1 ex 10.6 Heikampen, Oslo (OSK); 1 par udatert Feiring, Eidsvoll (JAF).

Gråspett *Picus canus*

2001: 2 ad 24.7 Grønnsjøen, Eidsvoll (SDA); 1 ex 1.1, syngende 1.4, 1 ex 1.5, 1 ex 17.5, 1 M 20.5 Eie, Nes (KEI); 1 ex 1-2.5 Aurskog, Aurskog-Høland (MRL, BFJ); 1 ex 29.9 Haneborg, Aurskog-Høland (SDA); 1 ex 20.10 Årnestangen, Rælingen (OSK, ROL, GHA); 1 F 26-29.12 Sofiemyr, Oppegård (PEG); 1 ex 23.3 Nøkle vann/Igletjern, Oslo (HBI); 1 ex 13.10 (TES), 1 F 29.12 (GSA, THE) Fornebo, Bærum; 1 ex Knabberud/Dæli, Bærum 28.10 (LEJ); 1 ex 10.3 Brønnøya, Asker (SDA); 1 ex 28.10 Eldor, Ås (FJA).

Tretåspett *Picoides tridactylus* Sommerfunn

2001: 2 ex 4.7 Grønnsjøen, Eidsvoll (SDA).

Trelerke *Lullula arborea* (etter 1970 10-5)

2001: 2 ex 16.4 Østensjøvann, Oslo (BBR); 1 M 11.6, 2 ex 23.6, 1 ex 4.8 (SDA), 2 ad (med mat til unge) 1 nyutfløyen juv 5.8 (PGY, JNY) lokalitet 1 Gardermoen, Ullensaker; par 19.6 (JNY), 3 ex 4.7 (PGY), 1 ex 26.7 (JNY), 1 ex 11.8 (GSA, THE) lokalitet 2 Gardermoen, Ullensaker; 1 M 23.6 lokalitet 4 Gardermoen, Ullensaker (SDA); 2 ex 5.8 (den ene i full myting) lokalitet 3 Gardermoen, Nannestad (PGY, JNY).

- Hva er det som skjer? Jo, SDA tar en tur til Gardermoen på leting etter hortulaner. Han finner ingen hortulaner, men derimot en syngende trelerke. Ikke så vanvittig kanskje, men det ble senere på sommeren funnet flere trelerker i samme område, og hekking ble konstatert. Forrige hekkefunn var på Jessheim, Ullensaker i 1952. Det ble for øvrig hørt 3 syngende hanner på Trandum våren 1966. Det ser ut til at trelerka er på full fart tilbake etter mange magre år. Også i Sverige har bestanden økt de siste årene.

Sanglerke *Alauda arvensis* Vinterfunn, tidlig vårfunn

2001: 1 ex 10.2 Fornebo, Bærum (AGU, PGY). 1 ex 24.2 Svindal, Fet (TST, ØHA).

- 10.2 kan være vårfunn, 24.2 har nok vårtrekket startet.

Fjellerke *Eremophila alpestris* (20-2)

2001: 1 ex 1.5 Hellesjøvann, Aurskog-Høland (ØHA, JNY); 2 ex 24.1-9.4, 1 ex frem til 18.4 (PGY, KEI, GHA mfl.), 2 ex 14-18.11, 1 ex frem til 26.12 (FJA, PTA, TOV, PGY mfl.) Fornebo, Bærum.

- Normal dato på vårfunnet. Gledelig med nye funn i vinterhalvåret på Fornebo.

Låvesvale *Hirundo rustica* Tidlig vårfunn, sent høstfunn

2001: 1 ex Gjønnnes, Bærum 4.4 (AJF); 1 ex Fornebo, Bærum 4.4 (TEB); 3 ex 23.10 Eldor, Ås (FJA); 1 ex Oppsal, Oslo 27.10 (ABR).

Tartarpiplerke *Anthus novaeseelandiae* (4-1)

2001: 1 ex 28.9 Østensjøvann, Ås (FJA).

- Tidligste høstfunn, men en normal dato i landssammenheng. Tidligere funn: Oslo 24.10-1868; Årnestangen 21.10-1990; Årnestangen 12.10-1996; Eldor, Ås 15.11-1999.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Tidlig vårfunn

2001: 2 ex 7.4 Østensjøvann, Ås (FJA).

Lappiplerke *Anthus cervinus* (51-10)

1999: 1 ex 3.10 Svindal, Fet (TAS).

2001: 1 ex 18.5 (ROL), 1 ex 25.8 (GSA, THE, MBE) Fornebo, Bærum; 1 ex 29.8 (EIG, KBS), 4 ex 31.8 (FJA), 1 ex 1.9, 1 ex 8.9, 1 ex 10.10 (ROL) Årnestangen, Rælingen; 1 ex 2.9 (FJA), 1 ex 21.9 (FJA, PTA) Rustad, Ås; 1 ex 5.9 Østensjøvann, Ås; 1 ex 12.9 Årungen, Ås (FJA).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

2001: 1 par 9.5 Skogerholmen, Asker (AGU); 1 ex 9.4 (FNB), 1 ex 27.10 (THE, GSA, SDA, PGY mfl.) Fornebo, Bærum; 1 ex 9.6 Rolfstangen, Bærum (GSA, PGY); 1 ex 3.11 Gåsungane, Bærum (PGY); 1 ex 29.4 Bøler, Oslo (GEF); 1 ex 2.10 (PTA), 2 ex 26.10 (FJA), 1 ex 31.10 Hulvik, Vestby; 2 ex 15.11 Krokstrand, Vestby (FJA, PTA).

- Arten har hekket på Skogerholmen. På Rolfstangen er det derimot uvanlig med sommerfunn. 15.11 er rekordsent for våre fylker. Det finnes dog ett vinterfunn fra Frogn.

Gulerle *Motacilla flava* Sent høstfunn

2001: 1 ex 10.10 Østensjøvann, Oslo (HBI).

Linerle *Motacilla alba* Sent høstfunn

2001: 1 ex 11.11 Hvalstrand, Asker (AGU).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* (12-2)

2001: 1 ex 7.4-2.5, 3 ex 15.4 Loppfolet, Ås (FJA, PTA).

- 3 ex er nytt maksimumsantall.

Jernspurv *Prunella modularis* Vinterfunn

2001: 1 ex 14.1-11.2 Finnbråtan, Eidsvoll (OBY).

Nattergal *Luscinia luscinia*

1999: 1 M 4.6 Stilla, Fet (TAS).

2000: 1 M 1.6 Hasle, Nesodden (JSA).

2001: 1-6 M 10.5-20.6 (FJA, PGY, JNY, MHA, LEJ mfl.), maks 6 M 3.6 (MHA, LEJ), varslende fugl 30.6 (FJA) Østensjøvann, Ås; 1 M 13.5 (PGY, EIG), 1 M 18.6 (FJA) Pollevann, Ås; 1 M 21.5-14.6 sørenden av Årungen (FJA); 1 M 12-16.6 nord for Årungen rostasjon, Ås (MBI, PGY, PCH, PEG mfl.); 1 M 20.5-10.6 Vettrebukta, Konglungen, Asker; 1 M 20.5 M Esvika, Konglungen, Asker (PGY,



Svartryggerle Loppfolet.
Foto Per Tannen ©

GSA); 1 M 20.5-10.6 Løknes, Konglungen, Asker (PGY, GSA, KWA); 1 M 20.5-12.6 Spiradammen, Konglungen, Asker (PGY, GSA, FGG); 1 M 3.6 (TAS, JØD), 2 M 4.6 (EHO, KJH, ELH, GUL) Tuentangen, Fet; 1-4 M 18.5-20.6 Frogner-Stilla, Skedsmo (GSA, THE, TST, KEI, ØHA, VBU) maks 4 M (2 M Stilla og 2 M Aslakneset) 20.6 (TST); 1 M 12.5 Kragtorpvika, Aurskog-Høland (PGY, EIG).

- Hele 20 syngende hanner i 2001. Merk i tillegg den varslende fuglen ved Østensjøvann, Ås.

Blåstrupe *Luscinia svecica* Sent høstfunn


2001: 1 ex 18.10 Årnestangen, Rælingen (OSK); 1 ex 28.10 Fornebo, Bærum (SRI).

- To rekordsene observasjoner. Arten har en trekktopp de siste dagene i august, og de siste sees normalt medio september.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*

2001: 1 M 22.5 Regjeringskvartalet, Oslo (JEB); 1 M 1.6 Dronningens gate - Prinsens gate, Oslo (OLU); 1 F 26.6 (TRU, HHA), 1 ex 21.8 (VKR), 2 1k 23.8 (RAN), 1 ad M 1 1k 24.8 (SDA), 1 ex 27.8 (KKN), 1 1k 28.8 (ØSY), 1 ex 2.9 (HFS) Akershus festning, Oslo; 1 ex 21-23.8 Gressholmen, Oslo (JEB); 1 ex 8.9 Huseby, Oslo (OSK); 1 ex 5.9 Snekkervika, Rælingen (THA); 2 M 23.5 Ås stasjon, Ås (FJA).

- Hekking ble konstatert ved Akershus festning. Forrige hekkefunn var i Bærum 1996.



Svartstrupe *Saxicola torquata* (3-1)

2001: 1 F 27-29.3 Koksa, Fornebo, Bærum (JEB, TOH, PGY, ROL).

- Fuglen tilhørte en av de vestlige underartene. Dette er det andre vårfunnet i vårt område. Det første var 1 M 30.3-3.4 Storøykilen, Fornebo, Bærum.

Ringtrost *Turdus torquatus* Høstfunn

2000: 2 M 24.10 Ekebergdalen, Enebakk (TAS).

2001: 1 1k 5.10 Rustad, Ås (FJA).

- Arten er overraskende sjelden om høsten, så to funn i en rapport er veldig bra.

Svartrødstjert
Akershus festning.
Foto Ketil Knudsen

Taigatrost *Turdus ruficollis* (2-0)

1980: Rettelse: 1 ex av underart rødstrupetrost *T.r.ruficollis* 8.9 Røa, Oslo. Observasjonen er revurdert av NSKF. Kjennelsen ble "ikke godkjent". Dermed er denne underarten ikke lenger på listen over underarter sett i Oslo og Akershus (eller Norge).

Rødvingetrost *Turdus iliacus* Vinterfunn

2001: 1 ex 1.12 (PGY, GSA, TLB), 1 ex 8.12 (PGY, NOF) Fornebo, Bærum.

Duetrost *Turdus viscivorus* Høyt antall

2001: 50+ ex 7-9.4 Årungen, Ås (FJA).

- 50 ex er det meste som er sett i våre fylker (Asker 31.3-1908 & Nesodden 11.4-1991).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* (54-5)

1998: 1 M 12.6 Årnestangen, Rælingen (TAS).

1999: 1 M 4.6 Stilla, Fet (TAS).

2001: 1 M 9.5 Østensjøvann, Oslo (HBI); 1 M 12-17.6 Alna ved Smalvollveien, Oslo (GUA, ØHA, PGY, VBU); 2 M ca.10.6 (LGJ), 1 M frem til 20.6 (RFJ, TST, CKA, AJO, DVA, FSM, TAS, JØD) Stilla, Skedsmo; 1 M 1-24.6 Østensjøvann, Ås (FJA, MHA, TRS, LEJ).

- Fuglen fra 1998 er tidligere rapportert 11.6. Den fra 1999 er ny og dobler årstotalen. I 2001 ble hele 5 hanner registrert, dette er riktignok en liten nedgang fra 6 individer i 2000.

Elvesanger *Locustella fluviatilis* (7-1)

2001: 1 syngende M 12.6-2.7 Bahus, Nannestad (ALU mfl.).

- Elvesanger er en av få arter hvor Oslo og Akershus har en høy andel av Norske funn. Tidligere funn: Pollevann, Ås 6.6-1981; Hakadal, Nittedal 18-24.6-1987; Kjeller, Skedsmo 7-9.6-1988; Pollevann, Ås 25-26.6-1991; Knaimyrene, Hurdal 20.6-1992; Gjersrudtjern, Oslo 6-10.6-1993; Haga, Bærum 1-24.6-1998. Som vi kan se holdt Bahus-fuglen det gående lenger ut på sommeren enn noen tidligere har.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

2001: 1 M 7-11.5 (ØHA), 4 M 13.5 (PGY, EIG), 7 M 26-27.5 (6 ved vannet og 1 i en grøft rett på nordsiden) (PGY, JNY), 5 M 30.5 (ØHA), 2 M 6.6 (SDA), 1-2 ex 21.7 (THE, GSA), Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1 M 15.7 Jørholmen, Fet (HBI); 1 M 19.5 (GHA), 4 territorier (syngende/varslende) 14.7 (2 ytterst på tangen og 2 innafor sauebeitet) (PGY), 3 M 16.7 (1 ytterst på tangen og 2 i takrørskogen) (HBI), 1 M 19.7 (ROL), 1 ex 21.7 (GUH), 1 ex 23.7 (ROL), 2 ex 27.7 (JNY), 1 M 28.7 (PGY), 1 ex 2.8 (JNY, KJO, PGY), 1 ex 7.8 (ROL, JNY), 6-8 ex 25.8 (TOV, OSK, ROL), 1 1k 31.8 (FJA), 2 ex 21.9 (FJA, PTA) Årnestangen, Rælingen; 2 M 20.6 Stilla, Skedsmo (TST); 1 ex 18.8 (GSA, THE, TOV, TES), 1 ex 1.9 (THE, PGY) Fornebo, Bærum.

- 16 vårfunn er en forbedring fra de senere årene; 1997 2; 1998 6; 1999 6; 2000 6. En kan merke seg konsentrasjonene ved Hellesjøvann og Årnestangen. Arten ble sett jevnlig på Årnestangen utover høsten med maksimum 6-8 ex 25.8. Fornebo var eneste lokalitet med kun høstfunn.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* (256-71)

1998: 2 M 12.6 Årnestangen, Rælingen (TAS).

1999: 4 M 4.6 Årnestangen, Rælingen (TAS).

2001: 1 M 30.6 Stensgård, Nannestad; 1 M 3.6 Ruudsveien, Nittedal (GSA); 1 M 46 (EHO mfl.), 1 M 11.7 Kampåa, Nes (SDA); 2 M 16-17.6 Tuentangen, Fet (ØHA, VBU); 1 M 2.6 (GHA), 2 M juni (ERU) Snekkervika, Rælingen; 1 par (syngende og varslende) 16.7 Årnestangen, Rælingen (HBI); 1 M 3.6 Dynovika, Skedsmo (TAS, JØD); 1 M 3.6 (TAS, JØD), 1 M 8.6 (KEI), 4 M 15.6 (TAS, JØD), 2 M 20.6 (TST), 1 M 26.6 (CKA, mfl.) Stilla, Skedsmo; 1 M 4.6, 2 M 10.6 Bølerbekken, Østensjøvann, Oslo (FGU, BBR); 1 M 7-19.6 Vaderdammen, Østensjøvann, Oslo (BBR, FGU, TOG); 2 M 10.7 Østensjøvann, Oslo (GEF); 1 M 27-28.5 Frogner, Bærum (AGU, BOT); 2 M 5.6, 1 M 7.6, 1 varslende og syngende 11.6 Storøykilen, Bærum; 2 M 12.6 (PGY, GSA, NGU, GHA, KEI); 2 M 31.5-1.6, 1 M 27.6 Holtekilen, Bærum (PGY, GSA, GHA); 2 M 31.5 Koksa, Bærum (PGY, GSA); 1 M 16.6 Stovivann, Bærum (GHA); 1 M 15.6-medio juli Fossum, Bærum (TEB, GOH, TKÅ); 1 M 17.6 Vøyenenga, Bærum; 1 M 18.6 Dælivann, Bærum (AGU); 1 1k 12.8 Fornebo, Bærum (GSA, THE); 1 M 27-28.5 sør for Sem, Asker (AGU, BOT); 1 M 10.6 Østenstad, Asker; 1 M 10.6 Hauger/Sebjørnrud, Asker (PGY); 1 M 14-15.6 nord for Kolbotn gravlund, Oppegård (JRE); 1 M 19.6 Slørene, Oppegård (KHO); 1 M 6-21.6 Midtsjøvann, Ski (KWA, LEJ, FFA); 1 M 19.6 Tallaksrud, Ski (KHO); 2+ M 10.7 sør for Ski flyplass, Ski (PEG); 2 M 10.6 Hølen/Såner, Vestby; 1 M 10.6 Kjennstjernet, Vestby; 1 M 10.6 Sonskilen, Vestby (MKL, BOT); 2 M 17.6 Garder, Vestby; 2 M 17.6 3 km SØ av Garder, Vestby (PEG); 1-3 M 25.5-18.6 Pollevann, Ås (BBR, GSA, MHA, FJA mfl.); 1-10 M 27.5-21.6 (PGY, JNY, LEJ, FJA) maks 10 M 19-20.6 (FJA), 1 F 3.6 (MHA, LEJ) Østensjøvann. Ås; 1 M 3.6 (MHA, LEJ), 1 M 12.6 (MBI), 3 M 16-20.6 (FJA) Årungen, Ås; 2 M Kroer, Ås 14.6 (MBI); 2 M 17.6 Klommesteinveien, Ås (PEG); 2 M 30.6 Slørstad, Ås (FJA).

- En soleklar ny rekord i antall funn!

Gulsanger *Hippolais icterina* Tidlig vårfunn

2001: 1 M 9.5 Årungen, Ås (FJA).

Munk *Sylvia atricapilla* Vinterfunn

2001: 1 M 18.12 Holtekilen, Bærum (GSA).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* (1-1)

2001: 1 ex 28.9 og 5.10 Store Grytland, Ås (FJA, PTA).

- Oslo og Akershus første funn er 1 M ringmerket 30.9-1994 Sofiemyr, Oppegård. Se også tartarpiplerke.

Gråflusnapper *Muscicapa striata* Tidlig vårfunn, sent høstfunn

2001: 1 ex 6.5 Årungen, Ås; 1 ex 28.9 Holstad, Ås (FJA).

- Høstfunnet er det seneste vi kjenner til.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* (18-3)

2001: 1 3k+ M 16-17.5 Den Engelske park, Oslo (OHM); 1 2k M 24-26.5 Ljansdalen, Oslo (SSÆ, KJM, AGU); 1 ex 31.8 Årnestangen, Rælingen (FJA, PTA).

- 31.8 er det seneste høstfunnet til nå. Den gamle rekorden var fra Bru, Ski og Løken, Aurskog-Høland 30.8-1987.



Dvergfluesnapper Ljansdalen. Foto Andreas Gullberg ©

Skjeggmeis *Panurus biarmicus*

2001: 4+ ex 28.4 (HPR, TNI, SHE), 1 ex 30.4 (FRH), 1 M 1.5 (TAS, JØD), 1 F 8.5 (ROL) Hellesjøvann, Aurskog-Høland; 1.1-8.4 (månedsmaksimum 14

ex 2.1, 3 ex 3.2, 4 ex 1.3, 6+ ex 8.4), 1 F 29-30.4, 2 M 2 F 7.5 (PGY, FNB), 1+ ex 13.10 (PGY, GSA), 8+ ex 19.10, 22+ ex 20.10, 10 ex 21.10, 8 ex 23.10, 15 ex 28.10, 25 ex 4.11, 9.11-31.12 (månedsmaksimum 10 ex 18.11, 11 ex 16.12) (PGY, FNB); 2 M 12.1 Årungen, Ås (FJA).

- Rester av fjorårets invasjon ble sett på Fornebo og ved Årungen. Det ser ut til at nye fugler dukket opp i overgangen april - mai, og dette resulterte i de første fuglene i Aurskog-Høland. På høsten kunne vi glede oss over en ny stor invasjon. 25 ex 4.11 på Fornebo er tangering av tidligere maksimumstall (Fornebo 22.12-2000).

Pirol *Oriolus oriolus* (10-1)

2000: 1 ex 24.6 Venner, Sørkedalen, Oslo (KIS).

- Forrige var 30.5-1998 i Ås. Funnet er det seneste vi har i vårt arkiv.

Varsler *Lanius excubitor*

2000: 1 ex 5.11 Kjelle - Haneborg (SDA).

2001: 1 ex 12-23.1 (FJA), 1 ex 10-16.12 (PTA, FJA) Årungen, Ås; 1 ex 17.10 Eldor, Ås; 1 ex 5.1 Hølen, Vestby (FJA); 1 ex 4.11 Krokstrand, Vestby (PTA, MKL); 1 ex 6.10 (JLA, LEJ), 1 ex 14.10, 1 ex 10-11.11 (PGY, GSA mfl.) Fornebo, Bærum; 1 ex 3-4.2, 1 ex 21.3 Østensjøvann, Oslo (HBI); 1 ex 23.9 Gressholmen, Oslo (TGR); 1 ex 21.4 (HAT), 1 ex 2-3.9 (TST, FRH, GKL, KJO), 1 ex 21.9 (FJA, PTA), 1 ex 6.10 (TES, THØ), 2 ex 20.10 (OSK, ROL, GH), 1 ex 5.11 (ROL), 1 ex 6.12 (TAS) Årnestangen, Rælingen; 1 ex 28.10 Nitterbergtangen, Skedsmo (THØ); 1 ex 30.12 Nebbursvollen, Skedsmo (HAT); 2 ex 5.9 Monsrudvika, Fet (EIG, KBS); 1 ex 23.9 Nestangen, Nes (KEI).

- Totalt ca. 15 funn.

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

2001: 1 ex 31.1 Holmenkollen, Oslo (NN).

Kornkråke *Corvus frugilegus* Vinterfunn

2001: 5 ex januar Kløfta, Ullensaker (KEI).

- Dette er den største vinterflokken i vårt arkiv, men arten forekom langt vanligere vinterstid i forrige århundre.

Bjørkefink *Fringilla montifringilla* Høyt antall

2001: 100000 ex 1.5 Eldor, Ås (FJA).

- Bjørkefink blir ofte sett i store flokker ved dyrka mark om våren, men dette er en klar maksnotering i våre fylker.

Tornirisk *Carduelis cannabina* Vinterfunn

2001: 1 ex 12.12 Eldor, Ås (FJA).

- Andre året på rad med vinterfunn av tornirisk, men arten er aldri sett i januar hos oss.

Bergirisk *Carduelis flavirostris* Vinterfunn

2001: 10 ex 11.1 (TST, CSU), 45 ex 27.1 (GHA), 40 ex 10.2 (AGU, PGY), 45 ex 17.2 (PGY, NOF), 28 ex 18.2 (PGY, AGU), 30 ex 19.2 (BBR), 60 ex 22.12, 65 26.12 (PGY), 35 ex 30.12 (BBR, PGY) Fornebo, Bærum; 30 ex 16.2 Østensjøvann, Oslo; 3 ex 20.2 Sarabråten, Oslo (HBI).

Brunsisik *Carduelis cabaret*

2001: 3 ex 1.5 Østensjøvann, Ås; 30 ex 12.9 Årungen, Ås; 3 ex 29.9 Eldor, Ås; 1 ex 9.12 Rustad, Ås (FJA); 1 ex 1.1 (PGY, GSA, ØSY), 2 ex 11.3 (PGY, GSA, THE), 1 ex 17.3 (GSA), 1 ex 18.3 (FNB), 5 ex 30.3 (PGY, JNY, TOH), 2 ex 31.3 (FNB), 1 ex 1.4 (PGY, NOF), 1 ex 3.4 (HFA, CJA), 1 ex 5.4 (TEB, KAJ), 2 ex 7.4 (FNB), 2 ex 15.4 (PGY), 3 ex 25.4 (ERU), 4 ex 27.4 (PGY, GSA), 1 1k 5.8, 1 1k 25.8 (THE), 1 1k 26.8 (GSA, THE, PST, PGY mfl.), 15+ ex 2.9 (PGY, PST, NOF), 2 ex 8.9 (THE, GSA), 1 ex 16.9 (GSA, AGU), 81 ex 22-23.9 (GSA), 1 ex 11.10 (PGY), 20 ex 13.10, 20 ex 14.10 (PGY, GSA, THE, TES mfl.), 20 ex 20.10, 3 ex 21.10 (THE, GSA, PGY), 1 2k+ M 27.10 (THE, GSA, SDA, PGY mfl.), 2 ex 4.11 (THE, GSA, SSA, SRI, PGY), 7 ex 16.11 (PGY, ROL), 1 ex 17.11 (GSA, THE, SAO, SRI, OJL), 4 ex 18.11 (PGY, SRI), 1 ex 28.11 (HFA), 1 ex 8.12 (PGY, NOF), 2 ex 9.12 (GSA, PST), 1 ex 10.12 (THE), 1 ex 26.12 (PGY), 20 ex 31.12 (FMÜ) Fornebo, Bærum; 3 ex 24-25.12 Eie, Nes (KEI); 3 ex 12.1 Furuset, Oslo (JNY), 2 ex 26.10 (KBE, HHV), 1 ex 7.12 (ROL) Østensjøvann, Oslo; 1 ex 18.11 Karihaugen, Oslo (THE); 2 ex 15.4 (TAS), 1 ex 4.8 (HBI, KKN), 10 ex 21.9 (FJA, PTA), 2 1k 14.10 (ROL) Årnestangen, Rælingen; 3 ex 13.1 Sørumsand, Sørumsand (GSA, THE).



Brunsisik Fornebo. Foto Per Gylseth ©

- 1.5 er seneste vårfunn til nå. Likeså er 4.8 tidligste registrerte høstfunn! Legg også merke til sommerfunnene av ubestemte gråsisik/brunsisik.

Gråsisik/brunsisik ubestemt *Carduelis flammea/C. cabaret* Sommerfunn

2000: Regelmessig Nesodden hele sommeren, blant annet ved Gulstad og Røer (JSA).

2001: Regelmessig Nesodden hele sommeren, blant annet ved Gulstad og Røer (JSA); 10 ex 15.7 Fornebo, Bærum; sett fra medio juli Fossum, Bærum (TKÅ); 1 ex 14.7 (PGY), 1 ex 24.7 (KEI, ØSY, JPL), 3 ex 28.7 (PGY) Årnestangen, Rælingen.

- For disse lavlandslokalitetene er mitt tips brunsisik.

Polarsisik *Carduelis hornemanni* (156-35)

2001: 2 ex 29.9, 3 ex 9.12 Rustad, Ås; 3+ ex 5.10 Søndre Grytland, Ås; 1 ex 10.10 Tronderud, Ås; 2 ex 17.11 Ås stasjon, Ås; 2 ex 9.12 Eldor, Ås; 1 ex 9.12 NLH, Ås (FJA); 1 ex 14.11 Krokstrand, Vestby (MKL); 2 ex 30.3 (PGY, JNY, TOH), 1 ex 1.4 (PGY, NOF), 3 ex 22-23.9 (GSA), 5 ex 13.10, 12 ex 14.10 (PGY, GSA, THE, TES mfl.), 1 ex 19.10 (ROL, OSK, PGY), 6 ex 20.10 (THE, GSA,



Polarsisik Fornebo. Foto Per Gylseth ©

PGY), 1 ex 28.10 (PGY, SRI), 1 ex 30.10 (TOV), 3 ex 16.11 (PGY, ROL), 1 ex 18.11 (PGY, SRI), 1 ex 30.11 (PGY), 5 ex 2.12 (PGY, GSA, THE), 5 ex 8.12 (PGY NOF), 3 ex 10.12 (THE), 1 ex 22.12, 3 ex 26.12 (PGY) Fornebo, Bærum; 2 ex 25.3 Østensjøvann, Oslo (FGU); 2 ex 4.10 Ellingsrud/Mariholtet, Oslo (HBI); 1 ex 30.12 Nordre Skøyen, Oslo (ROL); 1 ex 14.10, 1 ex 27.10, 1 ex 5.11, 1 ex 2.12 (ROL), 2 ex 6.12 (TAS) Årnestangen, Rælingen; ca. 5 % polarsisik i en flokk på 7-800 gråsisik (7 bestemt sikkert) 6.12 Gardermoen, Ullensaker (PGY); 2 ex 24-26.12 Eie, Nes (KEI).
- Ett brukbart år med 35 funn av 89 individer. Hvis vi da ikke ekstrapolerer flokken ved Gardermoen, noe som ville gi 30 fugler i tillegg.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera* (36-2)

2001: 1 2k+ M 26.9 Finstad, Ski, 1 1k 5.10 Rustadmosen, Ås (FJA).

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus*

2001: 8 ex 2.1 Fornebo, Bærum (JST); 5 ex 15.9 Opptjenna, Nes (KEI); 1 ex 13.10 Sollerud, Oslo (KEI); 2 ex 13.2 Eldor, Ås; 10 ex 28.9 Østensjøvann, Ås; 2 ex 30.9 Rustad, Ås (FJA).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* Høstfunn

2001: 1 ex 25.8 Fornebo, Bærum (GSA, THE, MBE).

- Arten sees utrolig sjeldent om høsten.

Konglebit *Pinicola enucleator*

2001: 25 ex 27.1 Kikut, Oslo (GKL).

- Kun ett funn. Antallet er høyt, men kan ikke måle seg med 100 ex Sognsvann, Oslo 7.12-1989.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

2001: 2 ex 15.7 Åneby, Nittedal (OMO); 1 ex 6.10 Hersjøen, Ullensaker (SDA) 3+ ex 24.9 Finnbråtan, Eidsvoll (OBY); 1 ex hele vinteren 2001-2002 Øvre Holtet, Eidsvoll (NN via KBO); 1 M

16.4, 7-9 ex (dels varslende) 10.5 (FMÜ), 3 ex 6.10 (KEI) Åstad, Asker; opptil 3 ex 20.4-2.5 Billingstad, Asker (FMÜ); 1 ex 25.4 Vakås, Asker (MIR); 1 ex 5.5 (PGY, GSA), 1 ex 15.5 (FJA) Semsvann, Asker; 1 ex 29.6 Syverstaddammen, Asker (MIR, EBE); 1 ex 18.2 Kokkerudåsen, Bærum; 1 ex 24.3, 4 ex 24.4, 2 ex 26-27.4, 3 ex 30.4, 1 M 5-6.5, 2 ex 13.5, 1 M 16.5, 1 ex 18-20.5, M og F 23.5, 1 ex 25-29.5, 2 ex 27.6, 1 ex 29.6 Ramstad, Bærum (PGY); 2 ex 6.4 Fornebo, Bærum (PGY); 1 ex 1.5 (TST), 1 ex 3.6 (AHQ) Dælivann, Bærum; 1 ex 6.5 Rykkinn, Bærum (JLØ); 1 ex 6.5 Kjønejordet, Bærum (AGU); 1 ex 7.5 Rustad, Bærum (PGY); 1 ex 8.5 Bjerkelunden, Bærum (GSA); 2 ex 19.5 Bjørum sag, Bærum (THE); 1 M 24.5 Fleskumåsen, Bærum (PGY); 1 ex 26.5 Brennejordet, Bærum (AGU); 1 ex 27.5 Kjaggli, Bærum; 1 ex 2.6 Kirkerud, Bærum (JLØ); 1 ex 17.6 (TKÄ), 1 ex 23.6 (GOH) Fossum, Bærum; 1 ex 25.12 Stabekk, Bærum (GHA); 5 ex 1.1 Holmendammen, Oslo (JNY); 3 ex 2.1 (JST), 1 ex 7.10 (HFS), 1 ex 30.10 (TOV), 12+ ex 2.12 (GOH) Tøyenparken, Oslo; 2 ex 21.1 (THE, ABR), 2 ex 18.3, 1 ex 1.4 (BBR), 4 ex 3.4 (HBI, ROL), 1 ex 8.4 (BBR), 4 ex 4.7 (HBI), 1 ex 14.10 (BBR), 1 F 7.12 (ROL) Østensjøvann, Oslo; 2 ex 22.1 (ABR) 1 ex 28.5, 1 ex 19.6, 2-4 ex 20.10 (BBR) Oppsal, Oslo; 1 ex 1.4 Frognerparken, Oslo (JRG); 3 ex 4.4 Vestre gravlund, Oslo (OSK); 1 ex 6.4, 3 ex 3.9, 3 ex 27.9, 1 ex 11.10, 1 ex 29.10 Blindern, Oslo (FJA); 1 ex 8.4 Bygdøy, Oslo (SDA); 1 ex 10.4, 1+ ex 5.10 Lilleaker, Oslo (KEI); 1 ex 16.4 Nordberg, Oslo (BBR); 1 ex 16.4 Ljanselva, Oslo (SSÆ); 1 ex 9.5, 1 ex 27.10 Hovseter, Oslo; 1 ex 11.5 Ullern, Oslo (GSA); 4 ex 3.10, 1 ex 29.10 Huseby, Oslo (KJO); 2 ex 3.10, 1 ex 16.11 Sollerud, Oslo (KEI); 1 ex 30.10 Refstad, Oslo (TLB); 1 ex 4.11, 1 ex 17-18.11 Tåsen, Oslo (SRI); 1 ex 9.12 Furuset, Oslo (JNY); 1 ex 16.6 Tangen sentrum, Nesodden; 1 ex 21-28.12 Solberg, Nesodden (BBR); 1 ex 7.5 Drøbak, Frogn (SJO); 1 ex 7.8 Stamnestjernet, Vestby (SDA); 2 ex 28.12, 4 ex 29.12 Vestby, Vestby (JHK); 2 ex 4.1, 4 ex 8.1 Ås sentrum, Ås; 1 ex 7.1, 1 ex 18.1, 2 ex 24.3, 1 ex 16.12 Kaia, Ås; 1 ex 13.1 Rustad, Ås; 5 par 9.4, 4 ex 16.5, 1 ex 20.6, 1 ex 26.9 Årungen, Ås; 1 par 11.4 Vassum, Ås; 1 ex 11.4 Nesset, Ås; 1 ex 30.4, 1 ex 16.7, 3 ex 26.10-31.12 Eldor, Ås; 1 ex 17.5 Moer, Ås; 2 ex 1.9 Loppfolet, Ås; 1 ex 10.10 Søndre Grytland, Ås; 1 ex 14.12 Ås stasjon, Ås (FJA).

- Dette er siste oppstilling av samtlige kjernebiterfunn. I neste rapport vil kun hekkefunn bli listet.

Lappspurv *Calcarius lapponicus* Sommerfunn

2001: 1 ex 25.7 Åsmosen, Ås (FJA).

- Et overraskende første sommerfunn for arten. Høstens første blåstruper kan dukke opp i slutten av juli hos oss. Kanskje gjelder dette også for lappspurv? Tidligste høstfunn på Fornebo er 19.8-1978.

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Vinterfunn

2001: 1 ex 30.11 (PGY), 2.12 (PGY, GSA, THE) Fornebo, Bærum; 2 ex 1.12 Parrstranda, Drøbak (SJO).

- Dette ligner nok mer på sene høstfunn.

Hortulan *Emberiza hortulana*

2001: 1 M 17.5-15.6 (trolig mislykket hekkforsøk) (SDA), 2 ex 31.5 (PTA) Liermosen, Aurskog-Høland; 3 M 11.5 og 20.5, 2 M 12.5, 25.5, 5.6 og 18.6, 1 M 24.6 (ingen hekking) Grenimåsan, Nes (SDA mfl.); 1 M 17.5-18.6 (ingen hekking) Herremyra, Nes (SDA mfl.); 4 M 11.5, 5 M 1F 20.5, 5 M 1.6 og 18.6, 3 M 24.6 (2-4 F, vellykket hekking for minst 1 par) Flakstadmåsan, Nes/Ullensaker (SDA, KEI).

- Vellykket hekking ble kun registrert på en lokalitet.

Vierspurv *Emberiza rustica* (2-1)

2001: 1 F 5.4 Eldor, Ås (FJA).

- Ett ekstremt tidlig vårfunn. Det er verdt å merke seg ett vinterfunn vinteren 2000-2001 i Sverige. Tidligere funn: 1 M 12.5-1977 Hellesjøvann, Aurskog-Høland og 25.4-1993 Årnestangen, Rælingen.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus* Vinterfunn

2001: 2 ex 2.1 (THE, JNY, JST), 3 ex 7.1 (AGU, PGY), 2 ex 27.1 (GHA), 3 ex 3.2 (ROL, THE, PGY), 4 ex 10.2 (AGU, PGY), 2 ex 17.2 (PGY, NOF), 1 ex 2.12 (PGY, GSA, THE), 3 ex 8.12 (PGY, NOF, GHA), 3 ex 14.12 (TOV) Fornebo, Bærum; 1 ex 6.12 Årnestangen, Rælingen (TAS).

- Vinterfunn fra de to "vanlige" vinterlokalitetene for arten.

Blåtykknebb *Guiraca caerulea* (0-0)

1970: Rettelse: 1 M 14.6 Flateby, Enebakk. Observasjonen er revurdert av NSKF. Kjennelsen ble "ikke godkjent". Dermed er denne arten ikke lenger på listen over arter sett i Oslo og Akershus (eller Norge).

Rapportører og observatører:

ABR = Audun Brekke, ACO = Alison Couldthard, AGU = Andreas Gullberg, AHQ = Atle Helge Qvale, AJF = Asle J. Freberg, AJO = Arild Johnsen, AKV = Amund Kveim, ALA = Arne Labraaten, ALU = Arvid Ludvigsen, ATH = Anders Thylén, ATU = Asbjørn Thune, BBR = Bård Bredesen, BES = Bjørn Einar Sakseid, BFJ = Bjarne Fredriksen, BHL = Bjørn Harald Larsen, BJV = Bent Jarle Vatland, BOT = Bjørn Olav Tveit, CJA = Christer Jacobsen, CKA = Christian Kierulf Aas, CST = Christian Steel, CSU = Christine Sunding, DVA = Dag Vathe, EBE = Espen Bergersen, EBH = Bjørn Einar Holum, EHO = Erling Hobøl, EIG = Eirik Grønningsæter, ELH = Eli Hobøl, ERU = Eyvind Rugland, FFA = Frode Falkenberg, FGG = Fredrik Georg Gade, FGR = Folke Gravklev, FGU = Finn Arnt Guldbrandsen, FJA = Frode Jacobsen, FMÜ = Frode Müller, FNB = Fornebo-gruppen, FNI = Frank Nikolaisen, FRH = Frøydis Haga, FSM = Finn Smestad, GEF = Geir E. Fuglesø, GHA = Geoffrey H. Acklam, GKL = Geir Klaveness, GOH = Geir Otto Holmås, GSA = Geir Sverre Andersen, GSO = Geir Sonerud, GUA = Guttorm Andersen, GUH = Gunnar Halvorsen, GUL = Gunhild Lurås, GUM = Gunnhild Marthinsen, HAK = Hans Erik Karlsen, HAT = Harald Totland, HBI = Håkan Billing, HBL = Hanne Blesvik, HCW = Hans Chr. Waaler, HEV = Halvard Evensen, HFA = Herman Farbrod, HFS = Haakon F. Stenersen, HHA = Håvard Haugsgjerd, HHV = Håvard Hveding, HKV = Helge Kvam, HPK = Hans Petter Kristoffersen, HPR = Hans-Petter Rømme, HRE = Hanne Refsem, JAE = Jon Arne Eie, JAF = Jan Arild Finsen, JAL = Jan Altern, JAS = Jan Erik Aspelund, JBA = Johannes Bråthen Alveberg, JEB = Jan Erik Berglihn, JHK = Jan Helge Kjølsvædt, JLA = Jonas Langbråten, JLØ = Jørn Lønner, JNY = Jarl Nystrøm, JPL = Jan-Petter Larsen, JPS = Jørn Petter Storholt, JRE = Jon Reiegg, JRG = Jørn Roger Gustad, JSA = John Sandve, JST = John Stenersen, JTL = Jan T. Lifjeld, JØD = Jan Ødegård, KAB = Kim Abel, KAJ = Ken Adelsten Jensen, KBE = Kjetil Bekkeli, KBO = Kari Bogen, KBS = Kåre Bent Sunde, KEI = Knut Eie, KEV = Knut E. Vedahl, KHO = Kari Hollung, KIS = Kjell Isaksen, KJH = Kjell Hobøl, KJM = Kjetil Mork, KJO = Kjetil Johannesen, KKN = Ketil Knudsen, KTR = Kirsten Trostad, KWA = Knut Waagan, LAM = Lisbeth Amundsen, LEJ = Lars Erik Johannesen, LGJ = Leif Gjerde, LGR = Lars Grandalen, LTP = Lars Thomas Poppe, MBE = Morten Bergan, MBI = Morten Bilet, MBR = Morten Brandt, MEN = Morten Erik Nordeng, MHA = Morten Hage, MIR = Magnus Irgens, MKL = Magne Klann, MRL = Morten Roger Karlsen Lillebø, NCL = Nicholas Clarke, NGU = Nils Gundersen, NN = ?, NOF = NOF-tur, OBY = Olav By, OHM = Otto H. Mamelund, OJL = Ole Jørgen Liødden, OLU = Oddvin Lund, OMO = Odd Moen, OOL = Ove Olsen, OSK = Ole Skimmeland, PCH = Per Christian Housken, PEG = Per Grandalen, PFE = Paul Fekjær, PGY = Per Gylseth, PST = Per Stensland, PTA = Per Tangen, RAN = Rolf E. Andersen, RFJ = Rune Fjellvang, ROL = Rune Olsen, SAO = Svein Arne Orvik, SDA = Svein Dale, SHE = S. Helmen, SJO = Ståle Johnsen, SRI = Simon Rix, SSA = Stig Sandberg, SST = Steinar Stueflotten, SSÆ = Solve Sæbø, TAS = Trond Aspelund, TEB = Terje Bøhler, TES = Terje Skibakk, TGR = Thomas Grønn, TGU = Terje Gustavsen, THA = Thomas Hansen, THE = Tollef Hølleren, THØ = Trond Høvdde, TJO = Terje Johnsen, TKÄ = Torsten Källquist, TLB = Terje Løvdal Berstad, TLO = Toril Lohne, TLY = Thomas Lyche, TNI = Thomas Nilsen, TOG = Tore Guldbrandsen, TOH = Torvald Helle, TOV = Trond Ove Stakkeland, TRS = Tommy R. Stølen, TRU = Truls W. Andersen, TST = Trude Starholm, TSY = Thomas Sydberger, TSÆ = Thomas Sæter, TØD = Tone Ødegård, UTB = Ulrik Tutein Brennøe, VBJ = Vidar Bjerkenes, VBU = Vegard Bunes, VKR = Vidar Kristiansen, YKV = Yngve Kvebæk, ØHA = Øyvind Hagen, ØMO = Øystein Mortensen, ØSY = Øyvind Syvertsen, ØTR = Øyvind Traagstad

Litteratur:

- Andersen, G.S. 1999: Rapport fra lrsk for Oslo og Akershus for 1996. Toppdykker'n 4/1999.
- Andersen, G.S. 2000: Rapport fra lrsk for Oslo og Akershus for 1997-1998. Toppdykker'n 4/2000.
- Dale, S., Andersen, G.S., Eie, K., Bergan, M. & Stensland, P. 2001: *Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus*. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.
- Gylseth, P. 1999: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 3/1999.
- Gylseth, P. 2002: Ny LRSK-liste. Toppdykker'n 4/2002.
- Haftorn, S. 1971: Norges Fugler. Trondheim.
- SOF 2002: Fågelåret 2001. Stockholm.