

Hekkende sjøfugl i indre og midtre Oslofjord 2025



Hettingmåke ruger foran en vegg av blå aksveronika. Ulvungene, Asker 9. juli. Foto Morten Bergan

Av

Morten Bergan, Ulla Amanda Falch,
Geir Sverre Andersen og Tonny Andersen

Innhold

Sammendrag	3
Bakgrunn	4
Metode	5
Feltarbeid	8
Resultater indre Oslofjord	10
Artsgjennomgang	11
Resultater	41
Tabeller	74

Sammendrag

For å følge utviklingen av sjøfuglbestandene i Oslofjorden gjennomfører Statsforvalteren i Oslo og Akershus jevnlig tellinger av hekkebestandene av de ulike sjøfuglartene. Oppdraget utføres av BirdLife Oslo og Akershus og BirdLife Buskerud (tidl. Norsk Ornitologisk Forening). Tellingene omfatter alle arter hekkende andefugler, vadefugler og måkefugler samt skarvefugler på omkring 150 holmer og skjær i fjordens delområder: Bunnefjorden, Vestfjorden, Drøbaksund (som sammen utgjør og rapporteres som indre Oslofjord) og i Breiangen (midtre Oslofjord). Denne rapporten viser resultatet av tellingene i 2025.

Årets tellinger ga 4429 par i indre Oslofjord totalt (altså summen av Bunnefjorden, Vestfjorden og Drøbaksund), eksklusive gravand og siland som vi bare teller voksne individer av (ikke reir, se under). Dette er en nedgang fra 5250 par i 2023 – en reduksjon på 15,6 %. Tallene for Breiangen er 856 par sjøfugl i 2025 mot 842 par i 2023, en liten økning på 1,7 %.



Nyklekt gråmåkeunge på Nordre Skjælholmen. Foto Morten Bergan

Bakgrunn

Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også et viktig friluftsområde for befolkningen i Stor-Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av ulike menneskelige fritidsaktiviteter, både i strandsonen og til sjøs. Bare i Oslo og Akershus skal det finnes ca. 170 000 fritidsbåter (ref. Batmagasinet.no 6.5.2023) – altså, i 2025, nesten 40 ganger så mange båter som det er sjøfugler i fjorden. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender.

Utover på 1970-tallet ble konflikten mellom sjøfugler og friluftsliv viet mye oppmerksomhet. Etter feltarbeid i 1974 og 1976 ble 24 hekkelokalteter fredet som naturreservater i 1978, samt tre lokaliteter omkring Malmøya, Oslo, som naturminne med fuglelivsfredning i 1979 = 27 lokaliteter til sammen. I 2008 og 2009 ble ytterligere 16 lokaliteter fredet. Det økte antallet fredete lokaliteter i fjorden fredet med formål å verne sjøfuglenes hekkeplasser med fuglelivsfredning og ilandstigningsforbud. Det er ytterligere noen vernete holmer, men dersom verneformålet ikke er sjøfugl så kommer de ikke i «fredet-listen» i denne rapport selv om de også kan huse en betydelig del sjøfugler. I tillegg kommer det seks lokaliteter i Breiangen, alle fredet som naturreservater inklusive sjøfugl i perioden 1977–2009 samt Nordre Sauholman i Sonsbukta, Vestby fredet 2009.

I tillegg til den naturlige sjøfuglbestanden i fjorden så har det fra slutten av 1970-tallet etablert seg tre gåsearter i fjorden. Opprinnelig skyldtes dette utsettinger og rømlinger fra dyreparken på Ekeberg i 1970-årene, men i senere tid også på grunn av innvandring via bestandsøkning fra sørlandskysten (grågås) og Sør-Sverige (hvitkinngås). Alle disse gåsebestandene økte utover på 1980-, 1990- og 2000-tallet. Samtidig ble det meldt om økende problemer knyttet til tilgrising av grøntområder og badesteder med gåsemøkk, og i noen grad beiteskader på kornåkre i innlandet (kanadagås). Forvaltningsmyndighetene har valgt å svare på dette ved å gjennomføre ulike bestandsregulerende tiltak slik som punktering av egg i rugetiden og i noen grad ved å tillatte skadefelling. Disse tiltakene ble i hovedsak gjennomført for kanadagås og hvitkinngås i Nesodden, Oslo, Asker og Bærum kommuner, i noen grad også for grågås (i Bærum). Eggpunktering har ikke blitt utført siden 2019 slik at effekten av dette nok er borte fra bestandsutviklingen. Øvrige arter har kun «naturlige» påvirkninger, skjønt noen arter er jaktbart vilt.

For å følge utviklingen av sjøfuglbestandene, både de man ønsker å verne og de man ønsker å redusere i antall, gjennomfører Statsforvalteren jevnlig tellinger av hekkebestandene av de ulike sjøfuglartene. For tiden gjøres dette annethvert år, med en registrering av makrellterne også i det mellomliggende året.

I «mellomårene» 2020, 2022 og 2024 ble vi også hyret av NINA for egne tellinger av ærfugl på grunn av funn av urovekkende mange døde ærfugler i ytre Oslofjord og Skagerrakkysten i 2020. Det var ønskelig med et referanseområde i indre del av Oslofjorden. Disse tellingene ble utført til samme tid og på de samme lokalitetene som våre normale sjøfugltellinger. Tallene for disse tellingene er derfor direkte sammenlignbare og inkluderes derfor i grafen for ærfugl. Samtidig med disse spsialtellingene for ærfugl talte vi da også noen arter som det var enkelt å følge opp i tillegg: knoppsvane, storskarv, gravand og siland.

Oppdraget settes ut til BirdLife Oslo og Akershus og BirdLife Buskerud. Denne rapporten viser samlet resultat av tellingene i indre Oslofjord og i Breiangen i 2025.

Metode

Foruten tilfeldige tellinger på 1950-tallet ble sjøfuglkolonier i Oslo og Akershus talt opp første gang i 1974 og 1976, i 1976 i en stor del av det nåværende rapportområdet. Det var årlige tellinger 1978–1991, deretter tellinger annethvert år. Fra og med 1981 har tellingene omfattet alle skjær, holmer og øyer i Oslo og Akershus innenfor Drøbak, noe mer sporadisk i Buskerud, men fra og med 1995 har det vært sjøfuglregistreringer i hele indre Oslofjord så vel som i Breiangen. Naturreservatet Nordre Sauholman i Sonsbukta, Vestby er normalt ikke med i våre tellinger da lokaliteten ligger så langt unna de øvrige lokalitetene at det var upraktisk å reise helt dit. På grunn av så mange historiske hull inngår ikke Sauholman i grafene.

Registreringene oppgis i **antall par** dersom intet annet er oppgitt, og har blitt utført etter samme metodikk som tidligere:

- a. Ilandstigning på lokaliteten i hele rapportområdet og opptelling av faktisk funne, bebodde, reir, eventuelt observasjon fra båt for arter som hekker svært åpent og lett tilgjengelig på lokaliteter uten særlig vegetasjon. Tellingene utføres i midten av mai, før klekketid som er i dagene omkring 20. mai (for de tidligste måkeartene: svartbak og hettemåke).



Eksempel på lokalitet som lar seg telle fra båt uten ilandstigning. Bergarten med lyse kalksteinsbenker gjør det enkelt å «følge fjellet» med kikkert fra båt i stille sjø. Nakkeskjær i Oslo. Foto Morten Bergan

- b. Observasjoner av klekte gåsekull. Grågåskullene klekker ofte før våre tellinger hvorpå de forlater hekkeplassen og svømmer omkring til egnede lokaliteter med ungene. Det finnes grågåskull på fjorden så tidlig som i siste uke av april. Vi registrerer da disse kullene på den lokaliteten der de ble observert. Dette kan virke noe tilfeldig for eksakt hekkeplass er jo ukjent. I større og større grad ser vi også hvitkinngjess med kull på vannet. Dette er sikkert et resultat av tidligere hekking på grunn av større bestand som gir mer konkurranse om gode hekkeplasser. Kanskje kombinert med tidligere vårer. I år måtte vi føre opp ærfugl på samme måte, altså kull på vannet på grunn av uvanlig tidlig klekking.
- c. Supplerende tellinger av rugende makrellterner i Oslo, Ås, Nesodden, Asker og Bærum omkring 10. juni. Dette fordi ternene hekker på et senere tidspunkt enn måkene. Vi kan da ikke gå i land på grunn av klekte måkeunger. Ternene telles derfor fra båt. De hekker normalt på lave og oversiktlige partier slik at denne metoden virker godt, selv om noen steder kan være hemmet av vegetasjon. Separate ternetellinger har blitt utført også i mellomårene siden 2012 av, altså årlig. Ternetellinger suppleres ikke fra Drøbaksund eller Breiangen. Ternetallene våre er derfor antagelig noe lavere enn den virkelige bestanden. I noen grad suppleres tallene for fiskemåke og sildemåke på denne telledagen da deler av disse bestandene har senere egglegging. Vi bruker da det høyeste tallet for disse.

- d. Telling av voksne gravender og silender observert i rapportområdet i midten av mai. Disse to artene hekker gjemt i hulrom slik at vi ikke finner eksakte reir. Derfor brukes en metode som skiller seg fra de øvrige sjøfuglartene. For disse to artene så telles antall individer! Usikkerheten i disse tallene er nødvendigvis større da også trekkende individer kan oppholde seg i fjorden på denne tid. Dette gjelder nok mest for den senthekkende silanda. En periode på 1990-tallet ble det også utført egne silandtelling i midten av juli måned på en tid da silanda hadde små unger, og arten ble vurdert som sjeldnere enn i dag. Trenden for funne kull på vannet samsvarte godt med antall individer observert slik at disse sommerregistreringene opphørte etter 2000-sesongen.

Merk, igjen, at vi teller antall hekkende par. Det er dette som oppgis i vedlagte tabellverk. Tallene føres inn i BirdLife OAs innrapporteringsside under prosjekter – da som antall individer der ett par = to individer, som jo ikke er korrekt for eksempel andefugler.

Tabellene er ordnet i én for fredete lokaliteter og én for ikke-fredete lokaliteter. Dersom en lokalitet var uten hekkende fugl vil fredete lokaliteter fortsatt stå oppført i tabellene, men da, selvsagt, med null. Men vi har vært der! Ikke-fredete lokaliteter uten fugl blir ikke tabellført.

Vi kaller alt innenfor Storskjær–Småskjær ved Storsand–Drøbak for indre Oslofjord, som vi separerer i **Bunnefjorden**, **Vestfjorden** og **Drøbaksund**, og alt fra øyene utenfor Hurumlandet sør for Filtvedt–Tofte for **Breiangen** i lokalitetspresentasjonen og i tabellene. På grunn av de ikke helt identiske årene det er talt for Akershus vs. Buskerud har vi valgt å ha separate kurver for de to delområdene i den grafiske fremstillingen, fortsatt da merket henholdsvis OA og BU (Oslo og Akershus og Buskerud) i grafene for indre Oslofjord.

Presentasjonen av lokaliteter blir geografisk fordelt på Bunnefjorden, Vestfjorden, Drøbaksund og Breiangen. Dette matcher heller ikke helt med kommunegrenser da vi for eksempel legger hele Lysakerfjorden til delområde Vestfjorden (selv om noe ligger i Oslo).


Enkelte lokaliteter mangler offisielle navn. Disse har blitt navnsatt av oss grunnet vårt behov for et stedsnavn – som Feilskjær, Solskjær, Paddeskjær etc. Disse lokalitetene finner man altså ikke på kartverk, men ble opplistet og omtalt i 2007-rapporten. Noen slike påfunnsnavn har blitt adoptert av det offentlige, som Nakkeskjær. Noen av de mindre brukte av disse står i anførselstegn i tabellverket, men vi har også skrevet inn en nærliggende «moderlokalitet» slik at det skal være mulig å finne frem til den navnløse på et kart. Vi nevner alternativ navngiving på lokaliteter der det verserer forskjellige navn på kart og i tradisjon.

Tidligere ble det levert tre rapporter; én for indre Oslofjord i Oslo og Akershus, én for indre Oslofjord i Buskerud (tidligere Hurum og Røyken kommuner) og én fra midtre Oslofjord = Breiangen, som nå også hører inn under Asker kommune. Fra og med i 2021 ble de tre tidligere rapportene samlet i en og samme rapport. Det vil fortsatt være noe forskjell i design på tabellverk etc. mellom indre Oslofjord og Breiangen også denne gangen og, av historiske årsaker, så fortsetter vi å diskutere artsgjennomgangen separat for de to områdene – både for hver enkelt art og på fremstillingen på grafene.

Buskerud hadde en periode på 1990-tallet da det ikke ble avholdt sjøfuglregistreringer i deres del av fjorden. Man kan altså ikke bare summere tall for hekkebestanden i indre Oslofjord for «gamle» Oslo og Akershus og «gamle» Buskerud i tidligere år da noen år mangler. I figurfremstillingen har vi derfor beholdt «gamle» Oslo og Akershus og «gamle» Buskerud som separate kurver i den grafiske fremstillingen. Vi har derfor sluttet å vise egne kurver for fredete vs. ikke-fredete lokaliteter – det ble for mye og uoversiktlig i grafene. Og neppe så veldig faglig nødvendig.

Sauholmane i Sonsbukta, Vestby har blitt sjeldent besøkt da den ligger så alene langt unna alle de andre koloniene (langt å kjøre fra vår base i indre Oslofjord). Lokaliteten ble besøkt i de tre tellingene 2019–23, men på grunn av så store historiske hull inngår Sauholmane derfor ikke i grafene.

Til slutt så gir vi noen observasjoner av ytterligere noen kysttilknyttete arter hjemmehørende i fjorden slike som teist, gråhegre, fiskeørn, havørn og skjærpiplerke, selv om de ikke hekker i selve sjøfuglkoloniene.



Skarvene krever litt mere plass enn før. Her på Sundbyholmene rydder de unna en del av måkekolonien. Foto Morten Bergan

Feltarbeid

Årets tellinger ble gjennomført i perioden 12.–16.mai 2025. Årets datoer er ørlite tidligere enn normalt (14.–20.5.). Dette skyldes observasjon av tidlig klekking for ærfugl med ungekull på vannet allerede i de første maidagene. For å få med disse ærfuglkullene, før ungene ble svartbakmat, dro vi ut et par dager tidligere, men ikke så tidlig at det ville bli feil med hensyn på andre arter. Da ble tellingene utført slik: Ytre Vassholmen i Bærum og ytre (nordre) Bunnefjorden 12.5., utenskjærs i Bærum, Lysakerfjorden, innerst i Bunnefjorden og Vestfjord-siden av Nesoddløndet (Steilene) 13.5., innenskjærs i Bærum og «gamle» Asker 14.5., Drøbaksund 15.5., Breiangen 16.5. Sauholmen skulle registreres av andre, men vi har ikke lyktes med å se resultatet utover noe på Artsobservasjoner.no.

Egne «ternetellingene» ble gjennomført i Bunne- og Vestfjorden, det vil si Ås, Nesodden, Oslo, Asker og Bærum kommuner den 11. og 12.6., og lokalitetene i Blakstadbukta, Asker ble talt den 7.6.

Vi har tidligere blitt bedt om å vurdere hekkeresultat for hettemåke og makrellterne spesielt grunnet nasjonal nedgang i bestanden for disse to artene. Dette er ingen enkel oppgave da unger kan ligge gjemt i vegetasjonen, som jo er høyere utover i juni enn i mai måned, men en kvalitativ vurdering vil bli nevnt under disse to artene og, sporadisk, under lokaliteter med kolonier av de to artene.

Våren og forsommeren 2025 var preget av mye pent og tørt vær, men kjølige netter. Det var en del vind som gjorde det vanskelig med landgang på utsatte lokaliteter slik at noen lokaliteter da ble talt av én person ilandsatt og den andre i båt.



Feltarbeid på Rauskjæra. Notere observasjoner underveis er alltid lurt. Foto Morten Bergan

Kart over undersøkelsesområdene med lokaliteter med hekkende sjøfugl i 2025 anvist med røde markører.



Kart over hele kartleggingsområdet, med lokaliteter i indre Oslofjord med Bunnfjorden, Vestfjorden, Drøbaksund og Breianger, samt Sauholmen i Sonsbukta. Tre punkter langs Hurumlandet (det ene er det sørligste punktet i Drøbaksund) er samlepunkter for observerte ærfuglkull. Områdeavgrensning mellom de angitte fjordavsnittene er gitt med blå strek.

Resultater indre Oslofjord

Årets tellinger ga 4429 par i indre Oslofjord totalt (altså summen av Bunnefjorden, Vestfjorden og Drøbaksund), eksklusive gravand og siland som vi bare teller voksne individer av (ikke reir, se over). Dette er en nedgang fra 5250 par i 2023, og en reduksjon på 15,6 % i indre Oslofjord. Tallene for Breiangen er henholdsvis 856 par sjøfugl i 2025 mot 842 par i 2023, her en liten økning (+1,7 %). Se tabellverk for detaljer.

Variasjoner innen de ulike artene fra år til år er vanlig blant sjøfugler. Bestandsendringene varierer mellom de forskjellige artene og vi henviser til artsomtalen for detaljer. Her en status om endring fra siste telling i 2023, der hvor endringen er større enn ca. fem prosent, og langtidstrendene over tid:

- Knoppsvane **liten økning** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Kanadagås **stabil** fra 2023, **negativ** langtidstrend = ønsket utvikling – kanadagås en fremmedart.
- Hvitkinngås **økning** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Grågåås **liten nedgang** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Gravand **nedgang** fra 2023, **negativ** langtidstrend.
- Ærfugl **liten økning** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Siland **liten nedgang** fra 2023, fluktuerende trender, nå **positiv** langtidstrend igjen.
- Stokkand for lav bestand til å vurdere, **negativ** langtidstrend.
- Tjeld **stabil** fra 2023, **negativ** langtidstrend, men **stabil** i Breiangen.
- Sandlo for lav bestand til å vurdere
- Strandsnipe **økning** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Rødstilk utgått? Uansett for lav bestand til å vurdere.
- Makrellterne **økning** fra 2024 og **stabil** siden 2023, **negativ** langtidstrend.
- Hettemåke **nedgang** fra 2023, **negativ** langtidstrend.
- Fiskemåke **økning** fra 2023, **negativ** langtidstrend.
- Gråmåke **nedgang** fra 2023, **negativ** langtidstrend, men **stabil** i Breiangen.
- Svartbak **liten økning** fra 2023, **positiv langtidstrend** eller **stabil** siden sekelskiftet.
- Sildemåke **nedgang** fra 2023, usikker trend(?), trolig **negativ** i Breiangen.
- Storskarv **økning** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Fiskeørn. **Stabil** fra 2023, **positiv** langtidstrend.
- Skjærpiplerke **stabil (?)**, men **positiv** langtidstrend. For liten bestand til å vurdere.



Mye fugler i lufta på Vealøs når vi er i land. Tofteholmen i bakgrunnen. Foto Tonny Andersen

Artsgjennomgang

Under presenterer vi årets telleresultat for hver enkelt art sjøfugl totalt på de undersøkte lokalitetene i henholdsvis indre Oslofjord og i Breiangen, der utviklingen er samlet på en og samme graf. Merk at grafens kurver for indre Oslofjord presenteres todelt: som «gamle» Oslo og Akershus (OA) og som «gamle» Buskerud (BU) = nå Askers del av Drøbaksumd. Dette gjøres av historiske grunner da det mangler noen år med tellinger i Buskerud slik at det da blir vanskelig å addere år i helt ny graf, forklart foran. Der det er årlige registreringsdata har grafene heltrukken linje, for øvrig punktvis.

KNOPPSVANE *Cygnus olor*

Indre Oslofjord:


Totalt 24 par hekkende knoppsvane hvorav 20 par i «gamle» OA og 4 par i «gamle» Buskerud. Langtidstrenden er klart positiv. 24 par er ett mer enn i 2023 og med omtrent samme fordeling (da 19 i indre og 4 i «BU»). Knoppsvanen har altså hatt et rimelig godt hekkeår også i 2025. Det er godt med ålegress i grunne mudderbukter (i motsetning til hva media skriver (!)), så det burde være godt med svaneføde mange plasser. Dog en del lurv (trådalger) utover sommeren.

Ofte hekker et svanepar i Engervannet i Sandvika, som også hører til oslofjordbestanden da de svømmer ut Rønne elv til fjorden etter klekking. Men vi kjenner ikke til hekking her i 2025.

Svanene krever normalt hele lokaliteten for seg selv, altså bare ett hekkepar per lokalitet. Men også i år hadde vi to svanepar på én lokalitet – på Søndre Skjælholmen i Bunnefjorden.

Breiangen:

Fire par ruget hvilket er tangering av rekorden fra 2023. Svanene hekket på Ersvikskjær, Mølen, Ranvikholmen og på Saltskjær. Svanehekking på Saltskjær er ny lokalitet, men svaner er jo vanlige inne på Grunnane i Svelvik. Samme antall som sist, som da var ny rekord for Breiangen, men vi fant bare to par i mellomåret 2024.



Figur 1. Knoppsvane. Antall hekkende par indre Oslofjord 1979–2025. Første svaneparet ble funnet hekkende i 1993, første i Breiangen i 1995.

Ringmerking viser at knoppsvanene er meget lokale i sin tilstedeværelse gjennom året.

KANADAGÅS *Branta canadensis*


Etter flere år med målrettet innsats for å redusere bestanden av denne introduserte arten (eggpunktering siden 1989 av, jakt siden 1992) er det nå ikke mange kanadagåsparene igjen i fjorden. Bestanden har ligget på ti par og færre siden 2015.

Indre Oslofjord:

Det ble funnet 9 par i 2025, opp fra 8 par i 2023 og 5 par i 2021, men det var bare 3 par i mellomåret 2024. Det var langt flere før i tida med toppårene på 58 par (OA) i 1992 og 7 par (BU) i 2003. Vi merker oss at hele fem av de ni parene i år ligger i Askers del av Drøbaksund («gamle Buskerud») mens det var ingen på Frogn-siden av fjorden.

Breiangen:

Siden 2021 har det ikke blitt funnet noen rugende kanadagås i Breiangen, ei heller i år. Rekordårene med 4 par er så langt tilbake som 1995 og 2005.



Figur 2. Kanadagås. Antall hekkende par indre Oslofjord 1975–2025. Første kjente hekkefunn i indre Oslofjord ble gjort i 1979. Første hekkefunn i Breiangen i 1995 og siste i 2019.

HVITKINNGÅS *Branta leucopsis*

Hvitkinngåsa hekker tidligere og tidligere år for år. Det innebærer at vi ser et økende antall kull på sjøen ved våre tellinger der vi ikke kjenner til eksakt hekkeplass. Dette er samme problemstilling som for grågås, bare i mindre omfang, og et nokså nytt fenomen for hvitkinngåsa.

Hvitkinngåsa i Oslo og Akershus er knyttet til fjorden med det første hekkefunnet i 1979. Det startet inne i Oslo og spredte seg sørover. Det første paret i Breiangen ble funnet i 1999. Etter som fjordbestanden økte så har enkelte par også begynt å hekke i kystnære strøk i Oslo: Østensjøvannet i 2001 og 2003, på Valle Hovin 2010, Maridalsvannet 2014–2018 og Ulsrudvannet 2024. Det hekker også enkelte par hvitkinngås i Nordre Øyeren fra 2009 av (Karte) og med en tydelig økning i sted i deltaet og antall fra omkring 2020.

Indre Oslofjord:

Totalt fant vi 462 par hvitkinngås, dette er opp fra 440 par i 2023 (+5 %). Årets resultat er ny rekord igjen, av disse var 434 par i «gamle» OA og 28 par i «gamle Buskerud». Arten øker jevnt og trutt, selv om akkurat «gamle Buskerud» gikk ned fra 38 til 28 par. Nordre Bunnefjorden har fortsatt de fleste større koloniene. Det har vært eggpunktering i Bunnefjorden i en årrekke (2006–2019) uten synderlig effekt på bestandsveksten.


Opp gjennom årene har hvitkinngåsa gått fra å hekke med store deler av bestanden konsentrert i noen få kolonier (Skjælholmene og Bleikøyalven i Bunnefjorden, senere også Vestfjorden med Ytre Vassholmen og omkring Fornebu SV), til også å hekke mer spredt.

Den største kolonien i 2025 var, også i år, Søndre Skjælholmen med 66 par (men ned fra rekordtallet 79 par sist), dernest 52 par på Nordre Skjælholmen (opp fra 25 par), Rauskjæra 40 par, Ytre Vassholmen 37 par, Husbergøya 30 par (inkl. Kalven), Knerten 26 par pluss 13 par på nærliggende Fyrsteilen, og 24 par på Bleikøyalven.

Nedover i fjorden var det 11 par på Sundbyholmene (ned fra 15 par sist) som er største koloni, men det øker på også i Drøbaksundet samt også til innerst i Bunnefjorden med 16 par på Tu- og Flatskjærene (opp fra 13).

Breiangen:

Totalt 39 par hvitkinngås er opp fra 24 par i 2021, og ny rekord også her – igjen. Det første paret ble funnet i 1999. Av de seks lokalitetene i Breiangen er det nå bare Ranvikholmen som ikke huser hvitkinngås. De fleste (17 par), hekker på Mølen, men både Saltskjær og Ersvikskjær huser 8 par hver.



Figur 3. Hvitkinngås. Antall hekkende par indre Oslofjord 1978–2025. Første hekkefunn ble gjort i 1979, i Breiangeln i 1999.



Flere og flere hvitkinngjess har klekt på talletidspunktet, og svømmer da omkring med dununger. Foto Morten Bergan

GRÅGÅS *Anser anser*

Grågås klekker tidlig. I Osloområdet klekker de tidligste allerede de siste aprildagene, og de kan forflytte seg langt fra hekkeplassene før vi registrerer dem på våre tellinger. Vi ser dem der de er når vi teller, ikke der de måtte ha hekket.


Grågås etablerte seg først i Bunnefjorden på slutten av 1970-tallet. Ettersom fjordbestanden økte utover på 1990-tallet startet også reisen til innsjøer i Oslo og Akershus. Først på Østensjøvannet i Oslo i 2003, deretter sporadisk i lite antall her fra 2010 av (i alle fall til 2023, men hekking er ikke rapportert fra 2025). I 2007 var det allerede en rekke innsjøer med hekkende grågås: Verkensvannet og Semsvannet i Asker, Flaskebekktjern i Nesodden og Hellesjøvann i Aurskog-Høland og to år senere (2009) også til Mørkvann og Langvann i Asker og i Hemnessjøen i Aurskog-Høland. Til Bærum i Stovivannet 2010, til Ås i Pollevann 2011 og til Oslo i Maridalsvannet 2012. Til Follo kom grågås som hekkefugl først til Slorene i Årungen 2012. I dag er det en rekke innsjøer med hekkende grågås rundt omkring i det indre Akershus (ref. Artsobservasjoner.no).

Indre Oslofjord:

Grågås hadde et nokså stabilt år i 2025 med 99 par mot 104 par sist i «gamle» OA, men litt ned i «gamle Buskerud» fra 18 til bare 4 par/kull. Tre av disse var pulli i Sætrepollen. Grågåsbestanden har ligget jevnt omkring hundre par i en tiårsperiode, hvorav omkring 80–90 av dem i «gamle» OA og et titall par i «gamle» Buskerud. På Ytre Vassholmen hekket et gåsepar der gåsa var en hybrid mellom grågås og kanadagås, og gassen en ren grågås. Vi har ikke sett fuglen eller kullet i skjærgården i ettertid så vi vet ikke hvordan dette gikk. Paret ble ført opp som grågås.

Breiangen:

Totalt 7 par grågås er litt ned fra rekorden i 2023 med 10 par. Hekkeantallet i Breiangen kan imidlertid virke underlig lavt da det ofte er større ansamlinger av ikke-hekkende flokker langsmed Hurumlandet. Kanskje nyklekte kull, særlig fra Mølen, like gjerne svømmer sør til Horten eller vest til Holmestrand–Sandebukta, endog til Grunnane i Drammen (Svelvik). Der ble det registrert 8 kull med pulli samme dag som vi registrerte i Breiangen (16.5. ref. Artsobservasjoner.no). Disse unngår jo våre øyne, men kan tilhøre Breiangen-bestanden – og mistes i år med tidlig klekking.



Figur 4. Grågås. Antall hekkende par indre Oslofjord 1975–2025. De første gåsekullene klekt i fjorden er kjent fra slutten av 1970-årene. Breiangen første hekkefunn i 1995.



Den rugende hybridgåsa grågås x kanadagås på Ytre Vassholmen 12. mai. Foto Morten Bergan

Indre Oslofjord:


Vi registrerer stadig færre gravender i fjorden, i år bare 22 individer observert i indre Oslofjord – hvorav 18 i «gamle Oslo og Akershus» og 4 i «gamle Buskerud».

Vi finner nå bare noen få gravandpar med unger. Et søk på Artsobservasjoner.no gir bare tre hekkefunn av gravandpar med unger i 2025 (samme som i 2023 – mot fem funn i 2021): Bogen innerst i Bunnefjorden i Ås, Storøykilen på Fornebu i Bærum og Gressholmen i Oslo. I alle fall det siste paret mistet (alle?) ungene sine etter hvert som tida gikk. Alle lokalitetene er tradisjonelle plasser – gjerne mudderbukter med bløtbunn. I tillegg var det også i år ett kull i Engervannet i Sandvika, Bærum. Disse svømmer jo også ut i fjorden, via Rønne elvi løpet av sommeren, så vi kan vel kalle det fire hekkepar.

Det var tre–fire par med unger i hver eneste kil på Fornebulandet i 1970-årene, og det var like mange gravender beitende bare i Viernbukta på Brønnøya som vi nå ser på hele fjordstykket i dag. Vi tenker at gravanda kanskje likte et litt forurenset fjordvann der de lusket i grønsken i mudderbukter og at renseanleggene gjorde fjordvannet for rent for den. Grønne er det jo knapt lenger, erstattet av en rekke arter bruntang i fjæra.

Breiangen:

I 2021 og i 2023 ble det ikke registrert noen gravender i Breiangen, men i år registrerte vi 4 individer. Det har aldri vært mange her, men ligget på 0–2 individer siden 1997.



Figur 5. Gravand: Antall individer observert indre Oslofjord 1989–2025, Breiangen f.o.m. 1997 og buskerudsiden av Drøbaksund f.o.m. 2001.

ÆRFUGL *Somateria mollissima*

Ekstremt tidlig vår medførte ekstremt tidlig hekking av ærfugl i 2025. Dette ble kanskje forsterket av en betydelig overvintringsbestand utenfor Snarøya og Nesoddtangen gjennom hele vinteren – godt med unge blåskjell i fjorden nå. Tidlig hekking medførte klekking allerede i de første maidagene. Derfor bestemte vi oss for å dra utpå noen dager tidligere enn vanlig. Det innebærer på den ene side at det ved våre tellinger allerede hadde vært en del ungepredasjon, slik at tallene kan ha vært noe lavere enn de burde ha vært. På den annen side var det mange kull som bare ble skjønnsmessig vurdert. Hvor mange kull skal man regne med hvis man ser 7 unger i en flokk på sjøen med 4 voksne? Så det ble litt større usikkerhet enn vanlig.

Indre Oslofjord:


Med 1148 par ble det en ubetydelig økning på 12 par fra 2023, men mellomåret 2024 («ærfugltellinger» for NINA) hadde hele 1314 par i samme område (indre Oslofjord). Det ble 975 par i «gamle Oslo og Akershus» og 173 par i «gamle Buskerud». Det er derfor noe fremgang, særlig i «gamle Oslo og Akershus» fra sist og et svært godt resultat for ærfuglen i 2025 med fjordens fjerde beste resultat i «gamle Oslo og Akershus». Kanskje ser vi fjordens bestandstak på disse 1100–1300 parene for ærfugl i indre Oslofjord etter formidabel vekst gjennom telleperioden i førti år.

Da ærfuglen etablerte seg i Oslofjorden var den vanligst i kolonier utenskjærs. I dag ser vi at bestanden er større langt inne i fjorden. Årets rekordkoloni ble, igjen, Søndre Skjælholmen med 93 par, Bleikøyalven 80 par, Husbergøy m. Husbergkalven 65 par, Nordre Skjælholmen 59 par, Storskjær 44 par og Langskjær 43 par. Antall par er altså en del mindre per lokalitet enn slik det var sist, men dette skyldes nok at klekte par kjapt svømmer unna de griske stormåkene og finner fred andre steder. Altså mistet vi noen par på kjente kolonier i år.

Det så ut som god ungeproduksjon utover forsommeren hvilket kan skyldes god vekst av blåskjell langs fjordkysten.

Breiangen:

Totalt 246 par ærfugl i Breiangen var en økning fra 214 par i 2023 og 152 par i 2021. Årets resultat er det nest beste registrert noensinne. (Rekordhøyt tall 267 par under NINAs spsialtelling i 2020). Noe av det svake resultatet i 2021 kan skyldes noen dager senere telletidspunkt dette året – det vil si flere klekte unger (som allerede hadde blitt måkemat og borte fra observatørkorpset). Flest ærfugl hekket også i år på Ersvikskjær med 78 par, Tofteholmen 46 par og Mølen 39 par. Også i Breiangen var det, selvsagt, tidlig klekking i 2025 og hele 51 par ungekull lå på vannet langs kysten Tofte–Rødtangen. Mange av disse kullene har nok hekket på øyene der vi teller, og kan forklare et noe lavere antall rugende hunner i koloniene.



Figur 6. Ærfugl. Antall hekkende par indre Oslofjord 1975–2025, første kjente hekking i Vestfjorden 1979. Breiangen f.o.m. 1980.



Ærfuglhunn blant bruntang i fjæra. Foto Morten Bergan

SILAND *Mergus serrator*

En art som hekker veldig sent på året, det normale er å se ungekullene først medio juli. Vi teller derfor opp antall individer vi ser medio mai. Da med fare for å inkludere senttrekkende individer som egentlig skal videre nordover. Men vi tenker at trendene betyr noe. Det ble i en periode utført sommertellinger av silandkull i juli måned. Disse tellingene viste at det var en høy grad av samvariasjon mellom antallet individer som vi teller opp og det faktiske antallet vellykkede hekkinger i fjorden.

Indre Oslofjord:


Med 325 individer observert i indre Oslofjord ble dette året en liten nedgang fra 345 i 2023. Det har vært en tidsmessig berg-og-dal-bane-trend i bestanden siden tiden med bare noen få observasjoner i 1970-årene og opp til maksimum 438 individer i 2005, deretter nedgang til 207 i 2017, og jevn oppgang igjen frem til 2024. Årets resultat bryter denne linjen ørlite. Det var eksakt 300 individer i «gamle Oslo og Akershus» mens vi på «gamle Buskerud-siden» av fjorden fant 25 individer, noe som er temmelig normalt her i et bånd på 23–47 individer siden 1997.

Det er uansett mere siland i fjorden nå enn det var før sekelskiftet. Vi forklarte økningen i antall siland i indre Oslofjord med bedret siktedyp etter at renseanleggene kom i drift og gjorde fjorden renere. Da ble det lettere å fange småfisk for silanda. Hvorfor antallet da gikk ned igjen etter 2005 må skyldes andre faktorer.

Vi tør ikke si om den registrerte endringen de siste årene utelukkende gir uttrykk for endringer i den lokale hekkebestanden. Noen fugler er nok fortsatt på trekk.

Breiangen:

Bare 12 individer observert i Breiangen er lite, men det pleier da heller ikke å være mer her nede. Det var heller 2023-tallet på 22 ind. som var høyt.



Figur 7. Siland. Antall individer observert indre Oslofjord 1991–2025. Breiangen f.o.m. 1997.

LAKSAND *Mergus merganser*

Laksanda er ikke en art for sjøfuglkolonier, og vi finner normalt ikke laksanda hekkende i fjorden. Ingen kjente hekkefunn (observasjon av ungekull) er meldt fra selve fjorden i år, men det er rapportert et laksandkull i Åroselva 11. mai (Artsobservasjoner.no), ikke veldig langt fra fjorden. Det ble også observert 7 individer i Holmenbukta 25. juni som kan ha vært et ungekull. En laksandandrik som lenge har hatt tilhold i kilene på Fornebu har blitt observert kurtiserende silandhunner ved et par anledninger. Vi kjenner ikke til noe resultat av dette.

STOKKAND *Anas platyrhynchos*

Indre Oslofjord:


Vi fant rugende hunner bare på fire lokaliteter i år, hvorav tre i «gamle Oslo og Akershus»: NØ Askholmen, Geitungholmen (fredete lokaliteter), på Fyrsteilen og Rauskjæra.

At vi finner så få rugende stokkandhunner skyldes kanskje at stokkanda ikke lenger har så mange hettemåkekolonier å gjemme redet i. Andre faktorer kan være en stor gåsebestand og/eller øket predasjon fra stormåker på egg og unger. Det er mink på Steilene. Endelig kan det hende at effektiv rensing av avløpsvannet til fjorden har gitt mindre gunstige næringsforhold for både voksne og unger, slik vi også ser hos gravanda.

Noen flere par hekker det likevel på øyer og på fastlandet, på steder hvor vi ikke oppdager dem under våre tellinger da vi fokuserer på holmer og skjær – sjøfuglkolonier. Dessuten er stokkanda fleksibel, og sene kull og omlagte kull er ikke uvanlig. Disse blir jo ikke med i noen opptelling. Bestanden er derfor større enn våre tall tilsier, men definitivt mindre enn den var i 1970 og -80-årene.

Breiangen:

Ingen hekkefunn av stokkand i Breiangen i år. Som i indre fjord, vet vi jo at det hekker enkeltpar langsmed kysten av Hurumlandet som tellingene ikke får med seg da vi fokuserer på øyene.



Figur 8. Stokkand. Antall hekkende par indre Oslofjord 1980–2025. Breiangen f.o.m. 1987.

TJELD *Haematopus ostralegus*

Indre Oslofjord:


Totalt 75 par er tre par opp fra 72 par sist i Oslo og Akershus. Det er nok likevel en negativ bestandstrend i det lange bildet, ned fra de 110–130 par på 1990-tallet. 2019 var det dårligste året siden 1982, med 65 par, siden da har det jo gått litt opp igjen.

Det pleier å være 1–3 par på hver holme i fjorden, med opptil 4 par slik vi hadde på Ytre Vassholmen. Et tjeldepar ruget i en hekkeplattform i strandkanten på Nebba i Ås. Bra blåskjellforekomst kan forklare mange oppvokste tjeldunger i år.

Noen få tjeldepar unngår våre registreringer – for eksempel kan det være ett og annet par langsmed de større øyene som vi ikke får med oss. Vi har derfor alltid vurdert antallet som i underkant av faktisk bestand. Dette er metodisk likt for hvert år. I likhet med en del måker, som i økende grad hekker på flate industribyggtag, gjelder dette også noen få par tjeld. Vi vet det ofte har hekket ett par på taket på Vækerø og ett par hekker på taket hos Equinor (tidl. Statoil) på Fornebu. Mange tjeldeparene er dette dog ikke.

Breiangen:

Totalt 13 par hekkende tjeld er litt opp fra de sedvanlige 9 parene de siste fem tellingene, og nokså normalt fra tiden omkring sekelskiftet (maks 23 par i 1999). Hele 6 av parene hekket på Mølen. Så er Mølen ganske så stor.



Figur 9. Tjeld. Antall hekkende par i indre Oslofjord f.o.m. 1974 (Buskerud)–2025. De første årene er underestimert. Breiangen f.o.m. 1980.



Tjelden skvalder nervøst, men snart er den opptalt, og vi forlater lokaliteten. Foto Morten Bergan

SANDLO *Charadrius hiaticula*

Indre Oslofjord:

Sandloa har en meget liten hekkebestand i fjorden der Gressholmen og Fornebu er de best kjente hekkeplassene i indre fjord. Hvorvidt det ble hekking på Fornebu i 2025 er uavklart da ingen unger er rapportert. Sandloa registreres ikke som hekkende i sjøfuglkoloniene, men det er i år rapportert ungekull i Solvikbukta på Høvik, Bærum 19. juni (Artsobservasjoner.no). Dette er en gammel lokalitet for både sand- og dverglo. Hekkingen på Gressholmen ble rapportert som mislykket også i år, men en måneds tid deretter ble det rapportert som vellykket – trolig et vellykket omlagt kull.

Breiangen:

Det ble ikke registrert sandlo i Breiangen i 2025 heller.

DVERGLO *Thinornis dubius*

Dvergloa har en enda mindre hekkebestand i fjorden enn sandloa. Hekking langs fjorden har ikke blitt positivt konstatert i 2025, men arten hekket på Fornebu, Bærum. Her registreres dvergloa mest inne på mudderbankene i Storøykilen, men hekkingen er nok lenger inne på Fornebuhalvøya. Flere av observasjonene etter at ungene er klekt har også blitt gjort i tilknytning til de nye dammene innerst i Storøykilen.

STRANDSNIPE *Actitis hypoleucos*

Vi ser flere og flere strandsnipper på våre telledager langsmed fjorden. Men strandsnipene er også på vårtrekk på omtrent samme tid (medio mai). Like vel, vi aner oftere enn før at de oppfører seg stedstilknyttet med leiklignende lydytringer som tilsier hekking fjordlangs. De færreste sjøfuglkoloniene vil uansett ikke fungere som hekkeplass for strandsnipe – til det er lokalitetene for små. Strandsnipene vil ikke trives blant andre hekkearter i en koloni, de er einstøinger på hekkeplass – nær kysten et sted.

Indre Oslofjord:

Historisk har noen reir blitt funnet, for eksempel på Lilleøya, Fornebu 2013 og på Borøya 2017 i Bærum. Men dette er på tilfeldige turer vekk fra fjæra på større øyer. Interessante lokaliteter der vi tenker oss hekkeplasser i 2025 er: Bonn innerst i Bunnefjorden, Lilleøya og Torvøya på Fornebu og Ostøya og Borøya i Bærum, Brønnøya og Leangbukta i «gamle» Asker, Sandspollen i Asker, Selskjærbukta på Nordre Håøya og Hallangspollen i Frogn.

Breiangen:

I Breiangen var det sterke hekkeindikasjoner av strandsnipe hvorav temmelig sikkert to territorier på Tofteholmen og på Mølen.

RØDSTILK *Tringa totanus*

Vi registrerte ingen klare hekkeindikasjoner på rødstilk i år, men vi iakttok arten på flere lokaliteter med hekkeindikasjon i form av oppflukt eller varsling.

Vår tellemetodikk er dog ikke særlig godt egnet for å følge rødstilkbestanden da vårtrekket foregår samtidig.

TEIST *Cephus grylle*

Det hekker ikke teist i indre eller midtre Oslofjord, men det ses stundom enkeltindivider gjennom sommerhalvåret. Ett hekkefunn er likevel rapportert på Artsobservasjoner.no i 2022 da 2 individer ble sett Sandbukta i Bunnefjorden, straks nord for Ingierstrand i Nordre Follo kommune 16. juni, og med aktivitet «reir med egg eller unger» uten nærmere beskrivelse.

Fra 2025 er det bare kjent to funn fra antatt hekketid hvorav 2 individer ved Sundbyholmene, Asker 7. juni er av interesse. To dager senere ble ett individ sett flyvende ut Drøbaksund fra Hulvik, Vestby (ref. Artsobservasjoner.no).

MAKRELLTERNE *Sterna hirundo*

På grunn av ternenes senere egglegging (omkring 20. mai og utover) foregår telling av terner heller i tidsrommet omkring 8.–18. juni. I år ble ternetellingene utført 11.–12. juni bortsett fra Blakstadbukta som ble talt 7. juni og indre Bunnefjord (Tu- og Flatskjær) 30. mai. Makrellterne registreres også i mellomårene mellom hovedtellingene for alle arter. Slike ternetellinger forgår bare i Vest- og Bunnefjorden slik at Drøbaksund ikke er med i tallene fra mellomårene. Her er uansett neppe mer enn 12–20 par.

Selv etter dette talletidspunktet kan det være eggleggende terner slik at bestandstallet nok er noe i underkant.

Indre Oslofjord:

Med 142 par er dette omtrent likt som 147 par i 2023, men godt opp fra bare 51 par i det rekorddårlige året 2024, selv om vi kan tenke oss et lite dusin reir i tillegg nede i Drøbaksund dette året (terne inventeres ikke der). Særlig Storskjær i Hallangspollen er en god kandidat, og i år fant vi 6 par som etablerte seg der i mai.

Ternene samles i små kolonier der årets største, også i år, var Geitholmen (Geita) utenfor Snarøya, Bærum med 25 hekkepar og den nordlige halvøya Loffen på Nakholmen, Oslo også med 25 par. Dernest 19 par på Flatskjæret i Ostbukta (Svartskjæra NR), Bærum og 14 par på Lille Bjerkøyskjær, Asker. Interessant med en reetablering av makrellterne på Ulvungene ved Nesøya, Asker, med 9 par sammen med åtti par hettemåker. Ni par også på Fyrsteilene der det ble satt opp en egen terneinnhengning for å beskytte mot mink helt sør på øya. Da flyttet ternene heller til lenger nord på øya for å slippe å hekke inne i en slik innhengning.

Klassiske lokaliteter som Kråkholmen i Blakstadbukta, Asker og Nakkeskjær ved Nakholmen, Oslo hadde henholdsvis bare 4 og 3 par. Derimot etablerte det seg 5 par på Rosenholmen ved Gåsøya, Bærum. Dette er nytt.

På «gamle» BU-siden av fjorden er det interessant å merke seg at det også i år hekket 6 par på det lille skjæret på innsiden av Morbærholmen i Nærnesbukta – «Morbergskjær». Vi har hatt dem hekkende der siden 2022. Vi så ingen terner omkring «Sandpollskjær» i Sandspollen, og det ligger heller intet her på Artsobservasjoner.no.

Vi har sjekket opp hekkesuksessen til ternene i noen av koloniene og tror at det har gått veldig bra med hekkingen på Lille Bjerkøyskjær og på Ulvungene i Asker og på Flatskjær ved Ostøya, Bærum, der fuglene i alle tre koloniene hadde store unger ultimo juni og utover i juli. De voksne kom med mat, som så ut som brisling, alle steder. Det var flygedyktige unger rundt omkring i Ostbukta i Bærum 08.07. – ungene fra Flatskjæret. Det var også unger i kolonien på Loffen på Nakholmen 14. juni der noen velvilligst har satt opp skilt om ikke å ferdes utover halvøya. Kolonien på Geita, derimot, har nok blitt halvert eller mislyktes da det var færre fugler i kolonien, og fortsatt noen rugende fugler (omlegging?) 30. juni. Høy vegetasjon (mye hjorterot) gjorde det imidlertid vanskelig å få full oversikt fra sjøen. Geitholmkolonien mislyktes også i 2024 (men det gikk bra i 2023). Mon tro om det er folk som herjer? Vi tror også at ternene mislyktes på Fyrsteilene (Larson pers.medd.).


Breiangen:

Totalt hekket 10 par makrellterne i Breiangen i 2025. Ni av parene hekket i sørvendt skråning like ved gjestehavna på Ranvikholmen. Ett par hekket på Ersvikskjær.

Kolonien nord på Mølen, der fuglene hekker helt nede i strandkanten så vi ikke noe til i 2025, og finner heller intet om dette på Artsobservasjoner.no.

Siden den nyetablerte kolonien på Ranvikholmen lå så nær gjestehavna var vi sterkt bekymret for dens videre fortsettelse, men vi kjenner til en stadfestelse av kolonien med observasjon av 22 ind. den 14. juni (ref. Artsobservasjoner.no) så trolig gikk hekkingen bra. Tjueto individer tilsvarer heller 11 par enn våre 9 par den 16. mai.

Sauholmene: Ut fra informasjon på Artsobservasjoner.no vet vi at det må ha hekket et femtentall terner på Sauholmane da 26 pulli er rapportert Nordre Sauholmen 01.07. Disse er ikke tabellført og ikke med i noen graf.



Figur 10. Makrellterne. Antall hekkende par indre Oslofjord 1974 (Buskerud)–2025. Breianger f.o.m. 1980.



Makrellternefar (eller -mor) med nyfisket brisling til skrikerungen. Ulvungene 9. juli. Foto Morten Bergan

HETTEMÅKE *Chroicocephalus ridibundus*

Indre Oslofjord:

Det ble bare registrert 925 par hettemåke hvorav 853 par i «gamle OA» og 72 par i «gamle» BU. Dette er en reduksjon fra 1337 par sist. Hettemåkebestanden har ligget nokså stabilt på omkring 1300–1600 par i en årrekke (siden 2013 av) etter den kraftige reduksjonen fra og med 1987 av (toppåret med 14 127 par bare i Oslo og Akershus + 804 par i BU (som hadde sitt toppår 1431 par i 1981)). I år fikk bestanden altså nok en knekk. Bestanden på nærliggende Østensjøvannet har også fått knekk, her hekket bare noen ytterst få par som fikk 1–4 unger (Skrindo pers.medd.).

Ingen store kolonier slik at årets vinner ble Tuskjær i Ås med 197 par (opp fra 131 par sist) og Nakkeskjær med 139 par, dernest 80 par på en reetablert koloni på Ulvungene i Asker. Alle tre koloniene ble sjekket opp i juni og alle hadde tilsynelatende god ungeproduksjon. En koloni på Djupalsteinen og en koloni sør på Skogerholmen, med bare et sund imellom hadde henholdsvis 69 og 51 par, gikk det derimot ikke så bra med. Geitholmen i Bærum har hatt en bra koloni i noen år, selv om den ble ramponert i 2022. Her fant vi ingen par under tellingene, bortsett fra 17 par på den lille Geitungen. Disse gikk det bra med, og noen få titalls par etablerte seg etter hvert også på Geita – omlagte kull? Kolonien på Bleikøyalven hadde 57 par, og ligger på en diger diabasgang mot sørøst, inn mot bukta til slippen. Like vel, eller nettopp derfor, går hekkingen bra her. Vant til folk? Vi noterer også Purka ved Lindøya, Oslo, med 59 par og en koloni SØ på selve Nakholmen med 55 par.


Siste tellings vinnere Fyrsteilene hadde bare 18 par og Kaffeskjær lå tomt. Mange andre skjær, som Langskjær, Lagmannsholmen lå også tomme for hettemåker.

I Drøbaksund Frogn hekket kun 6 par på Stakaskjær i Hallangspollen.

I «Gamle Buskerud» hekket 68 par på Holmegrunnsmoloen, som ble bygget som bølgebryter ute i Nærnesbukta for noen år siden. I tillegg hekket to par på det lille skjæret ved Morbergholmen like ved, og også to par på Demmekilskjæret. «Gamle Buskerud» hadde 78 par sist, altså temmelig likt, men da hekket de på Hjelpskjæra. I «Gamle Buskerud» hekket ikke en eneste hettemåke i 2021.


Breiangen:

Det ble ingen hettemåkehekking i Breiangen i år heller, etter at de prøvde seg på Mølen igjen i årene 2017–2021. Det var da mange år uten hettemåke i tiden før dette (2007–2015). Men så har det heller aldri vært mange den gang hettemåkene var på sitt beste – kun en koloni på Mølen.



Figur 11. Hettemåke. Antall hekkende par i indre Oslofjord f.o.m. 1974 (kun Buskerud)–2025 samt 1950-årene. Bestanden i 1970-årene er nok noe underestimert. Breiangeren f.o.m. 1980.

Vi tenker at den drastiske reduksjonen i antall hettemåke gjennom de siste tretti årene skyldes at bestanden var unormalt stor på slutten av 1900-tallet, heller enn at det ligger noen, dypere økologisk prosess bak. I alle fall ikke bare. 1900-tallets store, åpne, søppelplasser med tilgjengelig måkemat ble erstattet med lukkede avfallssystemer på 1990-tallet. Kanskje er det også andre endringer i for eksempel jordbruk og skogbruk som endrer insektfaunaen og forekomst av meitemark. Hettemåkene er ikke egentlige sjøfugler utover at de hekker i fjorden.



God ungeproduksjon på Ulvungene, Asker 30. juni. Foto Morten Bergan

FISKEMÅKE *Larus canus*

Fiskemåka hekker noe senere enn øvrige måkearter. I år, med usedvanlig varmt forårsvær, kunne vi kanskje ha opplevd at fiskemåkene hekket tidligere enn de pleide. Men så skjedde ikke.

Indre Oslofjord:

227 par i indre Oslofjord var en økning fra bare 181 par sist. Men 2023 var da også det absolutt dårligste resultatet gjennom tidene. Årets tall er bedre, men fortsatt det tredje dårligste resultatet i vår telletid. Av de 227 parene var 155 par i «gamle Oslo og Akershus» og 72 par i «gamle Buskerud». De 72 parene her er det beste resultatet siden 2001, og egentlig et ganske normalt tall for «gamle Buskerud». Den historiske bestandsnedgangen fra omkring 700 par (hvorav 650 par i Oslo og Akershus) har vært mest påtagelig i «gamle OA».

Med en slik bestandsreduksjon er det mange av de tidligere store koloniene som nå har lave tall. Den største kolonien i 2025 ble Søndre Askholmen i Frogn med 17 par, dernest 15 par på både Kråkholmen i Blakstadbukta og Lille Bjerkøyskjær straks utenfor. I tillegg hekket 10 par på det lille skjæret «Vettreskjær» i Vettrebukta, som også ligger i Blakstadbukta. Denne delen av Asker huser derfor en betydelig andel av fjordens fiskemåker. Forrige tellings vinnere var Geitungholmen, nå med 12 par og Fyrsteilene, nå med 10 par. På Fyrsteilene rapporteres det om god ungeproduksjon (Larson pers.medd.). Verken Bleikøya eller Torvøya slo til i år.


Lenger sør noterer vi 8 par på Storskjær i Hallangspollen og 7 par på nordspissen av Søndre Langåra, Frogn. På «gamle Buskeruds» side av Drøbaksund har vi faktisk fjordens aller største koloni der utsiden (østsiden) av Ramtonholmen slo til med 27 par fiskemåke. Her har det alltid bare ligget «noen slengere». I tillegg lå det 16 par på lille Kavringen i Sætre.

I Oslo-området hekker en økende mengde måker på flate tak på industribygg. En undersøkelse fra BirdLife Oslo og Akershus om takhekkende måker i Oslo 2022 (Eie, 2024) [<https://oa.birdlife.no/9293>] viste at det er en betydelig hovedvekt av fiskemåke blant disse (67 fiskemåkereir av 72 måkereir funnet = 93 %). Det er nå også takhekkende fiskemåke på for eksempel Bekkestua i Bærum, i Asker sentrum og i Vestby sentrum. Selv om prosentandelen virker noe i overkant, kan noe av nedgangen i fjordbestanden altså kompenseres av en økende kystnær bybestand.

Breiangen:

Totalt bare 17 par fiskemåke er ett fler enn sist, som var det svakeste bestandstallet for arten siden tellingene begynte. Antallet bekrefter en kraftig negativ bestandstrend i Breiangen. Fiskemåkebestanden lå her på rundt 250 par på slutten av 1900-tallet og omkring sekelskiftet, med en bestandstopp på 370 par så sent som i 2005. Vanligvis har det vært sørsiden av Mølen der de fleste fiskemåkene historisk har hekket, men i år bare 4 (!) par (mot for eksempel 333 par i 2005). Ti av parene hekket i år på Ersvikskjær.

Sauholmene: Her ble rapportert 13 hekkepar sist. Ut fra Artsobservasjoner.no er det rapportert 25 ad og 12 pulli 01.07. Kan bety en rimelig grei hekkeforekomst på Sauholmene i 2025.



Figur 12. Fiskemåke. Antall hekkende par fiskemåke indre Oslofjord 1976–2025. 1970-åra kan være noe underestimert. Breiangeren f.o.m. 1980.



Rugende fiskemåke. Foto Morten Bergan

GRÅMÅKE *Larus argentatus*

Indre Oslofjord:

Gråmåka har en klart nedadgående bestandstrend siden 2001, med en ørliten positiv vekst i 2023. I år ble det nok en bestandsreduksjon til 445 par. Dette er gråmåkas svakeste år siden 1983. Toppåret 2001 huset 1663 par i indre Oslofjord. Litt underlig all den tid det er godt om gråmåke i fjorden vinterstid. Kanskje dette ikke er våre lokale fugler? Bestandsreduksjonen var nokså lik i «gamle Oslo og Akershus» så vel som i «gamle Buskerud».


Den største kolonien i 2025 var denne gang Rauskjæra i Asker med 73 par, mens vinneren fra de siste års tellinger, Søndre Skjælholmen, nå ble nummer to på listen med 59 par. Dernest Storskjær utenfor Storsand med 57 par. Dette var de tre største koloniene også sist, men da hadde Søndre Skjælholmen alene hele 100 par. Vi nevner også 35 par på Nordre Skjælholmen og 27 par på nykommeren Store Bjerkøyskjær utenfor Blakstadbukta i Asker. Dernest finner vi mange kolonier, inkludert mange av de store koloniene fra sekelskiftet, i størrelsesorden dusin til snes i antall par.

Ett gråmåkepar hekket i en av de nyetablerte dammene i Storøykilen: Askengtjernet. Et tjern omkranset av takrør er et pussig sted for en gråmåke. Den er ikke med i tallene.

Breiangen:

Totalt 175 par hekkende gråmåke er opp med tre par fra siste telling i 2023, og et nokså normalt og stabilt resultat her siden 2017. Men også i Breiangen ser vi en kraftig reduksjon i gråmåkeantall sett i et lengre tidsperspektiv. Også i Breiangen var toppåret 2001 (636 par).

Av de 175 parene lå 56 par på Vealøs og 51 par på Mølen. På Vealøs var dette litt ned (fra 74 sist), men nokså normalt for de fire siste tellingene. På Mølen var dette det beste resultatet siden 2017. Men alle årene før var meget høyere på alle lokaliteter. Det hekket ikke gråmåke på Ranvikholmen i år, men her forsvant gråmåkene allerede på tidlig 2000-tall.



Figur 13. Gråmåke. Antall hekkende par indre Oslofjord 1973–2025. Breiangeren f.o.m. 1980.

Som for hettemåke så tenker vi at bestandsendringen (bestandsreduksjonen), mest skyldes omlegging av samfunnets avfallsåndtering – fra åpne søppelfyllplasser med store matkilder tilgjengelig til lukkede konteinerhavner uten tilgang til måkemat. For langtlevende fuglearter som gråmåke tar det nok noe tid før bestanden reagerer etter et slikt krakk i mattilgangen. Dessuten ble fyllplassene lukket til forskjellig tid, for eksempel Isi, Bærum i ca. 1990, Yggeseth, Asker i 1999 og Grønmo, Oslo i 2007. Kanskje derfor nedgangen kom noe senere enn den gjorde for hettemåke.



Gråmåke på hekkeplass. Stadig reirpåbygning med mose. Foto Morten Bergan

SVARTBAK *Larus marinus*

Indre Oslofjord:

Med 67 par svartbak gikk det litt bedre enn sist (62 par), men lavere enn i perioden 2009–2021 da bestanden lå på 82–109 hekkepar. Maksimumsresultatet på 109 par var i 2013 og 2015. Det er særlig på «gamle Buskerud»-siden av fjorden, som har hatt kraftigst reduksjon, og med bare 14 par – er bestanden her på nivået fra før sekelskiftet.


Lokalitetene inneholder for det meste 1–4 par svartbak, så i hovedsak er svartbaken mer spredd enn de andre stormåkeartene. Velger svartbaken å hekke i en koloni, tar den ofte toppen av holmen og rydder unna et større areal der. Svartbaken hekker ofte som enkeltpar på små skvalpeskjær.

Noen virkelig store svartbakkolonier ser vi aldri. Høvikskjæra er den lokaliteten der vi til nå har kunnet snakke om kolonidannelse (som mest 18 par i 2013), men her var det bare 5 par i år, overgått av Søndre og Nordre Skjælholmen som huset henholdsvis 7 og 6 par. Dette er nokså normale tall her inne i Bunnefjorden selv om antallet var høyere i toppårene 2013–2015. Det hekket 4 par på Store Bjerkøyskjær (en nykommer-lokalitet) og på Storskjær i Drøbaksund.

Breiangen:

Totalt bare 11 par svartbak i Breiangen er en reduksjon fra 19 par sist, men bedre enn det spesielt dårlige året 2019 (bare 8 par). Svartbaken ble funnet hekkende jevnt fordelt med 1–3 par på de seks lokalitetene.

Bestanden synes for tiden å fluktuere omkring 8–23 par i Breiangen, med en topp på 29 par i 2001. Året 2025 er altså et noe svakt år, men ikke uvanlig svakt for de siste tretti årene.



Figur 14. Svartbak. Antall hekkende par indre Oslofjord 1973–2025. Første kjente hekkefunn i indre Oslofjord 1971 (Svartskjæra v. Ostøya), og i Breiangen 1980.

SILDEMÅKE *Larus fuscus*

Etter jevn økning i nesten alle år siden 1970-tallet har trenden for sildemåke nå snudd fra etter maks i 2021. Det er påfallende at bestanden gikk ned i alle tre delområder.

Indre Oslofjord:

Med bare 745 par ble det en kraftig reduksjon i sildemåke fra 835 par sist og fra toppåret 2021 med 1033 par. Sildemåka har hatt positiv trend frem til da selv om vi begynte å ane en utflating og noe mer variasjon utpå 2010-tallet.

Som sist ble det ingen kolonier over hundre par i år heller. Årets største koloni var som vanlig Rogneskjær i Blakstadbukta med 82 par – som er det samme antall par som i 2023. Dette er imidlertid en reduksjon fra 116 par i 2021 (eneste funn av over hundre hekkepar på én lokalitet). Dernest kom Kaninøya i Oslo med 69 par og Djupalen i Asker med 68 par. Begge disse er bortimot rene sildemåkekolonier. Så kommer Storskjær i Drøbaksund 57 par, Rauskjæra i Asker 45 par og Husebergøy med Kalven i Bunnefjorden med 40 par.

Det er fortsatt mange kolonier på 20–40 par, men nedgangen har vært påtagelig, særlig på Skjælholmene i Bunnefjorden: bare 38 par på Søndre og 15 par på Nordre Skjælholme. Bare 11 par på Sundbyholmene. Her er det nok storskarven som okkuperer areal på Nordre Sundbyholme som kan få noe av skylden da det ikke blir plass til andre arter mellom skarvereirene. Noen av de gamle koloniene er nå tomme (!) for sildemåke: Hvalskjær i Asker, Knerten i Steilene, Nesodden og Høvikskjær utenfor Høvik («gamle Røyken»). Bare to par på Terneholmen.

Andre kolonier holder stand med nokså normale sildemåketall, som NØ Askeskjær med 39 par, Småskjær i Drøbaksund 35 par, Selskjær på Fornebu 33 par og Flatskjær innerst i Bunnefjorden 18 par. Flatskjær er jo egentlig en ganske nyetablert koloni.


Det er verdt å merke seg at selv om både Hvalskjær og Terneholmen lå henholdsvis tom og med to par sildemåker, hekker det nå også hele 25 par på Kråkholmen, som er nabøya til vinnerkolonien Rogneskjær. Disse fire lokalitetene ligger i nesten samme område (Blakstadbukta vs. ytre Holmenfjord).

Noen par hekker på flate tak på industribygg i Oslo-området, men vi kjenner ikke omfanget av dette.

Breiangen:

Totalt bare 128 par er en nedgang også i år, fra 166 par sist og fra en stabil bestand liggende på 285–345 par siden 1990-tallet, inkludert 2021. Bestanden i Breiangen har vært temmelig stabil siden sekelskiftet, i motsetning til jevn vekst innenfor Drøbak, men årets resultat var stusselig – dårligst siden 1987. Da var bestanden i vekst.

Flest par (61) fant vi også denne gang på Mølen der stormåkene hekker i furukledt skråning på østsiden av øya. Dernest 30 par på Saltskjær og 27 par på Vealøs. På Saltskjær og på Vealøs lider nok stormåkene av storskarvens krav til plass.



Figur 15: Sildemåke. Antall hekkende par indre Oslofjord 1973–2025, Breianger f.o.m. 1980. Første kjente hekkefunn i indre Oslofjord ble gjort på Ytre Vassholmen, Bærum i 1973.



Sildemåker i skarpt solskinn 20. mai. Foto Morten Bergan

STORSKARV *Phalacrocorax carbo sinensis*

Det ses mye storskarv, i økende mengde, i indre Oslofjord gjennom sommeren, skjønt akkurat i mai og juni er de ofte annet steds. Stort sett er dette av underarten mellomskarv *Ph. carbo sinensis*. Forekomsten om Oslofjordens storskarvbestand er beskrevet i BirdLife Oslo og Akershus' tidsskrift Toppdykker'n nr. 3-2021 og i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus' tidsskrift Grevlingen nr. 3-2023.

Indre Oslofjord:


I indre Oslofjord hekker storskarv på Nordre Sundbyholmen, Asker (tidl. Røyken) – holmen med fyrlykta på. Første reir med egg ble funnet i 2013 og dernest også ett par i 2019. I 2020 hekket 5 par her og i 2021 hekket 7 par. I 2022 hekket 22 par og i 2023 hekket hele 45 par her, ned til 35 par i 2024. Årets inventering ga 53 par. Ved et besøk på holmen 7. juni så det ut til å stemme, da vi fortsatt registrerte ca. 100 individer i kolonien og at hekkingen må ha gått greit.

Breiangen:

Det er nå to skarvekolonier i Breiangen der kolonien på Saltskjær ytterst i Drammensfjorden etablerte seg først, i 2008, og en koloni på Vealøs etablerte seg i 2017. I 2025 hekket totalt 206 par på de to koloniene.

Kolonien på Saltskjær vokser i det jevne, og årets resultat var rekord med 58 par. Trærne er nå mer eller mindre døde slik at de tidligere trehekkende fuglene stort sett er bakkehekkende nå.

Den nokså ferske kolonien på Vealøs vokser raskt og talte 148 par, som er omtrent som sist (151 par).



Figur 16. Storskarv. Antall hekkende par på tre kolonier i indre Oslofjord (BU) f.o.m. 2013 og i Breianger 2008–2025.



Skarvekoloni med mange reir på toppen av Vealøs. Her med egg. Foto Tonny Andersen



Storskarvene på Saltskjær i Drammensfjorden 16.05.2023. Foto Morten Bergan



... og her med store unger i reirene i samme koloni. Stor variasjon i alder innen skarvekolonien. Foto Tonny Andersen

GRÅHEGRE *Ardea cinerea*

Gråhegre ble et vanligere syn fjordlangs allerede på slutten av 1900-tallet, og vi har mistenkt hekking i tilknytning til fjorden i mange år. Det kan heller være slik at det hekker en del hegrepar inne i skogen litt vekk fra sjøen. Reirene er derfor utilgjengelig for oss fra sjøsiden. Dessuten er de meget godt gjemt på tross av fuglenes betydelige størrelse. Men i 2020 fant vi 9 hekkende gråhegrepar på Storskjær utenfor Storsand i Drøbaksund. Dette var første hekkefunn i et sjøfuglreservat, eller på en holme i fjorden overhodet. Også i 2021 hekket det 2 par på Storskjær.

Ved et besøk på Høvikskjær så sent som 28. juli ble det sett 9 hegrer, og det var to reir i buskene. Dette er svært sent på året – kanskje omlagte kull?

Vi kjenner bare til én fjordnær koloni, og den ligger på Engene innenfor Sætrepollen, Asker. Neppe mer enn to par i 2025, trolig 5 par i 2024 og 2023 (ref. Artsobservasjoner.no). Bemerkelsesverdig få observasjoner fjordlangs i 2025.

FISKEØRN *Pandion haliaetus*

Fiskeørnen er ingen egentlig sjøfugl, selv om næringen hentes i fjorden. Den hekker ikke i måkekoloniene. Siden ca. 2010 har fiskeørn hekket fjordlangs; kanskje har den hekket også før dette nede i Drøbaksund-traktene. Vi kjenner nå til sju hekkelokaliteter i indre Oslofjords kyststrøk. I alle fall seks av disse hadde hekking i 2023. I tillegg er det sikkert et par eller to omkring den ytre delen av Drammensfjorden, for eksempel på Hurumlandet omkring Sandebukta i Vestfold, og som frekventerer Breiangen. Vi rapporterer ikke disse reirene noe sted, men holder dem unntatt offentlighet.

Fiskeørnene i Drøbaksund hadde mislykkete hekkinger i 2025. Dette er antatt å skyldes aggressiv oppførsel fra den nye havørnhannen i havørnparet på Håøya (Aae pers.medd.).

HAVØRN *Haliaeetus albicilla*

I 2008 og i årene 2014–2025 har et par havørn hekket på Håøya, Frogn. I de mellomliggende årene hekket den på Gråøya – i alle fall i årene 2009 og 2013. Hekkingen gikk feil i 2024 da hannen i paret døde, men en ny hann ga vellykket hekking igjen i 2025. Den nye hannen er ringmerket, og er selv oppvokst i reiret på Håøya (Eide pers.medd.).

SKJÆRPIPLERKE *Anthus petrosus*

Vi ser, oftere enn tidligere, skjærpiplerke i skjærgården langs Oslofjorden. Det er særlig på øyene i Breiangen der alle øyene, kanskje unntatt Ersvikskjær, normalt huser skjærpiplerker. I indre fjord ses skjærpiplerka oftest i Drøbaksund (Askeskjæra, Høvikskjær, Sundbyholmene), i Steilenegruppen (Knerten), i mindre grad på Geitungholmen og i ytre deler av Holmenfjorden, det vil si på øyene Rauskjæra, Skauern og Terneholmen samt på Skjælholmene i Bunnefjorden. Konkret hekkebevis i indre Oslofjord 2025 ble gjort på Nordre Skjælholmen i Bunnefjorden der det ble sett voksne fugler og «unger utenfor reir» 12. juni. (ref. Artsobservasjoner.no).

Resultater

I disse tabellene listes alle lokaliteter som har vern med formål sjøfuglreservat med ilandstigningsforbud i hekketida. I tillegg listes opp de mest interessante lokaliteter som ikke har slikt vern.

Forklaring på fugleart i kolonneoverskriftene i tabellene er som følger:

Ks = knoppsvane, Kg = kanadagås, Hg = hvitkinngås, Gg = grågås, Sa = stokkand, Æf = ærfugl, Tj = tjeld, Rs = rødstilk, Ss = strandsnipe, Gh = gråhegre, Hm = hettemåke, Fm = fiskemåke, Gm = gråmåke, Sm = sildemåke, Sb = svartbak, Mt = makrellterne, Sk = storskarv

Fredete lokaliteter - Bunnefjorden

Bunnefjorden er området fra havnebassenget i Pipervika i Oslo i nord og sørover, øst for Bygdøy til Nesoddtangen og videre sørover til innerst i Bunnefjorden nede i Bonn. Det er en velutviklet skjærgård nord i Bunnefjorden tilhørende Oslo og Nesodden kommuner samt to skjær nede ved Kjærnes i Ås kommune. Vi sjekker også bukta nede i Bonn, Bonnebukta, som ligger i Frogn kommune for grågåskull.

Hertugskjær i Oslo – naturminne med fuglelivsfredning opprettet i 1979

Hertugskjær naturminne ble inkludert i Malmøya og Malmøykalven naturreservat i 2008. Dette fredningsformålet har annen begrunnelse.

År	Sum	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	16	1	1		2	1	7		4
2011	15		2		2		11		
2013	20					2	18		
2015	21		4		3	1	12	1	
2017	14					1	12	1	
2019	20		4	1			14	1	
2021	19		2			6	11		
2023	17					1	16		
2025	17		1			1	14	1	

En liten koloni som følger den generelle utviklingen i fjorden: et økende antall ærfugl og sildemåke innerst i fjorden, skjønt ikke så mye ærfugl akkurat her. Her har det ikke vært mye makrellterne siden 2003 (da 21 par), og ikke særlig mye hettemåke siden 1993 (da 108 par).

Malmøyskjær i Oslo – naturminne med fuglelivsfredning opprettet i 1979

Malmøyskjær naturminne ble inkludert i Malmøya og Malmøykalven naturreservat i 2008. Dette fredningsformålet har annen begrunnelse.

År	Sum	Gg	Hg	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	9					8			1	
2011	0									
2013	4		1		1		1		1	
2015	1				1					
2017	0									
2019	1				1					
2021	3			2					1	
2023	69	1				62		1		5
2025	13			9				1		3

Lokaliteten har ligget så godt som fugletom i svært mange år, men slo til med en liten koloni hettemåke i 2023. Denne var borte igjen i år. Ærfugltallet skyldes mest observasjon av kull på vannet omkring skjæret. Vi fant også 3 par makrellterne, men de mislyktes – skjæret var tomt 11. juni.

Kaninøya i Oslo– naturminne m. fuglelivsfredning i 1979, endret til naturreservat i 2008

Selskjær i Norgeskart.no, også kjent som **Skjærskjær** lokalt.

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	90	1	8		8	2	3	8	60	
2011	128		11	3	21	3		12	77	1
2013	143	1	13		32			20	77	
2015	141	1	15		29	1		10	85	
2017	147	1	15		17	1		26	87	
2019	119	1	13		31			18	56	
2021	138		12		21	1		10	94	
2023	115		7		28			16	64	
2025	132	1	16		24	1		21	69	1

Ørlite opp fra sist, men omtrent som normalt siden hettemåkene forsvant. Dette var en gang en meget stor hettemåke- og makrellternekoloni, maks hettemåke 1155 par i 1986 og gode ternetall frem til i alle fall 1997. Nå en ærfugl- og sildemåkekoloni, samt godt tall på hvitkinngås igjen etter det noe svake 2023.

Bleikøyalven i Oslo – naturreservat opprettet i 2008

Tallene inkluderer området på selve Bleikøya bort til fyret og noen fiskemåker i brattkanten sør for dette.

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	491	1	1	54	1	44	3	102	39	161	85	
2011	257			14		10			30	110	92	1
2013	120			1	2				18	43	56	
2015	146			11		25	1		9	57	43	
2017	47					1				19	27	
2019	49			3		27	2			9	8	
2021	147	1		9	2	85	2		6	27	14	1
2023	295			11	2	69	3	159	2	29	19	1
2025	218	1	1	24	1	80	3	57	6	26	19	

Greit resultat selv om det gikk litt ned fra sist. Dette skyldes at hettemåkekolonien var litt ned igjen. Disse hekker på diasbasgangen i SØ, nesten mot brygga til slippen på Bleikøya. År 2009 var siste år med noen hettemåker før kolonien reetablerte seg i 2022. Hettemåkene fikk grei hekkesuksess med mange unger observert i juni.

Noen få par fiskemåker ligger også her etter noen år da de var borte, men stusselig i forhold til tiden femten år tilbake. Fiskemåkene ligger bortover mot fyret og på den bratte NV-kysten av Bleikøya. Bleikøyalven har vært dominert av stormåkene gråmåke og sildemåke samt hvitkinngås i mange år, for eksempel 251 par gråmåke i 2003. Årets stormåketall er bare en skygge av disse glansdagene, men nokså likt for de siste tre telleårene.

Nok et godt år for ærfugl.

Galteskjær nord for Lindøya i Oslo – biotopvernområde opprettet i 2009

År	Sum	Hg	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	27			1	3	23	
2011	23				7	16	
2013	30	1	1	1	6	21	
2015	27	1			7	19	
2017	29		4		5	18	1
2019	33				7	24	2
2021	23				3	19	1
2023	22	1		1	3	16	1
2025	16			1	3	9	3

Noe ned siden sist, også glissent blant sildemåkene som har dominert Galteskjæret siden sekelskiftet. Hettemåkene forsvant etter 1999-sesongen. Tre par svartbak er rekord. Disse tar normalt litt mer plass omkring reiret. Dette og at det sitter en del ikke-hekkende storskarv på skjæret i etableringsperioden, som også tar en del plass, kan kanskje forklare hvorfor en del andre arter skyr unna. Skarvene er bare i liten grad her inne gjennom mai og juni, men den 10. juli satt det 45 individer på skjæret.

Nakkeskjær i Oslo – biotopvernområde opprettet i 2009

År	Sum	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	50		1	1		35				13
2011	30	1			1		1			27
2013	49	3		5			2			39
2015	2	1		1						29
2017	56	3		1		23				29
2019	23	4			1	4		1		13
2021	179	2		2	1	156				18
2023	169	4		2		146			1	16
2025	149	2		5		139				3

Nakkeskjær har vært en av indre fjords største ternekolonier med rekorden 42 par i 1996. Ternene har gode muligheter for brislingfiske rett utenfor kolonien, på strekket Nakholmen–Langøyene. I år var det imidlertid bare 3 ternepar her. Hettetmåkene gjorde comeback i 2021 og har samme opptreden i 2023 og 2025. Både hettetmåkene og ternene hadde vellykket hekkesuksess med mange unger observert 11. og 14. juni.

Kavringen i Oslo – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Hg	Gg	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	20			3	1	7	8	1
2011	27		3	6		9	8	1
2013	24	4		4	1	7	7	1
2015	25			7		8	9	1
2017	31	3		6	1	10	10	1
2019	20			3		10	6	1
2021	19			4		6	8	1
2023	19	1		5	1	6	5	1
2025	14	1		3		6	1	3

Noe ned siden sist. Kavringen fortsetter med dårlige tall. Det sitter ofte en del ikke-hekkende storskarv på skjæret i etableringsperioden. Disse «tar plass» og kan kanskje forklare frafallet i andre arters hekkinger. Det var særlig sildemåka som ble straffet med lave tall i 2025. Svartbak opp til 3 par, kan også kreve mer plass på skjæret.

Nordre Skjælholmen i Nesodden, Bunnefjorden – naturreservat opprettet i 2009

Kjent som Nordre Skjærholmen i riktig gamle rapporter da det sto slik på de gamle sjøkartene.

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	149			27	5	42	3		5	51	9	7
2011	193	1	1	41	4	80	1		2	52	10	1
2013	207		2	48	2	59	2	1		57	22	14
2015	213			42	5	87	1		4	56	7	11
2017	174			53	2	63			2	31	15	8
2019	203			35	3	99				46	11	8
2021	154			22	7	66	1		2	28	19	9
2023	164			25	3	67				42	21	6
2025	173			52	2	59	1		3	35	15	6

Som sist for de siste tre telleårene selv om det var noe flere på 2010-tallet. Men like vel en av de viktigste sjøfuglkoloniene i indre Oslofjord, særlig for hvitkinngås, ærfugl og stormåker.

Bestanden på denne lokaliteten bør ses i sammenheng med Søndre Skjælholmen.

Husbergøya i Nesodden, Bunnefjorden – naturreservat opprettet i 2008

Tallene merket med * er inkludert Husbergkalven. Kalven har vi tidligere regnet som en egen lokalitet og ble ført i tabellene og i rapportene som en ikke-fredet lokalitet. Nå rapporteres begge dellokalitetene under fredete lokaliteter fordi Kalven også er en del av naturreservatet. Husbergøya og Husbergkalven er kun forbundet med et smalt eide. Se tabellen for detaljer mellom de to.

År	Sum	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Ss	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	112	1	6	5	19	2		12	46	20	1
2011	58		4	5	6	1		12	17	13	
2013	86		12	1	12	1		20	14	25	1
2015*	166		25	1	71	1		21	28	18	1
2017*	210		30		78	1		26	37	35	
2019*	195	2	49	1	74	1		13	22	32	1
2021*	264		42	2	121			12	26	59	2
2023*	243		47	8	96	1	1	4	38	46	2
2025*	161		30	2	65	2		5	18	40	1

Totalt 161 par, hvorav 109 par på selve Husbergøya og 52 par på Kalven. Svakeste resultat siden 2013. Særlig god lokalitet for ærfugl, dog langt færre enn 2020–2022. Husbergøya er også en god lokalitet for hvitkinngås og stormåker, men også disse tre viste bestandsnedgang. Fiskemåkene hekker i brattkanten mot NV av Husbergøya.

Husbergøya er en vanskelig lokalitet å registrere på grunn av mye kratt som gjør det vanskelig å ferdes, og derfor lett å overse noen par.

Tuskjær i Ås, indre Bunnefjorden – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Hg	Gg	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Mt
2009	75	3	1	1	50	18	1	1	
2011	260	4	1	1	230	24			4
2013	421	4			401	16			
2015	346	6			330	10			
2017	300	10			276	14			
2019	287	11			268	7		1	
2021	189	11		1	164	8		1	4
2023	153	9			131	7			6
2025	219	10			197	7		1	4

Solid koloni til tross for noe reduksjon fra de seneste årene, men opp siden siste telling i 2023. Her har fortsatt de tradisjonelle artene hettemåke, makrellterne og fiskemåke, dog sammen med hvitkinngås siden tidlig 2000-tall. Nesten rart at det er plass til ti par av disse på denne vesle holmen. Trenden på fiskemåke er klart negativ, men stabilt de siste fire telleårene. Ternene er borte fra nabolokaliteten Flatskjær, men det er kanskje disse som har reetablert seg på Tuskjøret?

Flatskjær i Ås, indre Bunnefjorden – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Mt
2009	275	1			1	259	8			2
2011	342		1		1	315	8		2	15
2013	39		4		2	5			2	26
2015	30		4	2	1	2	3		5	13
2017	24		6	1		1	3		10	3
2019	19		5		1				13	
2021	22		5						16	1
2023	28		4						24	
2025	30		6	4	1			1	18	

Fortsatt lavt tall. Flatskjær har blitt en rendyrket sildemåke- og hvitkinngåskoloni, men som hettemåke- og ternekoloni er det slutt. I år også en rugende gråmåke hvilket er helt nytt.

Fredete lokaliteter - Vestfjorden

Vestfjorden er området fra og med Lysakerfjorden i nord, med Bygdøy i øst og Fornebulandet i vest, og sørover i fjorden mellom Bærum og «gamle» Asker i vest og Nesoddlandet i øst med Steilene på Nesoddensiden og sør til Nærnes på Askersiden av fjorden. Bestumkilen, Kaffeskjær og Killingen i Oslo (vest av Bygdøy) rapporteres under Vestfjorden siden det tilhører Lysakerfjorden selv om det tilhører Oslo kommune. Det er en velutviklet skjærgård i Bærum og nord i Asker med et par lokaliteter sør til omkring Slemmestad, men bare to grupper av øyer langsmed Nesoddlandet; Ildjernet (uten særlig mye sjøfugl) og Steilene (med mye sjøfugl).

Kaffeskjær i Oslo – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Sa	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	70	1						1	25	40	3			
2011	264			1				1	221	36	4	1		
2013	156		2	5	1	1	10	1	93	40	2		1	
2015	205	1	1	9			22	2	139	28	1		1	1
2017	49			3			22		21	3				
2019	54	1		5			21	1	22	2			2	
2021	154	1		8	3		30	2	106	2			1	1
2023	351	1		13			16	2	312	2				5
2025	42	1	1	10			23	2		2				3

Hettemåkene borte (igjen) så årets resultat var skrøpelig. Det var hele 472 par hettemåke i 1991. Vi skrev sist at fiskemåkene hadde hengt seg opp i «kun to» par, noe det var også i år. Det var hele 112 par fiskemåke i 1995. Kaffeskjær har aldri vært noen stor grå-/sildemåkekoloni, men under de siste registreringene har disse artene ikke vært boende på holmen overhodet. Rimelig greit med ærfugl.

Makrellterne som koloni var sist gang i 1999 (da 14 par), siden den gang bare slengere i enkeltår, som 5 par i 2023 og 3 par i år.

Lagmannsholmen i Lysakerfjorden, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

Lagmannsholmen er også del av et naturreservat for geologi, og som inkluderer nærmeste del av landsiden av holmen, etablert 1988 og som inkluderer selve holmen også.

År	Sum	Ks	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sb	Mt
2009	100					94	2			4
2011	127				1	120	1			5
2013	197		2			192	1		1	1
2015	5		1		1		1	1		1
2017	1									1
2019	118			1		113				4
2021	7	1	1	1	1		1			2
2023	7		1	1						5
2025	6		1	5						

Den dårlige trenden fortsetter. På grunn av stangfiske fra holmen (fiskerne vasser over) og kajakkpadlere i sundet har det gått dårlig med Lagmannsholmen inntil informasjonsbøyene ble lagt ut i 2019. Det året, og 2020, gikk hekkingen bra, men ikke siden. På grunn av landheving bør det smale, grunne, sundet mellom holmen og fastlandet fordypes dersom holmen skal overleve som sjøfuglkoloni.

Dokkskjær i Snarøykilen, Bærum – biotopvernområde opprettet i 2009

Benevnt som **Amerikaskjær** og **Lille-Amerika** i riktig gamle rapporter.

Vest	Sum	Ks	Hg	Gg	Ærf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	228			1	2		219	5		1	
2011	232			2	8	1	216	3		1	1
2013	21	1		2	14		2	1		1	
2015	46			2	15	1	27	1			
2017	20	1			15	1		1	1	1	
2019	42			1	8		31	1	1		
2021	15				13	1		1			2
2023	12				10	1				1	
2025	22		1		18			1	1	1	

Liten oppgang som skyldes bra med ærfugl. Hettemåkene fortsatt borte. Hvitkinngås er ny for lokaliteten.

Møkkalassene utenfor Snarøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	36			1	13	2		2	8	3		7
2011	104				14	2	71	1	10	1		5
2013	29				18	2		1	6	1	1	
2015	40				28	2		1	6	1		2
2017	28		3		12	1			10	2		
2019	26		1		6	1		2	12	4		
2021	22		1		6	2		1	11	1		
2023	18	1	3		4	2			6	1	1	
2025	16		2	2		1		2	8	1		

Nok et dårlig år, også for ærfuglen som totalt uteble som rugefugl (om det ikke kan ha klekket noen par). Her var det 300–700 par hettemåke på 1990-tallet, maks 782 par i 1982.

Ytre Vassholmen utenfor Snarøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	129		6	3	14	4	5	83	10	4
2011	122		15	2	29	3	3	52	15	3
2013	107		14	1	27	1	2	41	17	4
2015	114		15	3	35	2	2	41	12	4
2017	116		16	3	35	4	2	41	12	3
2019	97		20	1	34	1	2	31	6	2
2021	82	1	19		28	2	2	17	10	3
2023	89		28	3	24	5	1	22	5	1
2025	97		37	2*	29	4	1	15	6	3

En ørliten økning siden de siste to registreringene, men betydelig lavere enn på 2000-tallet. Økningen fra 2023 skyldes et godt år for hvitkinngås og ærfugl, mens gråmåka hadde et dårlig år igjen. Sildemåka har ligget litt lavt de siste fire tellingene.

*En kryssning mellom grågås og kanadagås hekket på holmen, hunnen lå på reir, her ført opp som grågås. Vi har ikke sett fuglen eller kullet i skjærgården i ettertid.

Ytre Vassholmen er en av fjordens beste lokaliteter for tjeld – også i år ble det 4 par.

Ytre Vassholmen var den første større stormåkekolonien i indre Oslofjord innenfor Drøbaksund. Maks gråmåke var 135 par i 1997, og det lå jevnt på dette antallet ved sekelskiftet.

Det var en plutselig oppvekst av apotekerkattost i 2019 og -20, og som vi ikke ser lenger. Pussige saker. Vi lurte på om måkene kanskje ikke likte denne planten, som kunne bli så høy og tett. Men dersom dette betød noe så har de i alle fall ikke kommet tilbake igjen etter at plantene forsvant igjen.

Sandholmen i Hundsund, Snarøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Æf	Gg	Tj	Hm	Fm	Gm
2009	3							3	
2011	1							1	
2013	67				2	1	63	1	
2015	420	1			2	1	415	1	
2017	6	1	1	1		1		1	
2019	6							5	1
2021	8					1		7	
2023	4				4				
2025	4				4				

Nok et dårlig år. I praksis var holmen tom, men fire kull med grågås frekventerte lokaliteten og Hundsundbukta ultimo mai. Vi kjenner ikke til hekkeplassen.

Flere og flere båter bruker nå Hundsund for båtplasser inne i Hundsundbukta. Båter og kajakkpadlere må passere på kloss hold. Dette går nok ikke bra. Det ligger oftere enn før ærfugl i Hundsund, men ingen hekking på Sandholmen – de pleier ikke det. Selv ikke gravand hekket i tilnytnings til Hundsund i år, for første gang siden 1960-tallet (selv om disse ikke hekket på selve holmen).

Historisk makstall for hettemåke var 761 par i 1982.

Alv SV av Fornebu i Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	88			2	17		36	32	1
2011	82		2	3	23	1	26	26	1
2013	87		6		24	1	28	27	1
2015	62		6		25	1	16	13	1
2017	61		5	1	15		20	16	1
2019	78		5		26	1	29	16	1
2021	72		6	1	25	1	24	13	2
2023	74		8	3	39		12	11	1
2025	40	1	8	1	13	1	2	13	1

Ganske glissent på Alv i år etter å ha vært nokså stabilt siden hettemåkene forsvant (1987). Det var særlig fraværet av gråmåke, bare 2 par, som var underlig. Men også sildemåketallet er noe lavere nå på 2020-tallet enn på 2010-tallet. Det lave tallet for ærfugl i år kan skyldes tidlig klekking, og at kullene allerede har dratt annet steds.

Greit med hvitkinngås, tangering av rekorden på 8 par. Alvs første konkrete knoppsvanehekkning.

Selskjær SV av Fornebu i Bærum – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	29		4	1	19			4	1
2011	50	1	5	1	26			16	1
2013	70		4	1	26		1	37	1
2015	38	1	4		10			22	1
2017	73	1	5	1	15		2	49	
2019	52	1	3		26	1	2	30	1
2021	43		5		12	1	1	23	1
2023	67	1	5		20	1	3	36	1
2025	59	1	8		19	1	1	33	

Nokså jevnt de siste fire tellingene, selv om det var litt ned fra sist. Det er sildemåke som dominerer skjæret, men også bra med ærfugl. Selskjær blir mer og mer en ren sildemåkekoloni.

Langskjær SV av Fornebu i Bærum – naturreservat opprettet i 2009

Også kjent som **Badeskjær** i tidlige rapporter.

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	13		3	1	4	2		1	1		1	
2011	31		5	4	14		4				1	3
2013	347	1	13	6	22		303			1	1	
2015	35	1	8	1	24						1	
2017	55		9		44	1					1	
2019	243		12	4	84		142	1				
2021	104		12	1	85	1		1	2	1	1	
2023	134		8	2	87		32		2	2	1	
2025	57		10		43				2	2		

En tallmessig variabel koloni ettersom hettemåkene hekker eller ikke. De hekket også i mellomåret 2024, men hekkingen gikk dårlig på grunn av predasjon fra svartbak. Som i 2023. Ingen hettemåker i år. Det var hele 402 par hettemåke i 2005. Ærfuglbestanden har økt voldsomt her de siste årene, men ble halvert til bare 43 par i år. Hekket på Langskjær første gang så sent som i 2003. Makrellterne er stort sett borte herfra, har ikke hekket siden 2011. Det hekket 22 par terne i 1985.

Svartskjæra* i Ostbukta, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

*Summen av de tre skjærene Svartskjær, Flatskjær og Jakteskjær i Ostbukta. For resultater fra enkeltskjæra, se tabellen bak i rapporten.

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	2				1	1					
2011	4				1	1		1		1	
2013	8	1		2	2	2				1	
2015	19	1			15	2				1	
2017	4				3					1	
2019	21	1	1		14	1		1	1	1	1
2021	106	1	1		5	1	66	1		1	26
2023	15	1	1		8	1					4
2025	75	1			6	2	46	1			19

Svartskjæra har ligget sørgelig nesten-tomme i mange år. Hettemåkekolonien forsvant etter 1995-sesongen. Men i 2020 ble det en hjertelig tilbakekomst av både hettemåke og makrellterne på Flatskjæret. De hekket her også i 2021 og 2022. I 2023 gikk det dårlig igjen, ingen hettemåke og ternene mislyktes. I år var det en liten hettemåkekoloni og fjordens tredje største ternekoloni på Flatskjær. Et par kontroller utover i juni viste bra ungeproduksjon for både hettemåke og makrellterne på Flatskjæret.

Knoppsvaneparet lå som vanlig på Jakteskjær, etter å ha prøvd seg med en sesong på Svartskjær sist.

Terneskjær ved Gåsøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Hg	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	27		6		3	16	2
2011	23		15	1		6	1
2013	8		2			4	2
2015	6		6				
2017	9		7	1		1	
2019	10		8				2
2021	6	1	3			1	1
2023	5		3				2
2025	4		2				2

Selv sildemåkene har nå forlatt dette skjæret som var en klassisk sildemåkekoloni i en lang periode. Men svartbaken holdt stand, som normalt med to par.

Mellemskjær ved Gåsøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	23		1	1	5	1	1	6	6	1	1
2011	5				2	1				1	1
2013	13			1	7	3		1		1	
2015	15	1			11	2				1	
2017	35	1	1		12	1		1		1	19
2019	15	1	2		11	1					
2021	21	1	7		12					1	
2023	11	1	4	1	2	2			1		
2025	20	1	5	1	12	1					

Den gamle hettemåke- og ternekolonien er for lengst borte, så det ser glissent ut på skjæret. Men noen hvitkinngjess hekker, og ærfugl var tilbake igjen til normale nivåer etter et pussig lavt tall sist. Dette var første sted som vi noen gang registrerte ærfuglhekking i indre Oslofjord (i 1979).

Hettemåkene forsvant etter 1997-sesongen (maks 862 par), og makrellterna forsvant etter 1999. Reetableringen av makrellternekolonien på skjell- og grusstranda i sør i 2017 ble bare et blaff. Men i år hekket det 6 par på naboholmen i SV – Rosenholmen.

Prinseskjær ved Ostøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	26	2		2	1		2			2	17
2011	23	4		11	1		1			2	4
2013	26	4	1	17	1			1	1	1	
2015	94	6		30	1	33	1			2	21
2017	162	5		21	2	129	1			2	2
2019	54	4		35	1		1			2	11
2021	17	7		3	2		2	1		2	
2023	3	1		2							
2025	18	4	1	12						1	

Prinseskjær har vært en skuffelse de siste årene, men ærfugl har reddet bestanden noen år. Også disse mislyktes i 2021–23 (trolig kråkespist grunnet forstyrrelse), men 12 par tilbake igjen i år.

Borøyskjær ved Borøya, Bærum – naturreservat opprettet i 1978.

Stundom rapportert som **Furuskjær** og **Lite skjær sør for Borøya** i eldre rapporter (skjæret var den gang navnløst på kart, men står nå oppført som Borøyskjær i Norgeskart.no).

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	41		1				6	7		1	26
2011	32		1				2	10	2	1	16
2013	36	1	2	2	3	1		6	1	1	19
2015	11		2		5			2		1	1
2017	6		3					2		1	
2019	0										
2021	3				2					1	
2023	16		2	1	11	1				1	
2025	6		2		3	1					

Stusselig også i år.

Ulvungene ved Nesøya, Asker – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Sa	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	333	1				1		1	325	4		1	
2011	403				5	2	2	2	391			1	
2013	5			1			2	1				1	
2015	2	1										1	
2017	8			3				3			1	1	
2019	17			3			2	1	1	8	2		
2021	13						1	2		8	1	1	
2023	6		1	1						2		1	1
2025	101						3	2	80	6		1	9

Etter mange stusselige år etter at hettemåkene forsvant etter 2011-sesongen, slo det til med både hettemåke (80 par), fiskemåke (6 par) og makrellterne (9 par) på Ulvungene i år – på det sørøstre delskjæret. Svartbaken tok det nordvestre delskjæret.

Ulvungene hadde sitt siste gode år i 2011, da som fjordens største hettemåkekoloni. Men det var flere par før i tiden, med hettemåkererekorden på 758 par i 1982. Dette var også en god makrellternekoloni frem til og med 1985 (27 par i 1978). Etter 2012 har det vært ynkelig her. Fiskemåke, derimot, har etablert seg med noen få par de siste årene. Makrellternene og hettemåkene hadde vellykket hekking med store unger (hettemåka) ved en kontroll 30. juni så vel som 9. juli, og voksne terner som kom med brisling som mat.

Ulykkesskjær ved Nesøya, Asker – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Æf	Tj	Rs	Hm	Fm	Sm	Sb
2009	34			4	1		25	3		
2011	18		2	8	2	1		2	2	1
2013	11		3	5				2		1
2015	19		2	15					1	1
2017	11		3	6	2					
2019	31	1	1	24	1			1		3
2021	15		1	11	1					2
2023	18	1	1	14	1					1
2025	19	1	3	13	1					1

Nok et dårlig år her. Ærfugl øker i det lange bildet, men ned fra toppåret 2019. Ulykkesskjær med Taglungbukta innenfor er en lokalitet hvor det ofte finnes en god del svaner. Det er godt om ålegress i bukta og omkring skjæret, noe svanene synes godt om. Ett par hekker også på skjæret.

Hettemåkekolonien (maks 794 par i 1987) ble borte i 2007–09 og siden har det vært ynkelig her. Samme utvikling som på nærliggende Ulvungene.

Kråkholmen i Blakstadbukta, Asker – fuglefredningsområde opprettet i 2009

Står under navnet **Kråkholmen** på Norgeskart.no, men som **Krokholmen** på sjøkart og har nok stundom blitt rapportert med dette navn i tidlige rapporter. Lokalbefolkningen på Gåsøya bruker også Kråkholmen.

Tallene gjelder hele holmen selv om bare den vestlige delen er fredet. De fleste fuglene ligger der, men ikke ternene. De ligger i lav gressvegetasjon i kalkmarken i øst.

År	Sum	Ks	Hg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	44		2		2		30	3	2		5
2011	256		2	1	1	210	31	2	3		6
2013	57		3		3		30	2	6	1	12
2015	30		2		1		9	6	6		6
2017	52		3		3	2	10	5	12		17
2019	33		2		1		5	6	10		9
2021	57		3	3	1		13	4	11		22
2023	52		6	1	1		11	5	11		17
2025	62	1	7	4	1		15	4	25	1	4

Måkene ligger stort sett i reservatet i SV, hvitkinngjessene noe mer spredt og ternene ligger i gresset i NØ, altså ikke i den delen som er reservat. Bra tall på sildemåke i år. Det fluktuerer litt på fiskemåkene, men rimelig bra tall i år selv om det var langt bedre frem til og med 2013. Holmens første registrerte knoppsvanehekking i år, men det er nok bare paret som pleier å ruge på Rogneskjær som har flyttet på seg.

Rogneskjær i Blakstadbukta, Asker – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	69		1		6		2	9	51	
2011	103	1	2	2	13	1	1	7	76	
2013	97	1	3	2	16	1	1	15	58	
2015	110	1	6	1	25		1	3	72	1
2017	95	1	4		13	1		5	71	
2019	101	1	5		17	1		14	62	1
2021	154	1	6	1	16	1	1	12	116	
2023	129	1	6		31			8	82	1
2025	127		3		20			22	82	

En stabil koloni der sildemåke dominerer, og med hele 82 par (som sist!) ble det nest beste år gjennom tidene (rekordresultat i 2021) – og indre Oslofjords største sildemåkekoloni også i år. Sildemåka etablerte seg først med ett par i 1986, og det ble stort sett ett par frem til 1991 hvorpå det økte. Økning også på gråmåke. Knoppsvanen har nok flyttet til naboholmen Kråkholmen.

Historisk var også Rogneskjær en hettemåkekoloni med makstall 600 par i 1987, for så å hekke for siste gang i 1990 (81 par) men med et isolert comeback i 1995 (185 par). Makrellternekolonien forsvant etter 2001.

Terneholmen i Asker – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	106		15	3	29	3	5	46	5		
2011	130		21	2	30	4	4	42	10		17
2013	113		18	3	22	4	2	38	24	2	
2015	121		16		30	3	2	48	20	2	
2017	91		17		31	1		27	15		
2019	115		15	1	48	2		26	22	1	
2021	22		1		3	2		9	7		
2023	15		3	2	9	1					
2025	33	1	9	2	14	2	1	2	2		

I 2021 skrev vi at «Den gamle sjøfuglkjempen ligger nå som et sørgelig syn». Det ble enda verre i 2023 da holmen lå tom (!) hva måker angår, men litt opp igjen i år, selv om det fortsatt ser stusselig ut. Hvorfor ble ærfuglene brått borte? Det var hærverk i ærfuglkolonien i 2020 (mange tomme reir – ref. NINA-undersøkelsen), kanskje fuglene lærte noe da? Hvitkinngåsa og ærfugl litt opp igjen etter noen år med lave tall. Den første kanadagåshekkingen.

Terneholmen var en gang indre Oslofjords aller største hettemåkekoloni med 2422 par i 1990.

Lille Bjerkøyskjær i Asker – naturreservat opprettet i 1978

Også rapportert under navnet **Nordre Bjerkøyskjær** i tidlige rapporter.

År	Sum	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	35	1	2	1	1		3	25	2	
2011	37	2		14	1		1	17	2	
2013	26	2		17				5	2	
2015	23	2		19	1				1	
2017	24	1		20	1	1			1	
2019	31	2		27					2	
2021	13	3		7					3	
2023	6	1			1				1	3
2025	41	2		6	1	15	1		2	14

Kolonien slår til med fine tall på fiskemåke og makrellterne i år med henholdsvis 15 og 14 rugende par.

Hvalskjær i Leangen, Asker – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	40		2		12	1		16	8	1	
2011	63		5	1	31		1	14	10		1
2013	61	1			40			10	9	1	
2015	56		1		31	1	1	9	12	1	
2017	39	1	1		7	1	1	7	20	1	
2019	35	1	1		12			8	12	1	
2021	37		1		3	2		9	7		
2023	36		1		29			1	4	1	
2025	6		1	1	2	1				1	

Stusselig på Hvalskjær i år etter å ha stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Er det svartbaken som krever for mye plass?

Opprinnelig en hettemåkekoloni med omkring 500 hekkepar frem til bråstopp etter 311 par i 1989. Gråmåke etablerte seg i 1986 og nådde maks 37 par i 2001. Det første sildemåkeparet kom i 1989. Begge disse går nå tilbake i antall, og i år hekket ingen av dem. Ærfuglen la seg på rede første gang i 1999. Pene ærfugltall i en periode, men svært dårlig i 2021 og i år.

Knerten i Nesodden, Vestfjorden – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Rs	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	101	1	23	1	33	4		3	35	1	
2011	109	1	33	1	58	2		1	6	5	2
2013	91	1	32		36	2	1		10	4	5
2015	105		34	1	49		1		11	2	7
2017	109	1	27		59	1		1	15	3	2
2019	102	1	30		60			1	6	1	3
2021	76	1	23	1	34	1			10	2	4
2023	90	1	30	4	44	1			8		2
2025	57		26	4	24	2			1		

Skrekkelig tynt med stormåker med bare ett (!) par gråmåke. Historisk gråmåketopp med 255 par var i 1995. Ærfugl etablerte seg her første gang i 1984, hvitkinngås i 1993, men også ærfuglen gjorde det litt dårligere i år enn normalt. Knoppsvanen la seg antagelig seg på Rekeskjær.

Det er mink på Steilene, og vi tror at dette ødelegger for sjøfuglene i øygruppa inkludert Knerten.

Geitungholmen i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 2009

Tallene refererer til hele holmen selv om bare den vestligste delen er sjøfuglreservat.

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Sa	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	40					2	2		20	13	2		1
2011	73			2		14		3	14	31	3	1	5
2013	71		3	1	2	12	4		15	30	3	1	
2015	34		3			3	1		12	10	4	1	
2017	74		9	1		9	2	4	16	18	5	1	9
2019	163		3			2	2	105	17	20	13	1	
2021	90	1	6			19	1		16	22	23	1	1
2023	125	1	16			19	2		15	29	40	1	2
2025	62	1	8		1	16	2		12	7	5	1	

Totalt 62 par var et svakt år for Geitungholmen, særlig iøynefallende for stormåkene – gråmåke og sildemåke. Spesielt underlig er nedgangen for sildemåke siden det har vært jevn økning de siste årene, og med rekordantall (40) her sist. Da blir bare 5 par underlig lavt. Derimot normale tall for ærfugl og fiskemåke. Fiskemåketallet har vært imponerende stabilt gjennom en årrekke. Knoppsvane ruget også i år. Stokkandreir ble funnet.

Dyna i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 2009

Tallene oppgis for summen av de tre skjærene Dyna med Puta, Skurven og Flåskjær. Se tabellene for detaljer per skjær. Historisk kan det ha vært noe surr mellom hva som er rapportert som Flåskjær og hva som er Dyna, men Skurven er alltid korrekt navnsatt. Alle tre skjærene er imidlertid innen Dyna NR.

År	Sum	Kg	Hg	Sa	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	39				13		8	13	5	
2011	52				24		7	18	3	
2013	55	1			22	1	15	14	1	1
2015	30			1	11		8	9	1	
2017	20				1		10	8	1	
2019	16				3		4	7	2	
2021	16				2		7	6	1	
2023	18		1		1	1	7	6	2	
2025	17				5	1	5	5	1	

De tre skjærene har kommet dårlig ut av det i en del år nå. Av de bare 17 parene ligger 10 av dem på Dyna. Svartbaken ligger på Flåskjær som sist, men den pleide å bruke Skurven.



Det er tett mellom reirene i en hettemåkekoloni. Her fra Ulvungene 12.06. Foto Morten Bergan

Fredete lokaliteter – Drøbaksund

Dette er området fra Søndre Langåra utenfor Fagerstrand i Frogn, sør for Nærnes i Asker, og sør til og med Småskjær og Storskjær utenfor Drøbak og Storsand. Området tilhører Frogn og Asker kommuner (tidligere Røyken og nordre del av Hurum kommuner).

Det er hertil de lokalitetene som tidligere har blitt rapportert i egne rapporter for Buskerud. Den vestre delen av Drøbaksund blir henført – unntatt Geitungholmen og Dyna som tilhører Vestfjorden (men som er med i grafene merket BU (= «gamle» Buskerud).

Høvikskjæra i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Hg	Æf	Tj	Rs	Gm	Sm	Sb
2009	125		2	51		1	35	23	13
2011	120		2	64	1		16	24	13
2013	95		3	35			18	21	18
2015	107	1	4	55			20	19	8
2017	95		2	41			15	20	17
2019	77		4	38			10	13	12
2021	51	1	4	23			8	4	11
2023	69	1		46			6	8	8
2025	31		5	21					5

Et veldig dårlig år for Høvikskjæra med total manko på gråmåke og sildemåke, og bare 5 par svartbak. Høvikskjæra var den eneste egentlige kolonien av svartbak i indre Oslofjord. Også ærfuglbestanden har gått ned til bare 21 par. Det var imidlertid en god del tomme ærfugleir. Allerede klekt? Fem par hvitkinngås.

Historiske topper for gråmåke var 123 par i 1995, sildemåke 70 par i 2007 og ærfugl 64 par i 2011.

Sundbyholmene i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 1978

Tallene er summen av de tre Sundbyholmene. Deltallene per skjær, det nordre og det søndre, fremkommer i tabellen. Det lille, vegetasjonsløse, midterste skjæret ligger gjerne fugletomt.

År	Sum	Sk	Ks	Kg	Hg	Gg	Sa	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	272	1			5	1	1	85	2	2	77	88	11
2011	347				4			158	1		63	110	11
2013	248	1	1	1	8			84	1	1	56	84	11
2015	237				6			112	3		56	48	12
2017	242				12			80	1		59	76	14
2019	204	1			9			111	1	1	33	36	12
2021	194	7			8			88	1		39	48	3
2023	196	45			15			83		1	33	19	
2025	141	53			11			40	2	1	22	11	1

Totalt 141 par var et dårlig år for Sundbyholmene. Som på nærliggende Høvikskjær er det reduksjon i stormåkebestanden som er mest påfallende. Også ærfuglen hadde et svært dårlig resultat med en halvering ned til bare 40 par. Som vanlig lå de fleste på Søndre Sundbyholme (34 par). Den vegetasjonsløse, Midtre Sundbyholme lå tom – den gjør ofte det.

Interessant er det at storskarvene nå har okkupert den nordre holmen, den med fyret på. Vi fant ett par storskarv rugende i 2013, men så gikk det helt til 2019 før det kom ny hekking. I 2020 fant vi 5 par, i 2021 var det 7 par, i 2022 var det 22 par og i år toppet det seg med 53 par storskarv.

Disse skarvene tar «en del plass» som nok går ut over andre arter. Hvorfor hekkebestanden da også går ned på det søndre skjæret og også på det nærliggende Høvikskjæra er jo ikke logisk, men storskarvene bruker å sitte der også. Bra med skarveunger i forbindelse med et besøk 7. juni.

Demmekilskjæra i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 2009

År	Sum	Kg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Mt
2009	14		4	1	2	6	1		
2011	7			1		4	2		
2013	9			1		5	2		1
2015	7	1	1	1		2	2		
2017	0								
2019	5			1		4			
2021	3		2	1					
2023	5			1			3	1	
2025	19		13	1	2	3			

Litt opp igjen etter mange magre år, dog fortsatt lave tall.

Hjelpskjæra i Asker (tidl. Røyken) – naturreservat opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Mt
2009	13	1			2			3	1	6
2011	9	1					1	2		5
2013	123	1				2	117	3		
2015	460	1	1			1	450	3		4
2017	20			1			9	1		2
2019	11	1				2	4	1		3
2021	0									
2023	81					1	75	5		
2025	10	1	1		2	1		5		

Det har vært svært variabelt på de to små Hjelpskjæra i alle år. Sist var hettemåkene tilbake igjen, men borte igjen i år. Noen fiskemåker holdt stand. Alle lå på det østre skjæret.

Storskjær i Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Sa	Æf	Gh	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	166	1				12		1		123	26	3
2011	205	1		3		55		1		115	28	2
2013	265	1		1		58		1		159	40	5
2015	211	1	2		1	54		2	2	83	60	6
2017	211	1	2			34		1	1	84	84	4
2019	195		2			58		1		63	66	5
2021	179	1	3			43	2	1		16	110	3
2023	178	1	5			55		1	1	51	63	2
2025	166	1	1			44		1	1	57	57	4

Totalt 166 par var ørlite svakere enn de siste års registreringer. Normalt har det her vært overvekt av gråmåke, gradvis innhentet av sildemåke inntil denne dominerte i 2021. I år fordelte vi dem likt, og med 4 par svartbak. Ærfugl noe ned igjen fra sist, men fortsatt innen det antall par som er

et vanlig nivå. Bare ett par hvitkinngås.

Storskjær var indre Oslofjordens første hekkelokalitet for gråhegre inne i en sjøfuglkoloni med 9 rugende gråhegrer i 2020 og 2 par i 2021. Hegrene var borte igjen, men det er en koloni inne i skogen innenfor Sætrepollen.

Småskjær i Frogn – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Hg	Gg	Æf	Tj	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
2009	66	1			17			10	37	1	
2011	84	1			31	1	2	20	29		
2013	93	1		1	24			10	56	1	
2015	79				20	1		11	43	2	2
2017	88	1		1	14	2		7	62	1	
2019	94				19	1		5	69		
2021	80	1			10			7	62		
2023	69	1			19	1		14	33	1	
2025	54		1		11	1		5	35	1	

En svært stabil koloni, men litt ned fra de siste årene. Særlig stor reduksjon i gråmåkeantallet over tid, mens sildemåka holdt seg fra 2023. Ett par hvitkinngås var ny art for lokaliteten, mens knoppsvana var fraværende i år. Det sitter normalt mange storskarver her, men de hekker ikke.

Nordøstre Askeskjær, Frogn – naturreservat f.o.m. 1978

Betegnelsen er [Askholmen](#) på Norgeskart.no. De øvrige Askholmene er ikke naturreservater.

År	Sum	Ks	Hg	Sa	Æf	Tj	Gm	Sm	Sb
2009	142	1			25		7	108	1
2011	166	1	1		51		16	96	1
2013	163	1	2		49		14	95	2
2015	146	1	4		37		15	89	1
2017	127		3		16		22	85	1
2019	156	1	2		53		9	89	2
2021	125	1			36	1	8	79	
2023	72	1			22		1	47	1
2025	65		2	1	17	1	4	39	1

Betydelig lavere tall de to siste tellingene enn før. Dårlig år for gråmåke i en sildemåkedominert koloni. Har ofte vært den største sildemåkekolonien i fjorden, men ned også i år. Ett par stokkand var nytt for lokaliteten. NØ Askeskjær må ses i sammenheng med de øvrige tre Askeskjæra/Askholmene (se tabellen) der det Søndre Askeskjær slo til i år med hele 17 par fiskemåke og 4 par makrellterne.

Stakaskjær i Hallangen, Frogn – biotopvernområde opprettet i 2009

År	Sum	Kg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sb	Mt
2009	6				1		1		1	3
2011	12	1	4	6	1					
2013	19	1			1	10	2			5
2015	9	1					2			6
2017	51					50	1			
2019	15			2	1	12				
2021	10	1				2				7
2023	0									
2025	7					6		1		

Noe ustabilt her, der forrige telling var første året med null fugl! I år hadde 6 par hettemåke og en enslig gråmåke gjenfunnet skjæret.

Her hekket 225 par hettemåke i 1995, og det holdt seg på over hundre par til og med 2007. Det hekket 12 par makrellterne i 1997.

Storskjær i Hallangspollen, Frogn – fuglefredningsområde opprettet i 2009

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Sm	Sb	Mt
2009	11		1						10			
2011	23		1			2			13	1		6
2013	18					6	1		8	1		2
2015	17		1			6			4	1		5
2017	34	1				8	1		7	1		16
2019	13	1				8		3			1	
2021	26		1	1		14			5		1	4
2023	17	1			3	4			4		1	4
2025	21	1		1		4	1		8			6

Ustabilt for tiden, men nokså normalt for det siste desennium. Åtte par fiskemåke er noe positivt. Makrellterne med anslag på 6 par (ikke alle ruget på telledato, men vi fører opp 12 individer til stede som 6 par). Knoppsvanen holdt stand.

Hettemåkene forsvant etter 1997-sesongen (da 117 par).

Interessante, ikke-fredete, lokaliteter i indre Oslofjord

Vi tar med oss et nennsomt utvalg ikke-fredete sjøfugllokaliteter som har, eller har hatt, en sjøfuglkoloni. Alle lokalitetene er å finne i regnearktabellen.

Søndre Skjælholmen i Bunnefjorden, Nesodden

Kjent som [Søndre Skjærholmen](#) i riktig gamle rapporter da det sto slik på de gamle sjøkartene.

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Sa	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb
2009	149			27	5		42	3		5	51	9	7
2011	193	1	1	41	4		80	1		2	52	10	1
2013	207		2	48	2		59	2	1		57	22	14
2015	213			42	5		87	1		4	56	7	11
2017	354		1	72		1	72	4		2	138	60	4
2019	358			73	4		90	2		3	139	46	1
2021	378	1		59	5		140	2		2	103	60	6
2023	393	2		79	8	1	119	6			100	75	3
2025	271	2		66	4		93	1		1	59	38	7

Indre Oslofjordens aller største sjøfuglkoloni i 2023 og 2025, men noe ned i forhold til de beste årene som var de fire siste tellingene i 2017–2023.

Lokaliteten ble i år den største lokaliteten for tre arter i indre Oslofjord: hvitkinngås, ærfugl og gråmåke. Det er særlig disse som holmen er viktig for nå, selv om gråmåke- så vel som sildemåkebestanden gikk kraftig ned i år. Sju par svartbak er imidlertid rekord. Bare ett par tjeld var rart etter rekordtallet 6 par sist. Holmen er tydeligvis stor nok til å huse 2 svanepar. Det er ikke vanlig, men har nå skjedd tre år på rad.

Beliggenheten som den sydligste av holmene i ytre Bunnefjorden gjør at den må ses i sammenheng med Nordre Skjælholmen – som er fredet.

Killingen, Lysakerfjorden, Oslo

Øya NV av Bygdøy. Vi har brukt betegnelsen Killingen Nord, men ser at Norgeskart.no nå bruker Vesle Killingen om nordre del.

Den bratte nordskrenten har alltid huset et antall fiskemåke og en god del hettemåke. Både brattkanten i nord og sørspissen av Killingen var bortimot fugletomme i år også med unntak av 3 par fiskemåke i nord. Pussig nok etablerte det seg i 2024 hekkende hettemåke ute på en stor, blå, båt som ligger fortoynd nedenfor Vesle Killingen. Vi bokførte dette som 7 par på Vesle Killingen. De var flere om bord i den båten i fjor, sikkert et trettitalls.

Kajakpadlebanen i Bestumkilen har start rett utenfor Vesle Killing-kolonien i nord, og kan gi en del forstyrrelser når det skytes med startpistolen.

Feieskær i Lysakerfjorden, Oslo

Vest av Killingen. Her pleier det å ligge godt med hettemåke, riktignok færre enn før i tiden. I 2025 (og i 2021) lå skjæret tomt.

Geitholmen (= Geita) østenfor Snarøya, Bærum

Naturreservat vernet i 2008, men ikke som sjøfuglreservat.

På kalktørrengen sør på holmen har det de siste årene utviklet seg en sjøfuglkoloni av betydelig størrelse, med svært interessante tall for hettemåke og makrellterne. I 2021 var Geita fjordens største hettemåkekoloni med 614 par. Det var omtrent det samme antallet reir i mellomåret 2022, også da fjordens største hettemåkekoloni. Da ble imidlertid kolonien røvet av nærmeste (menneskelige) beboer på holmen, og bare én unge vokste opp av ca. 620 reir. Cirka 1200 egg ble plukket. Eieren fikk bot. Siden da har holmen vært tom for hettemåker. Kanskje måkene hadde lært at lokaliteten ikke er trygg, og heller søkt til andre lokaliteter? I år hadde 17 par hettemåke etablert seg på det lille skjæret i vest, som vi kaller Geitungen. Her har vært en liten sildemåkekoloni i mange år med 9 par sildemåke i år som i fjor.

Makrellterna hekket på Geita med 28–50 par i perioden 2020–2024, men i år registrerte vi kun 25 par. I 2024 må kolonien ha bukket under, kanskje på grunn av et voldsomt regnskyll primo juni, eventuelt også forstyrrelser fra folk på land. Ternene etablerer seg så sent i kolonien at hendelsen ved 17. mai-tider 2022, som utraderte hettemåkekolonien, trolig ikke påvirket ternekolonien nevneverdig. De lærte vel ikke at her var farlig, slik hettemåkene kan ha gjort, og at ternehekkingen i noen av disse årene har vært vellykket med en god del unger. Den store kolonien i 2024 ble altså totalt mislykket, og også i år fikk ternene et dårlig resultat. Ved et besøk i kolonien 30. juni ble bare ca. 10 terner observert og ingen unger. Dog, flere av de ti lå tilsynelatende og ruget – omlagte kull? Senere ble terner ikke sett her.

Man burde vurdere sjøfuglfredning med ferdselsforbud på Geita på grunn av ternene.

Vi loggførte 10 par ærfugl på Geita pluss 4 par på Geitungen, samt 9 par hvitkinngås og 3 par tjeld på den kombinerte Geita + Geitungen.

Torvøya SV av Fornebu, Bærum

Torvøya ble fredet som naturreservat i 2008, men ikke som sjøfuglreservat.

Torvøya har i mange år vært en betydelig hekkeplass for fiskemåke, men det siste «store» året var i 2017 (49 par). Fiskemåkene er på rask retur herfra, bare 7 par sist og 2 par i 2025. Noen grå- og sildemåker pleier å legge seg i østskråningen (mot Alv), men bare 2 par sildemåke lå her. Noen hvitkinngjess har etablert seg på holmen, 6 par i år (men det var 10 par i både 2019 og 2023).

Junkern ved Grimsøya, Bærum

Lite skjær på innsiden av Grimsøya, og normalt kun av interesse på grunn av en god makrellternebestand. Noe særlig antall terne har det ikke vært siden 2017 (14 par). I år lå det kun en eneste sildemåke på reir her.

Spannslokket sør av Brønnøya, Asker

Ved Brønnøyas utside i sør. Naturreservat, men ikke for sjøfugl.

Det ligger ofte en god del fiskemåke og ruger i brattkanten på kalksteinsveggen som heller mot Langårsund, samt på den uthogde flata nedenfor brattkanten (21 par i 2017). Her hekket det 8 par fiskemåke i år. Ingen makrellterne i år heller. Disse ligger normalt i gravbergknappenga i SV, og har vært borte herfra i mange år – med unntak av en liten koloni i 2019. To par tjeld.

Rauskæra i Asker

I Askers utskjærgård.

197 par sjøfugl totalt, mot 203 par sist, og likt som i 2021 (196 par). Har i mange år hatt en stadig økende måkebestand, der særlig stormåkene er tallrike. Gråmåke (73 par) omtrent som sist, har ligget på 70-tallet her i mange år. Sildemåke (45 par), har ligget på 50-tallet de siste registreringene. I tillegg har det blitt riktig mye hekkende hvitkinngås her ute med 40 par – rekord. Antall ærfugl ble 34 par mot rekorden på 36 par i 2023.

Makrellternekolonien fra 2021–2022 er fortsatt borte, og i år var det ingen terner å se.

Rauskjæra, og nærliggende Skauern, har blitt klassiske steder å finne skjærpiplerke.

Djupdalen i Asker

I Askers utskjærgård. Djupalen har vært en god sildemåkelokalitet i mange år, etter en «dårlig start» som ubrukt koloni den gangen man vurderte hekkeholmer for vern. Holmen har også vært lite brukt av friluftsfolk. En betydelig sildemåkekoloni finnes nå her, 68 par er som sist (66 par), og bare litt under rekorden fra 2019 (81 par). Bare ett eneste par gråmåke og 1 par svartbak er som vanlig i denne sildemåke dominerte kolonien. Det ble registrert 8 par ærfugl.

Det ligger også en mindre holme, **Djupalsteinen**, mellom Djupalen og Skauern. Her hekker det stundom litt hettemåke og makrellterne. I år hekket 69 par hettemåke ute på Djupalsteinen, og også 51 par på sørpissens av **Skogerholmen/Skauern**. Noen terner ble sett, men gikk ikke til hekking. Trolig mislyktes hettemåkekoloniene her.

Store Bjerkøyskjær i Asker

Utenfor Bjerkøya. Store Bjerkøyskjær har ligget «i skyggen» av Lille Bjerkøyskjær siden tellingene begynte, men har hentet seg opp gjennom de siste årene med pene tall for grå- og sildemåke. Hele 27 par gråmåke og 30 par sildemåke er rekord på Store Bjerkøyskjær. I tillegg hele 4 par svartbak. Rugende ærfugl så vi lite av (4 par), mens det var hele 27 par i 2019.

«Sandspollskjær», inne i Sandspollen, Asker

Det lille, navnløse, skjæret inne i Sandspollen ved Skjærlaget, som vi bare kaller Sandspollskjær, har ofte en pen koloni makrellterne. Vi registrerte ingen makrellterne her den 15. mai, men dette er jo tidlig for terner, og Sandspollen blir ikke sjekket for ternetellinger. Klekte gåsekull svømmer tidlig inn i Sandspollen og nyter godt av mudderbukt med ålegress (og brød fra båtgjester?); i år ett par av tre arter gjess.

Fyrsteilene, i Steilene, Nesodden

Ettersom koloniene på Knerten (og Storsteilene) har blitt gradvis reduserte, har Steilenegruppens øyer vært sjøfuglfattige med unntak av ærfugl. På Fyreilene har det imidlertid alltid ruget noen fiskemåker og makrellterner, men holmen slo til i 2019 med hele 180 par hekkende hvorav mye hettemåke. I 2023 ble det rekord her med 345 par hettemåke som gikk ned til bare 18 par i 2025. Imidlertid, vi tror det la seg en del flere hettemåker på reir utover i mai måned, da det så ut som noe flere par på ternetellingen 12. juni. Kanskje en del mislykte hettemåkepar reetablerer seg på Fyrsteilene? Vi tror dette gjaldt etter røveriet av Geitholmkolonien i 2022.

I 2019 lå det hele 50 par makrellterne på lokaliteten. En så stor ternekoloni hadde ikke indre Oslofjord sett siden 1980-årene. Det var «bare» 9 par på Fyrsteilene i 2025. Ternene har hatt dårlig hekkesuksess i mange år grunnet mink. Det ble derfor satt opp en slags inngjerding som skulle beskytte ternene. Men da flyttet heller ternene fra sørspissen til midten av øya. Innhengningen var ingen suksess!

Med 10 par fiskemåke ble dette puslete fra de 27 par i 2021 – da fjordens største fiskemåkekoloni. Men fiskemåkene hadde unger ved ternetellingen 12. juni, så hekkingen var nok vellykket.

Fyrsteilene huser også 24 par ærfugl og 13 par hvitkinngås, rekordtall for dem begge. En stokkand hadde lagt seg til i bergblombeddet like ved fyrhuset.

Fyrsteilene forvaltes av Oslofjordens Friluftsråd som kystledhytte. De er flinke til å passe på at hekkende fugler ikke forstyrres.

Søndre Langåra i Frogn

Nordspissen av Søndre Langåra har hatt noen varierende år med og uten hettemåkekoloni nordafor fyret (198 par hettemåke i 2017) etter at kolonien var fugletom i et tyvetalls år omkring sekelskiftet. Det ble imidlertid dårlig igjen siden 2019. Bare 7 par fiskemåke er også godt under normalen på nordspissen.

Søndre Langåras fyrhus forvaltes av Oslofjordens Friluftsråd som kystledhytte. Men de er flinke til å passe på at hekkende fugler ikke forstyrres. Fuglene hekker i et temmelig ulendt landskap som er vanskelig å ferdes i.

Askeskjæra for øvrig i Frogn

Heter [Askholmene](#) på Norgeskart.no. Det NØ skjæret er fredet, men det hekker en del sjøfugl også på de øvrige. Totalt ble det således 45 par i tillegg. De fleste av disse har gjerne hekket på Midtre Askeskjær, men i år var det særlig det Søndre Askeskjær som slo til med 17 par fiskemåke og 4 rugende makrellterner. Generelt færre stormåker på holmene.

Resultater Breiangen

Breiangen er midtre Oslofjord der fjorden breier seg ut ved Tofte i Asker, med Mølen som sørligste lokalitet, og inn til Saltskjær utenfor Grunnane i Drammensfjorden. Området er har et annerledes landskap, kjennetegnet av litt større lokaliteter av grunnfjell, gabbro og drammensgranitt enn de lave kambrosilurøyene i Bunne- og Vestfjorden. Alle lokalitetene hørte tidligere til Hurum kommune, nå Asker kommune. Til indre deler av Drammensfjorden (Blindeskjæra, tidligere Vestfold fylke) har vi aldri reist, men vi hører heller ingen rykter om at det finnes noe der.

I tillegg sjekker vi kyststrekningen for eventuelle klekte ærfugl- og grågåskull, samt for å kartlegge individer av siland og gravand, langs kysten fra Tofte til Holmsbu i ytre del av Drammensfjorden. Å registrere klekte ærfuglkull viste seg jo å være meget viktigere i år enn noen gang tidligere.

Sauholmen i Sonsbukta hører på en måte til Breiangen, men har historisk ikke blitt registrert som dette da det lå på Akershus-siden av fjorden.

Årets tellinger ga 852 par mot 842 par i 2023 (ekskusive Sauholmen i Vestby, og eksklusive gravand og siland som vi bare teller voksne individer av, ikke reir).

Under har vi kommentert bestandsendringer for hver enkelt fredet lokalitet, deretter for hver enkelt art.

Ersvikskjær, Asker (tidl. hurum) – naturreservat opprettet i 1978

Det står Ersvikskjær på gamle sjøkart så vi har tidligere rapportert med dette navnet.

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkinngås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hettemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2001	129		1		2		54		1		2	1	4	51	10	1	2
2003	109		1				49						7	33	16	2	1
2005	130		1				47				1		2	69	5	5	
2007	79		1				41		1		1			24	8	3	
2009	57		1	2			43				2		1	4	1	3	
2011	72		1		2		65				1					3	
2013	63						57				1			1		4	
2015	76						66						2	2	3	3	
2017	47						40				1			1		5	
2019	57				3	1	49		1		1					2	
2021	42					1	32	1			1		1	2	2	2	
2023	100		1		2	4	74		1		1			5	11	1	
2025	129		1		2	8	78				2		10	21	5	1	1

Totalt hele 129 hekkende par, som er det beste resultatet siden 2005! Det er særlig for ærfugl at kolonien slår til, i år som sist, nå med hele 78 par. Det svake resultatet i 2021 forklarte vi da med en ørlite senere telledato (på grunn av værforholdene). Like fullt, årets tall er formidabelt bra, og med dette den største ærfuglkolonien i Breiangen.

Stormåkekolonien, som var nesten borte i en tjue års tid, slo til igjen med 21 par gråmåke og 5 par sildemåke, skjønt sildemåka gjorde det bedre sist. Kanskje er vi ørlite for tidlig ute for denne arten? Hvitkinngås med 8 par, ny rekord igjen. Knoppsvane ruget, og ett par makrellterne – det første siden 2003.

Mølen, Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 1978

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkinngås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hettemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2001	301			1			23		1		6		104	121	36	2	7
2003	594			1			29		1		6		284	152	78	1	42
2005	700						19	1			9	76	333	227	22	2	11
2007	466						15			1	5	3	220	144	60	3	15
2009	576				1		27				7		226	156	143	7	9
2011	402				1		37	3	1		7		141	55	121	7	29
2013	421				3	1	37		1		9		108	81	152	1	28
2015	430					2	54	1	1	1	5		63	116	163	2	22
2017	453					5	16	1		1	7	24	60	77	149	3	110
2019	428					7	63	1	1	1	2	77	29	42	176	3	26
2021	409		1			12	21	1	2	1	5	87	23	34	149	6	67
2023	199		1		1	9	51	2	2		4		8	29	73	2	17
2025	183		1			17	39		2		6		4	51	61	2	

Totalt bare 183 hekkende par, ned fra 199 par, som da var det dårligste resultatet på denne siden av sekelskiftet. Gråmåkene gjorde det ganske bra, med en økning til 51 par, som er det beste siden 2017. Sildemåkene gjorde det derimot svært dårlig med bare 61 par, det dårligste siden 2007 den gang sildemåkebestanden var i jevn vekst. Bare 4 par fiskemåke er et stusselig tall på en tidligere så tallrik fiskemåkekoloni, og det dårligste resultatet for fiskemåke i tellingenes historie (333 par i 2005). Fiskemåkene hekket i sør, der det er flere gråmåke enn sildemåke, mens det er flere sildemåke enn gråmåke i «skogkolonien» i øst. Men det er en vanskelig koloni å estimere forholdet mellom de to stormåkekoloniene.

Hettemåkekolonien på Nordkapp har vært borte de to siste registreringsårene, og i år var også makrellternekolonien borte derfra. Mølen har tidligere huset den største ternekolonien i hele indre og midtre Oslofjord, med formidable 110 par i 2017. Så er det dette med terner og telletidspunkt, så hvorvidt det kan ha etablert seg noen her i ettertid er ukjent.

Ærfugltallet varierer en del, og årets tall (39 par) er i et slags midtpunkt mellom de siste årene. Klekte ærfuglkull svømmer nok raskt innover mot fastlandet, kanskje også sørover til Horten i Vestfold? Knoppsvane også i år, det var ny art her ute i 2020. Hele 17 par hvitkinngås gjør Mølen til den største kolonien for en voksende bestand hvitkinngås i Breiangen. Hele 6 par tjeld. Vi så strandsnipe på to steder, og vi tror helt sikkert at disse hekket på øya. Det ble også observert rødstilk på Mølen.

Ranvikholmen, Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 2007

Det står Ramvikholmen på gamle sjøkart så vi har tidligere rapportert med dette navnet. Fredningen skyldes ikke sjøfugl.

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkinngås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hetemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2001	128			1			40				2		19	58	5	3	
2003	39						21				1		1	15		1	
2005	37			2			9				3		6	17			
2007	27						13		1		2		1	9		1	
2009	29						26				1			2			
2011	25						21		1		2			1			
2013	25				1		18		2		2		1			1	
2015	22						17		2		1			1		1	
2017	11						9						2				
2019	4						4										
2021	19		1			1	12						4	1			
2023	17		1		2		6		1		1		6				
2025	28						15						2		2	1	9

Hekkebestanden på Ramvikholmen har gått jevnt nedover, særlig på kalven i øst, som er friluftsområde som i sin tid huset en del fiskemåkepar. Det ble litt flere par sjøfugl i år på grunn av en liten makrellternekoloni på 9 par som hadde slått seg til på det kortgressete området mot havna i øst. Vi kjenner til at disse var til stede i kolonien også den 14. juni (ref. Artsobservasjoner.no), så hekkingen har trolig vært vellykket på tross av hekkeplass nær havna.

Tofteholmen, Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 2009

(men holmen ble fredet allerede i 1919)

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkingås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hettemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2001	242		1				43				3		14	119	50	3	9
2003	265			1			43				5		37	168	9	2	
2005	195			2			9				5		21	132	20	3	3
2007	232						53	1			2		4	128	44		
2009	193				1		40				3		2	103	40	3	1
2011	156				4		64				2		2	65	16	3	
2013	72				1		32		2		3		2	26	3	3	
2015	67						41				2			20	2	2	
2017	38				1		26				2			8		1	
2019	104						59				2			41	2		
2021	93				1	2	46		2		1		1	35	3	2	
2023	94						48		3		1		1	36		5	
2025	85					1	46		2		3			28	4	1	

Totalt 85 par sjøfugl, noe som er nokså normalt for de siste fire tellingene (94 par sist) og et normalt resultat siden 2013. Det er særlig ærfugl og gråmåke som dominerer på Tofteholmen, med henholdsvis 46 og 28 par. Sildemåka tilbake igjen etter et «friår» i 2023. Det er lite gjess å finne, kanskje for mye skog på Tofteholmen.

Tofteholmen er nok generelt noe underestimert hva spesielt ærfugl angår, da holmen er tett bevokst og vanskelig å inventere. Men dette er like vrient hvert år så metodisk er det greit nok.

Vealøs, Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 2009

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkinngås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hettemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2001	450			1	4	1	26				1			287	110	20	
2003	268		1			1	15				1		7	113	128	2	
2005	377		1			2	26				2		8	108	222	8	
2007	324		1		2	2	24				1		4	98	188	4	
2009	287		1		3	3	31				1		3	80	160	5	
2011	309					3	33				2			81	180	10	
2013	270				2	4	31	1			3		2	130	88	9	
2015	198					3	33				1			95	63	3	
2017	126	3				1	10				2		3	88	12	7	
2019	251	44	1			4	43		1		3		3	60	92		
2021	261	123			1	3	8		1		2			28	89	6	
2023	305	151			4	7	30		1		2			74	32	4	
2025	252	148	1		4	5	10				2			56	27	3	

Totalt 252 par sjøfugl er ned siden sist (305 par), men nokså normalt for de fire siste registreringsårene. Stormåkene gikk litt ned fra sist. Også ærfugl gikk ned, men det var enda færre i 2021. Av gjess gikk det bra for både grågås (4 par) og hvitkinngås (5 par), og knoppsvanen var tilbake igjen.

På Vealøs etablerte det seg en liten koloni storskarv (underarten mellomskarv) i 2017, med 3 par. Året etter var det noe flere, ca. ti par, dernest tok det helt av via 151 par i 2023, 120 par i 2024 og 148 par i år. Har kolonien nå stabilisert seg på dette antallet (120–151 par)? Skarvene hekker i små busker og direkte på berget på holmens høyeste punkt, samt i øvre del av brattkanten mot vest. Det er ganske klart at skarvene krever en del plass som gjør det vanskeligere for andre arter å hekke i samme område.

Saltskjær, Asker (tidl. Hurum) – naturreservat opprettet i 2009

Første registreringsår på Saltskjær var først i 2011!

År	Sum	Storskarv	Knoppsvane	Kanadagås	Grågås	Hvitkinngås	Ærfugl	Stokkand	Strandsnipe	Sandlo	Tjeld	Hettemåke	Fiskemåke	Gråmåke	Sildemåke	Svartbak	Makrellterne
2011	56	16					1							6	23	10	
2013	121	26		1	1	1					1		7	29	49	6	
2015	126	28		2		1							1	34	57	3	
2017	125	38		1		3							2	25	49	7	
2019	157	46		1		5	3				1		3	35	60	3	
2021	125	51				2							3	20	45	4	
2023	125	34	1			4	4	2					1	28	44	7	
2025	124	58	1			8	4						1	19	30	3	

Totalt 124 par hekkende sjøfugl er identisk med tellingene i 2021 og 2023, og et temmelig vanlig resultat fra 2013. Med 19 og 30 par av henholdsvis gråmåke og sildemåke er dette litt i underkant av normalen for Saltskjær, men kompenseres av en liten økning i hvitkinngås også her inne (8 par). Saltskjær er en stormåkekoloni uten særlig mye ærfugl (4 par). Kanskje er Drammensfjorden for lite salt, det vil si for lite blåskjell(?), til at ærfuglen liker seg her.

Saltskjær var første hekkeholmen for storskarv i midtre (og indre) Oslofjorden. Arten etablerte seg med 2–3 hekkepar i 2008. Kolonien har vokst jevnt siden da, dog ikke så raskt som slike skarvekolonier gjerne gjør. Det hekket 53 par her i 2024, og det ble 58 par storskarv i 2025 noe som er nytt rekordresultatet. Fuglene hekket opphavlig i noen store løvtrær, men disse synes å ha blitt drept av guano, og nå hekker skarvene delvis i døde trær og delvis på bakken på toppen av holmen.

Nordre Sauholmen i Sonsbukta, Vestby – fuglefredningsområde opprettet i 2009

Sauholmane i Sonsbukta, Vestby har blitt sjeldent besøkt da den ligger så alene langt unna alle de andre koloniene (langt å kjøre fra vår base i indre Oslofjord), men muligheten bød seg i årene 2019–2023. For 2025 ble det avtalt annen inventering enn oss, men vi har ikke fått tallene herfra. Siden vi mangler så mange tall bakover i tid så inngår ikke holmen i grafene, og får separat plass i tabellen. Tallene gjelder hele holmen og ikke bare reservatet, som er den nordligste delen av Nordre Sauholmen.

På grunn av geografisk posisjon plasseres lokaliteten under kapittelet om Breiangen.

År	Sum	Ks	Kg	Hg	Gg	Æf	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Mt
2019	81			6		14	1	27	1			10
2021	213	1		17	1	11	2	143	13			25
2023	121			6	3	20	4	38	18			32
2025	-			6*		5*		Un-ger sett*	13*			15*

*Anslag basert på Artsobservasjoner.no 01.07.2025.



Makrellterne i vannet 12. juni. Foto Morten Bergan

Tabeller

Indre Oslofjord fredete lokaliteter - fredet som sjøfuglreservater:

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
Bunnefjorden:																	
Kaffeskjær	Oslo	13.05./11.06.	42	1	10	1			23		2		2				3
Kavringen	Oslo	12.05.	14		1				3					6	1	3	
Galteskjær	Oslo	12.05.	16								1			3	9	3	
Nakteskjær	Oslo	12.05./11.06.	149		2				5			139					3
Bleikøyalven	Oslo	12.05.	218	1	24	1	1	1	80		3	57	6	26	19		
Kaninøya	Oslo	12.05.	132	1	16				24		1			21	69		
Hertugskjær	Oslo	12.05.	17						1					1	14	1	
Malmøyskjær	Oslo	12.05.	13						9						1		3
Bunnefjorden:																	
Tuskjær	Ås	13.05./30.05.	219		10							197	7		1		4
Flatskjær	Ås	13.05.	30		6		4				1			1	18		
Bunnefjorden:																	
Husbergkalven	Nesodden	12.05.	52		10				19		1		2	7	13		
Husbergøya	Nesodden	12.05.	109		20				46		1		3	11	27	1	
Nordre Skjælholmen	Nesodden	12.05.	173		52		2		59		1		3	35	15	6	
Vestfjorden:																	
Knerten	Nesodden	13.05.	57		26		4		24		2			1			
Vestfjorden:																	
Lagmannsholmen	Bærum	13.05.	6				1		5								
Dokkskjær	Bærum	13.05.	22		1				18				1		1	1	
Møkkalassene	Bærum	12.05.	16		2		2				1		2	8	1		
Ytre Vassholmen	Bærum	12.05.	98	1	37		2		29		4		1	15	6	3	
Sandholmen	Bærum	14.05.	4				4										
Langskjær	Bærum	14.05.	58	1	10				43					2	2		
Selskjær	Bærum	14.05.	59	1	4				19		1			1	33		
Alv	Bærum	14.05.	40	1	8		1		13		1			2	13	1	
Svartskjær, Svartskjæra i Ostbukta	Bærum	14.05.	6						5							1	
Flatskjær, Svartskjæra i Ostbukta	Bærum	14.05./12.06.	68						1		1	46	1				19
Jakteskjær, Svartskjæra, Ostbukta	Bærum	14.05.	1	1													
Borøyskjær	Bærum	14.05.	6		2				3		1						
Prinseskjær	Bærum	14.05.	18		4		1		12							1	
Terneskjær	Bærum	13.05.	4						2							2	
Mellenskjær	Bærum	13.05.	20	1	5		1		12		1						
Vestfjorden:																	
Ulvungene	Asker	14.05./12.06.	101						3		2	80	6			1	9
Ulykkesskjær	Asker	14.05.	19	1	3				13		1					1	
Terneholmen	Asker	14.05.	33		9	1	2		14		2		1	2	2		
Hvalskjær	Asker	14.05.	6		1		1		2		1					1	
Rogneskjær	Asker	14.05.	127		3				20					22	82		
Kråkholmen	Asker	14.05./07.06.	62	1	7				4		1		15	4	25	1	4
Lille Bjerøyskjær	Asker	14.05./07.06.	41		2				6		1		15	1		2	14
Drøbaksund:																	
NØ Askeskjær	Frogn	15.05.	65		2			1	17		1			4	39	1	
Stakaskjær	Frogn	15.05.	7									6		1			
Storskjær i Hallangspollen	Frogn	15.05.	21	1	1				4		1		8				6
Småskjær	Frogn	15.05.	54		1				11		1			5	35	1	

Forklaring på fuglearter i kolonneoverskriftene i tabellene:

- Ks = knoppsvane
- Kg = kanadagås
- Hg = hvitkinggås
- Gg = grågås
- Sa = stokkand
- Æf = ærfugl
- Tj = tjeld
- Rs = rødstilk
- Ss = strandsnipe
- Gh = gråhegre
- Hm = hettemåke
- Fm = fiskemåke
- Gm = gråmåke
- Sm = sildemåke
- Sb = svartbak
- Mt = makrellterne
- Sk = storskarv

Indre Oslofjord fredete lokaliteter - fredet som sjøfuglreservater:

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
Drøbak-sund, tidligere rapportert som del av Buskerud:																	
Geitungholmen	Asker	15.05.	62	1	8			1	16		2		12	7	14	1	
Dyna, Dyna	Asker	15.05.	10											5	5		
Skurven, Dyna	Asker	15.05.	2						1		1						
Flåskjær, Dyna	Asker	15.05.	5						4							1	
Høvikskjæra	Asker	15.05.	31		5				21							5	
Demmekiliskjæra	Asker	15.05.	19						13		1	2	3				
N Sundbyholmen	Asker	15.05.	78		4				6	53	1	1	1	8	5		
S Sundbyholmen	Asker	15.05.	63		7				34		1			14	6	1	
Hjelpskjæra	Asker	15.05.	10	1		1			2		1		5				
Storskjær	Asker	15.05.	166	1	1				44		1		1	57	57	4	

Sum fredet 2025 (antall par)			2649	15	304	4	26	2	690	53	42	527	95	270	513	43	65
Sum fredet 2023 (antall par)			3277	12	268	2	41	0	871	45	34	918	55	346	581	44	60
Endring i % fra 2023 til 2025			-19		13				-21	18	24	-43	73	-22	-12	-2	

Indre Oslofjord ikke-fredete lokaliteter:

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
Frognerkilen	Oslo	11.05.	4				4										
Bestumkilen	Oslo	11.05.	5				5										
Hengeleppa, Bygdøy	Oslo	11.06.	1											1			
Killingen Nord / Vesle Killingen	Oslo	13.05.	10									7	3				
Feieskjær	Oslo	13.05.	0														
Killingen Sør	Oslo	13.05.	0														
Lille Herbern + Herbernbukta	Oslo	12.05.	4						1		1		1		1		
Loffen, Nakkholmen	Oslo	12.05./11.06.	69	1	4		3		14			14	3	2	2	1	25
Nakkholmen	Oslo	12.05.	71		1		3		9			55	2	1			
Lindøya	Oslo	12.05.	9						9								
Purka, Lindøya	Oslo	12.05.	66						7			59					
Ringskjær	Oslo	12.05.	5									4			1		
Jakteskjær	Oslo	12.05.	27						12		1	14					
Galtreskjær I i Paddehavet	Oslo	12.05.	28		1				7		1			3	15	1	
Malmøykalven	Oslo	12.05.	3						3								
Skinnebukta, Malmøya	Oslo	12.05.	7				1		6								
Langøyene	Oslo	12.05.	9		1				8								
Gressholmen	Oslo	12.05.	6				2		4								
Dagerskjær, Bleikøya	Oslo	12.05.	2						2								
Hovedøya, skjær inne i bukta	Oslo	12.05.	30						10			20					
"Paddeskjær" v. Skilpadda	Oslo	12.05.	11								1				9	1	

Bunnefjorden																	
Nebba-Kjøybukta	Ås	13.05.	6						4		1		1				
Bonnebukta	Frogn	13.05.	9				7		2								

Nesodden-lokaliteter i Bunnefjorden:

Søndre Skjæholmen	Nesodden	12.05.	272	2	66		4		93		2		1	59	38	7	
Solbukta + Kirkevik-omr	Nesodden	13.05.	9						9								
Hellviktangen+Ursvikbukta	Nesodden	13.05.	4						4								
Nesoddtangen-området	Nesodden	13.05.	6						6								

Forklaring på fuglearter i kolonneoverskriftene i tabellene:

- Ks = knoppsvane
- Kg = kanadagås
- Hg = hvitkinggås
- Gg = grågås
- Sa = stokkand
- Æf = ærfugl
- Tj = tjeld
- Rs = rødstilk
- Ss = strandsnipe
- Gh = gråhegre
- Hm = hettemåke
- Fm = fiskemåke
- Gm = gråmåke
- Sm = sildemåke
- Sb = svartbak
- Mt = makrellterne
- Sk = storskarv

Indre Oslofjord ikke-fredete lokaliteter:

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
Nesodden-lokaliteter i Vestfjorden:																	
Ildjernet	Nesodden	13.05.	12				3		9								
Suteren	Nesodden	13.05.	3						3								
Perstellene	Nesodden	13.05.	13						12				1				
Rekeskjær	Nesodden	13.05.	9	1					6						2		
Storstellene	Nesodden	13.05.	8		1				3		1		2	1			
Fyrsteilene	Nesodden	13.05./12.06.	82		13		1	1	24		3	18	10	1	1	1	9
Vestfjorden																	
Hundsund, Fornebu	Bærum	13.05.	7				4		3								
Skomakerholmen i Hundsund	Bærum	13.05.	2										2				
Holsa, Snarøya	Bærum	12.05.	4		1		1				1		1				
Kongsholmen, Snarøya	Bærum	13.05.	1								1						
Geitholmen (Geita)	Bærum	13.05./11.06.	43		4				10		2		1	1			25
Geitungen v. Geita	Bærum	13.05.	37		5		1		4		1	17			9		
Junkern, Grimsøya	Bærum	14.05.	1												1		
Grimsøya	Bærum	14.05.	2						2								
Kråkholmen, Ostøya	Bærum	14.05.	3				1		2								
"Feil skjær" v. Ostøya	Bærum	14.05.	4						2		1		1				
"Rolftangskjær", Fornebu	Bærum	13.05.	4						4								
Holtekilen, Fornebu	Bærum	14.05.	7	1			4		2								
Storøykilen, Fornebu	Bærum	14.05.	2				2										
Bjerkeholmen, Fornebu	Bærum	14.05.	5		1						1		3				
Koksabukta, Fornebu	Bærum	14.05.	1				1										
"Soliskjær", Fornebu	Bærum	14.05.	2								1					1	
Torvøya, Fornebu	Bærum	14.05.	11		6						1		2		2		
Kalvøyskjær/-kalven	Bærum	14.05.	3						1		1		1				
Borøya N inkl. Sarahl + «Panama»	Bærum	14.05.	0														
Hesthagabukta, Ostøya	Bærum	14.05.	8						8								
Rosenholmen, Gåsøya	Bærum	13.05./12.06.	6								1						5
Furuholmen, Gåsøya	Bærum	13.05.	4						4								
Mellomholmen, Gåsøya	Bærum	13.05.	1										1				
Gåsøya	Bærum	13.05.	3				3										
Kråkeskjær v. Gåsøya	Bærum	13.05.	1														1
"Midt-Mikkel"	Bærum	13.05.	6			1			5								
Mikkel	Bærum	13.05.	1													1	
Gåsungene	Bærum	13.05.	1													1	

Slependrenna	Asker	14.05.	1	1													
Kuholmene i Hestsund	Asker	14.05.	7				4		3								
"Brønnstein" v. Pilodden, Brønnøysund	Asker	14.05.	1													1	
Vendelholmane/-sund	Asker	14.05.	9				2		5		1				1		
Sværslepene	Asker	14.05.	0														
Djupalen	Asker	14.05.	79		1				8						1	68	1
Djupalsteinen	Asker	14.05.	73		1				3			69					
Rauskjæra	Asker	14.05.	197	1	40		1	1	34		1			73	45	1	
Skogerholmen/Skauer'h	Asker	14.05.	66		4		1		6			51	3	1			
Høyerholmen	Asker	14.05.	1										1				
Torbjørnsøy	Asker	14.05.	1										1				
Furuholmen	Asker	14.05.	1						1								

Forklaring på fuglearter i kolonneoverskriftene i tabellene:

- Ks = knoppsvane
- Kg = kanadagås
- Hg = hvitkinggås
- Gg = grågås
- Sa = stokkand
- Æf = ærfugl
- Tj = tjeld
- Rs = rødstilk
- Ss = strandsnipe
- Gh = gråhegre
- Hm = hettemåke
- Fm = fiskemåke
- Gm = gråmåke
- Sm = sildemåke
- Sb = svartbak
- Mt = makrellterne
- Sk = storskarv

Indre Oslofjord ikke-fredete lokaliteter:

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt
Spannslokket	Asker	14.05.	8								2		6				
Skurven i Langårsund	Asker	14.05.	4						3		1						
Langårsund	Asker	14.05.	3				3										
Store Bjerkøyskjær	Asker	14.05.	68		2				4				1	27	30	4	
"Vetreskjær"	Asker	14.05./07.06	17						5		1		10				1
Spirebukta, Løkeneshalvøya	Asker	14.05.	3				1		2								
Leangbukta	Asker	14.05.	1						1								
Holmenbukta	Asker	14.05.	2						2								

Drøbaksumund i Frogn:

S Langåra N	Frogn	15.05.	15						6		1		7	1			
Lågøya N	Frogn	15.05.	0														
Selskjær, Håøya	Frogn	15.05.	3						3								
Sagbukta, Håøya	Frogn	15.05.	2				2										
NV Askeskjær	Frogn	15.05.	9		3		1		4		1						
M. Askeskjær	Frogn	15.05.	6						2				3	1			
S Askeskjær	Frogn	15.05.	30						9			17					4
Møkkalassa	Frogn	15.05.	2								1					1	
"Kaholmskjær"	Frogn	15.05.	1	1													
Hallangen	Frogn	15.05.	13				4		9								
Hallangspollen	Frogn	15.05.	6				4		2								

Drøbaksumund i Asker tidl. Buskerud:

"Morbergskjær" v. Morbergholmen, Nær Asker	Asker	15.05.	19		1				4			2	6				6
Holmegrunnsmoloen, Nær snesbukta	Asker	15.05.	69									68	1				
Nærnesbukta og -tangen	Asker	15.05.	5						5								
Ramtonholmen	Asker	15.05.	39			1			4		1		27		5	1	
Gråøya	Asker	15.05.	5						5								
Killingholmen	Asker	15.05.	1	1													
Raudholmene	Asker	15.05.	7						7								
Kavringen, Sætre	Asker	15.05.	16										16				
Sætrepollen	Asker	15.05.	9			2	3		4								
Furuholmen N av Sandspollen	Asker	15.05.	5		1				3		1						
Skjæret v. Rognesholmen	Asker	15.05.	2													1	1
Sandspollen inkl. "Sandspollskjær"	Asker	15.05.	4		1	1	1								1		

SUM IKKE-FREDET BUNNEFJORDEN, VESTFJORDEN, DRØBAKSUND = INDRE OSLOFJORD

Sum ikke-fredet 2025 (antall par)	1780	9	158	5	77	2	458	0	33	398	132	175	232	24	77		
Sum fredet 2025 (antall par)	2649	15	304	4	26	2	690	53	42	527	95	270	513	43	65	Gravand (ind.)	Siland (ind.)
TOTAL 2025 (antall par)	4429	24	462	9	103	4	1148	53	75	925	227	445	745	67	142	18	325
TOTAL 2023 (antall par)	5250	22	440	9	123	3	1136	45	72	1337	181	565	836	62	147	23	345
Endring i % alle lokaliteter 2023 til 2025	-15,6	9	5	-16	-16	-16	1	18	4	-31	25	-21	-11	8	-3	-22	-6
Andel par på fredete lokaliteter 2025	2649	15	304	4	26	2	690	53	42	527	95	270	513	43	65	-	-

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt	Ss
BREIANGEN, fredet																		
Saltskjær	Asker	16.05.	124	1	8				4	58			1	19	30	3		
Ersvikskjær	Asker	16.05.	129	1	8		2		78		2		10	21	5	1	1	

Forklaring på fuglearter i kolonneoverskriftene i tabellene:

- Ks = knoppsvane
- Kg = kanadagås
- Hg = hvitkinggås
- Gg = grågås
- Sa = stokkand
- Æf = ærfugl
- Tj = tjeld
- Rs = rødstilk
- Ss = strandsnipe
- Gh = gråhegre
- Hm = hettemåke
- Fm = fiskemåke
- Gm = gråmåke
- Sm = sildemåke
- Sb = svartbak
- Mt = makrellterne
- Sk = storskarv

Lokalitet	Kommune	Dato	Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt	Ss
BREIANGEN, fredet																		
Saltskjær	Asker	16.05.	124	1	8				4	58			1	19	30	3		
Ersvikskjær	Asker	16.05.	129	1	8		2		78		2		10	21	5	1	1	
Mølen	Asker	16.05.	181	1	17				39		6		4	51	61	2		2
Ranvikholmen	Asker	16.05.	28						15				2		1	1	9	
Vealøs	Asker	16.05.	256	1	5		4		10	148	2			56	27	3		
Tofteholmen	Asker	16.05.	83		1				46		3			28	4	1		2

Breiangen ikke-fredet

Filtvedt-Tofte	Asker	16.05.	3						3									
Tofte-Sagene	Asker	16.05.	13						13									
Sagene-Rødtangen	Asker	16.05.	39				1		38									

SUM BREIANGEN = MIDTRE OSLOFJORD			856	4	39	0	7	0	246	206	13	0	17	175	128	11	10	2	4	12
<i>TOTAL 2023 (antall par) breiangen</i>			<i>842</i>	<i>4</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>214</i>	<i>185</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>172</i>	<i>160</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>22</i>
<i>Endring i % alle lokaliteter 2023 til 2025</i>			<i>1,7</i>	<i>0</i>	<i>63</i>				<i>15</i>	<i>11</i>	<i>44</i>		<i>6</i>	<i>2</i>	<i>-20</i>	<i>-42</i>	<i>-41</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-45</i>
			Sum	Ks	Hg	Kg	Gg	Sa	Æf	Sk	Tj	Hm	Fm	Gm	Sm	Sb	Mt	Ss	Gravand (ind.)	Siland (ind.)

Forklaring på fuglearter i kolonneoverskriftene i tabellene:

- Ks = knoppsvane
- Kg = kanadagås
- Hg = hvitkinngås
- Gg = grågås
- Sa = stokkand
- Æf = ærfugl
- Tj = tjeld
- Rs = rødstilk
- Ss = strandsnipe
- Gh = gråhegre
- Hm = hettemåke
- Fm = fiskemåke
- Gm = gråmåke
- Sm = sildemåke
- Sb = svartbak
- Mt = makrellterne
- Sk = storskarv



Tofteholmen har få trygge havner, men vi fant en. Foto Tonny Andersen

Denne rapporten ligger til nedlasting her:

<http://oa.birdlife.no/9464>

Rådata for sjøfugltellingene ligger her:

<https://oa.birdlife.no/prosjektrapport/59>



avdeling
Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no