

Fugler i Fossum-området, Bærum 2000-2001



Torsten Källqvist

2002

BAKGRUNN	7
OBSERVASJONSOMRÅDET	7
OBSERVASJONER	12
Storlom	12
Smålom	12
Toppdykker	12
Storskarv	12
Gråhegre	13
Stokkand	13
Krikkand	14
Brunnakke	14
Toppand	14
Kvinand	15
Svartand	15
Laksand	15
Gravand	16
Grågås	16
Kortnebbgås	16
Canadagås	17
Knoppsvane	17
Sangsvane	18
Musvåk	18
Spurvehauk	18
Hønehauk	19

Fiskeørn	19
Lerkefalk	19
Vandrefalk	20
Tårnfalk	20
Orrfugl	20
Fasan	20
Trane	21
Vipe	21
Strandlo	22
Dverglo	22
Heilo	22
Enkeltbekkasin	22
Rugde	23
Storspove	23
Småspove	23
Skogsnipe	24
Strandsnipe	24
Gluttsnipe	24
Sildemåke	25
Gråmåke	25
Fiskemåke	26
Hettemåke	26
Makrellterne	27
Svartterne	27
Lomvi	27
Alkekonge	28

Ringdue	28
Tyrkerdue	28
Gjøk	28
Spurveugle	28
Kattugle	29
Tårnseiler	29
Grønnspekk	30
Flaggspekk	30
Svartspekk	31
Sanglerke	31
Låvesvale	32
Taksvale	32
Sandsvale	33
Ravn	33
Kråke	34
Kaie	34
Skjære	35
Nøttekråke	35
Nøtteskrike	36
Kjøttmeis	36
Blåmeis	37
Svartmeis	37
Toppmeis	38
Løvmeis	38
Granmeis	38
Stjertmeis	39

Spettmeis	39
Trekryper	39
Fossekall	40
Gjerdesmett	40
Duetrost	41
Gråtrost	41
Måltrost	41
Rødvingetrost	42
Svarttrost	43
Stenskvett	43
Buskskvett	44
Rødstjert	44
Blåstrupe	44
Rødstrupe	45
Myrsanger	46
Gulsanger	46
Munk	46
Hagesanger	47
Tornsanger	47
Møller	48
Løvsanger	48
Gransanger	49
Bøksanger	49
Fuglekonge	49
Grå fluesnapper	50
Svarthvit fluesnapper	50

Jernspurv	51
Heipiplerke	52
Trepiplerke	52
Linerle	53
Vintererle	53
Gulerle	54
Sidensvans	54
Tornskate	55
Stær	55
Kjernebiter	56
Grønnfink	56
Stillits	56
Grønnsisik	57
Tornirisk	58
Gråsisik	58
Dompap	58
Rosenfink	59
Korsnebb	59
Bokfink	60
Bjørkefink	60
Gulspurv	61
Sivspurv	62
Gråspurv	62
Pilfink	63
KOMMENTARER	63

Bakgrunn

Området rundt Fossum i vestre Bærum utmerker seg ikke spesielt som fuglelokalitet, men fordi det er et variert landskap med dyrket mark, barskog, løvskog, elv og innsjøer, fins her et ganske variert fugleliv. Her har jeg gjort uorganiserte observasjoner siden vi flyttet hit i 1982. Etter at en hund kom inn i bildet i 1998 ble vi nødt til å foreta daglige lufteturer i omgivelsene. Det førte til at jeg begynte å bli mer observant på variasjonene i forekomst av ulike fugler. I august 2000 begynte jeg å registrere alle arter jeg observerte på disse turene. Registreringene fortsatte ut året og videre hele 2001. I den mørkeste tiden var observasjonene stort sett begrenset til helgene, men en stor del av året ble det foretatt daglige registreringer på en kort morgenrunde langs med Lysakerelva og en lengre ettermiddagsrunde langs Bogstadvannet og opp mot Østervannet og Lathusåsen.

Observasjonsområdet

Alle observasjoner som er inkludert i denne rapport er foretatt i området rundt Fossum og Lathusåsen., avgrenset av Griniveien i sør, Bogstadvannet i øst, Østervann og veien fra demningen i Østervann til Listua i sør. (Se kart). Vandringsrutene har vanligvis utgått fra Ankerveien 220. Mange observasjoner er foretatt i området mellom utløpet av Bogstadvannet og fossen ved Ankerveien. Langs denne elvestrekningen er det en rik løvtrevegetasjon med or, bjørk, ask, selje og alm. Mange av almene er imidlertid nylig døde av almesyke. En del av området øst for elven ble ryddet noen år før observasjonsperioden, og der var nå en tett krattskog under etablering. Randområdet til golfbanen er interessant, bl.a. et lite holt med store osper, bjørk, gran og fur, hvor det oppbevares diverse utstyr og materialer til golfbanen. I ospene har spetter gjennom årene laget mange hull som utnyttes av stær, spettmeis og andre hullbeboere. I nærheten av holtet er det også en stor kompost hvor gress fra golfbanen blir deponert. Her er det mye mat å finne for troster og andre fugler, særlig om våren. I vinterhalvåret, når golfbanen var stengt ble ofte odden sør i Bogstadvannet besøkt og benyttet for observasjon av den østre delen av vannet mot badeplassen på Oslosiden.

Fra utløpet av Bogstadvannet gikk turene som regel langs med vannet fra Gryta (utløpet) forbi tømmerlageret til Strømstad og Lathus og så opp mot Østervannet på østsiden av Lathusåsen. Tømmerlagret er faktisk et ganske attraktivt område for mange fugler, bl.a. fordi tømret fører med seg, eller tiltrekker seg mye insekter, som bl.a. utnyttes av svaler og erler på sommeren og høsten. En alternativ rute som ofte ble brukt, særlig vår/sommer fulgte Bogstadvannet fra sagen til den lille badeplassen på Bærumssiden, hvor det er fin utsikt over til Sørkedalselvas innløp i Bogstadvannet. Her har elva nærmest dannet et delta hvor fuglelivet er rikt. Dette er den delen av Bogstadvannet hvor isen går først om våren og da samles ender og andre fugler her. Fra badeplassen gikk turen som regel mot vest gjennom en trist granplantasje på gammel eng, over en fyllplass for bark fra sagen og mot Kråka. Fra veien mot Kråka ble en sti opp mot Kråkedammen (også kalt Fløytemyra) fulgt. Ved Kråkedammen ble det av og til observert en del ender og vaderefugler. I området mellom Bogstadvannet og Østervannet er det flere mindre hogstfelter av ulik alder. Disse tilbyr et omvekslende miljø, som utnyttes av mange fugler. De første årene etter hogst vokser det opp geitrams, hvassdå og bringebær. Frøene av hvassdåen spises bl.a. av meiser og finker om høsten og bringebærene utnyttes av trost. På litt eldre hogstfelt kommer det bjørk, rogn og hyll, som vokser raskere enn de plantede grantrærne.



Kart over observasjonsområdet.

I forhold til den lille Kråkedammen har Østervann lite å by på, når det gjelder fugl. Fra østenden på vannet gikk turene som regel tilbake på en av de mange stiene over Lathusåsen. Her er det omvekslende granskog og mer åpen skog av furu. På Lathusåsen er fuglelivet rett sparsomt, men man får som regel med seg noen skogsmeiser og i blant svartspett, flaggspett, nøttekråke og nøtteskrike. I vårtrekket ble en observasjonspost på vestsiden av Lathusåsen med utsikt over dalen til Øverlandselva mot Kolsås benyttet. Her kan man bl.a. se en del musvåk og andre rovfugler som følger skogkanten mot nordøst.

Jordene rundt Foss, og randområdene til dyrket mark er tilholdssted for mange fugler hele året. Om sommeren henger lerkene stadig over området, og høst og vår søker mange flyttende fugler føde på jordene. Om vinteren bidrar fôring, bl.a. på den egne fôringsplassen i Ankerveien til å opprettholde en tett bestand av meis, spurv og fink i området.



Elvestrekningen mellom fossene øverst i Lysakerelva. Bildet er tatt fra broen ved Ankerveien. Området på høyere side ble ryddet to år tidligere slik at bare bjørke- og alnetrærne sto igjen. (Sept. 2001).



Fossen ved utløpet av Bogstadvannet. (Sept. 2001).



Vestsiden av Bogstadvannet. Tømmerlageret ved Fossum sag syns til venstre i bildet (Sept. 2001).



Utsikt over Bogstadvannet fra Lathusåsen mot Sørkedalselvas innløp. (Aug. 2002).



Utsikt fra veien til Østernvann mot Kråkedammen (Okt. 2001).




Parti av Lathusåsen med åpen furuskog i forgrunnen (Okt. 2001).

Observasjoner

For å få et bilde av forekomsten av ulike fugler gjennom året ble frekvensen av observasjoner for hver uke beregnet (antallet observasjoner dividert med antallet observasjonsdager). Fugler som ble sett alle observasjonsdager i én uke får altså frekvens=1. Resultatene er fremstilt i diagrammer for hver art. Det første observasjonsåret fra 21. august 2000 til 20. august 2001 er representert med blå stolper, mens høsten 2001 er vist som røde stolper.

Bildene av fugler er ikke alle tatt i området hvor observasjonene er gjort.

Storlom



Storlommen ble bare observert i Bogstadvannet ved to anledninger, høsten 2000 (14 og 25 oktober). Begge var voksne fugler i sommerdrakt.


Smålom

En ungfugl av smålom oppholdt seg i Bogstadvannet fra 12-28 oktober 2000.

Toppsykker

Toppsykker ble bare observert én gang (7.10.2000) i Bogstadvannet. Jeg har heller ikke sett den tidligere i området.


Storskarv






Storskarv ble sett sporadisk i flokker over Bogstadvannet, som mest 12 st. mot nord 18.08.2001. Ett eksemplar oppholdt seg flere uker i Bogstadvannet i mai-juni samme år.

Gråhegre




Gråhegre forekom hele året, som oftest enkeltvis, men i bland i par. Den fisker i Bogstadvannet, Kråkedammen og Lysakerelva.

Stokkand



Stokkanden er vanlig hele året bortsett fra i januar og februar, når også elven er islagt mellom utløpet og fossen ved Ankerveien. Flere ungekull ble observert i Bogstadvannet og Lysakerelva.

Krikkand




Krikkand ble observert i Bogstadvannet i trekkperiodene april-mai og september-oktober. (Den hekker i Triungsvannet og ble sett med unger der i slutten av juli 2001).

Brunnakke


Brunnakke ble bare sett én gang i perioden. Det var en hann 11.5. 2001 i Bogstadvannet.

Toppand



De fleste observasjonene av toppand ble gjort i råken ved utløpet av Sørkedalselva i Bogstadvannet i slutten av april. Ett par ble sett i Kråkedammen 4.6.2001.

Kvinand




Kvinanden holdt til i Bogstadvannet så lenge vannet var isfritt. Det ble også sett ungekull på sommeren. På våren ble det også sett kvinender i Kråkedammen, men det ble ingen ungekull der. En hunn holdt til i Lysakerelven mellom fossene i desember 2000 og besøkte også stedet i februar og mars. Kanskje det var den hunnen som hekket i kvinandkassen hos Løvenskiold, som passet på sitt revir. Det ble klekket unger her både i 2000 og 2001 og flere av dem vokste opp i elvestrekningen mellom fossene

Svartand

Svartand ble bare sett ved én anledning, i Bogstadvannet 20.10.2001 (1 ex.).

Laksand




Laksanden hekker i Bogstadvannet og ses regelmessig der så lenge vannet er åpent. I 2000 var siste observasjonen i midten av desember, men året etter var det kaldere, og laksanden forsvant en måned tidligere. Første observasjonen på våren 2001 var 18. februar i Lysakerelva. Minst ett ungekull ble sett i Bogstadvannet begge årene.

Gravand

Et par gravender ble sett i ”deltaet” i Bogstadvannet 14.05.2001.

Grågås




Grågåsen ble mest sett fra ettersommeren og ut over høsten til i slutten av oktober. De opptrådte i flokker i Bogstadvannet og beitet på åkrene og golfbanen på høsten. Første observasjon på våren 2001 var 16.04.

Kortnebbgås


Store flokker av kortnebbgås ble sett ved tre anledninger fra 21-29.04. 2001. De trakk nordover Sørkedalen på forholdsvis stor høyde.

Kanadagås




Kanadagåsen ses ofte i Bogstadvannet høst og vår. Fra 12 april til 4 juni lå et eller flere par ofte i området rundt "deltaet", men det ble tydeligvis ikke noen hekking. På høstene var det større flokker som brukte Bogstadvannet som base for beite på åkrene i nærheten. I 2000 oppholdt noen gjess seg i en råk nedenfor Bogstad gård helt til 25.12, men neste vinter la seg isen tidligere og siste observasjon var 18.11.

Knoppsvane



I år 2000 oppholdt det seg et par knoppsvaner i Bogstadvannet i to måneder fra 25.10. De lå som regel utenfor Bogstad. Etter at isen hadde lagt seg på det meste av vannet holdt de stand frem til juledagen i en liten råk nedenfor låven på Bogstad. Neste år dukket de opp igjen på omtrent samme tid (18.10), men forvant igjen etter bare tre dager.

Sangsvane




Sangvanen er tidligere sett rastende i Bogstadvannet om høsten, men i 2000 ble det bare gjort en observasjon av 4 eksemplar som fløy mot nord over vannet. Neste vår ble sangsvane sett noen ganger i april, enten flygende innover marka, eller i Bogstadvannet.

Musvåk



Musvåk ble bare observert fra Lathusåsen i vårtrekket i midten av april 2001 (uke 16). Våkene fulgte skogkanten fra Kolsås mot Brunkollen.


Spurvehauk





De fleste observasjonene av spurvehauk ble gjort i trekkperiodene (september-oktober og april). Få observasjoner på vinteren og sommeren tyder på at det ikke var noen stasjonære fugler i området. Noen år tidligere hekket spurvehauken på Lathusåsen, og da så man den ofte på sommeren. Enkelte vintre har den også gjort regelmessige besøk i hagen.

Hønehauk



Hønehauken ble sett noen ganger i april-mai, trolig streifende individer men kanskje også stasjonære. Den hekket i åsen vest for Bogstadvannet både i 2000 og 2001. Tiggende unger ble sett og hørt i området i august begge årene. Utover høsten ble de sett på jakt i nærområdet, noen ganger også utover Fossumjordene og Bogstadvannet. Siste observasjonen om høsten var 03.11 2001.

Fiskeørn



Våren 2001 ble fiskeørn observert to ganger (29.04 og 14.05), begge ganger flyvende over Bogstadvannet.

Lerkefalk

Lerkefalk ble kun observert én gang, over tømmerlageret ved sagen 22.06.2001. Fuglen ble sett på ganske nært hold når den fløy lavt over tømmeret og spiste på noe den hadde fanget og holdt med den ene foten. Den forsvant deretter i retning mot golfbanen.

Vandrefalk

En vandrefalk ble observert over Lathusåsen 16.04.2001. Den ble fanget inn i teleskopet fra en observasjonspost på sørsiden av åsen med utsikt mot Kolsås. Falken styrte fra Kolsås rett mot den plass hvor jeg sto slik at den ble observert ganske lenge før den til slutt fløy rett over meg mot nord.

Tårnfalk



En hannfugl oppholdt seg en tid våren 2001 i området mellom Kråka og Lathus. Den ble først sett 16.04 og senere ved to anledninger uken etter. Den slo seg ned i trær med utsikt over hogstfelt, hvor den trolig kunne finne bytte.

Orrfugl


Orrfugl ble bare sett ved en anledning i den aktuelle perioden. Det var 22.10.01. En hann fløy fra Lathusåsen over Østervannet i skumringen (kl. 17:30). Orrfuglen er vanlig lengre inn i skogen og har spillplass ved Triungsvannet. Noen år (trolig i begynnelsen av 1990-årene) hørte jeg den også spille lengre ned mot Fossum, bl.a. oppe på toppen av Lathusåsen.

Fasan




Fasanen ble hørt fra åkerkanten ved Haugen to ganger i mai og én gang i juli 2001. Enkelte tidligere år har den vært mer stasjonær i dette området og den er til og med sett i hagen i Ankerveien. Trolig er det en liten bestand i området mellom Øverland og Fossum.

Trane



Tre ganger i løpet av siste uke av april og 1 mai 2001 ble det sett traner. Det var bare par (to ganger) og ett enkeltindivid på trekk mot nord i Sørkedalen. Tidligere år er traner enkelte ganger sett rastende ved Triungsvann.

Vipe



Noen små flokker av vipe ble sett på trekk i midten av april. Noen rastet i "deltaet" i Bogstadvannet. Senere ble et par sett flere ganger over jordene ved Listua og Fossum. I mange år har viper holdt til på jordene ved Haga og det var kanskje de som av og til beveget seg helt opp til Fossum. I 1980-årene holdt et par til på det lille jordet mellom trelastlagret og Fossumbanen. I 2001 ble den siste observasjonen gjort 29.06. Det var 4 fugler som fløy over Fossum mot sør.

Strandlo

En strandlo ble sett i strandkanten av Bogstadvannet ved sagen 26.08.00.

Dverglo




Dverglo ble sett to ganger; 24.05 og 08.07 i 2001 på tømmerlagret ved sagen. Sommeren før (før regelmessige observasjoner ble startet) oppholdt seg et par stadig i dette området. Det har også skjedd tidligere år. At dvergloen ikke holdt till ved sagen i 2001 kan ha sammenheng med at det dette året var uvanlig mye tømmer lagret på plassen, slik at det var mindre åpne områder. Tidligere har det også vært et par i steinbruddet ved Listua, men sommeren 2001 var utbyggingen begynt her og hekkelokalet ødelagt.

Heilo



En heilo ble hørt på trekk over Fossum om natten 30.04.2001.


Enkeltebekkasin



Enkeltebekkasinen ble sett ganske hyppig fra midten av mai til midten av juli 2001 og senere enkelte ganger frem til slutten av august. Første observasjonen i 2001 var 06.05. De fleste


gangene ble enkeltbekkasinen sett eller hørt over myren innerst i Bogstadvannet (vest) eller ved Kråkedammen.

Rugde



Første observasjonen av rugde i 2001 var 29.04. Senere ble den sett flere ganger i mai i spilleflukt ved Lathus. Den følger samme rute som den gjort i flere år – over skogkanten ved lysløypa, over veien og tilbake mot jordet ved Lathus. Siste observasjon var 14.06.

Storspove




Alle observasjonene av storspove var av trekkende fugl i april 2001. Første gang var 15.04, når en liten flokk på 6 fugler fløy mot nord over Bogstadvannet. En gang ble Storspove sett rastende i ”deltaet” i Bogstadvannet (sammen med en småspove).

Småspove


Småspove ble bare sett ved én anledning. Det var 23.04.2001, når et eksemplar rastet i ”deltaet” i Bogstadvannet sammen med en storspove. Ved at begge kunne observeres samtidig i teleskop fra badeplassen ved Kråkebråtan kunne jeg tydelig se forskjellen i størrelse og nebbens form.

Skogsnipe



Skogsnipen ble sett ganske ofte i andre halvdel av april (første gang 21.04.2001) og senere noe mer sporadisk frem til midten av juli. I april ble den oftest sett på vestsiden av Bogstadvannet ved barkfyllingen og senere på sommeren ved Kråkedammen og på Lathusåsen vest for Kråkedammen. At den oppholdt seg der om sommeren kan tyde på hekking i området.

Strandsnipe




Strandsnipen ble sett regelmessig i Bogstadvannet fra begynnelsen av mai til midten av august. Første observasjonen i 2001 var 04.05. Flere par hekker trolig rundt sjøen og man ser dem ofte langs med stranden nedenfor Kråkebråtan. Noen år tidligere hekket den ved Lysakerelva like nedenfor utløpet fra Bogstadvannet.

Gluttsnipe


Gluttsnipe ble sett tre ganger i 2001, første gangen ved Bogstadvannet (Gryta) 17.05. Et eksemplar ble observert ved Kråkedammen 25.07. (Noen dager tidligere ble det sett en gluttsnipe ved Triungsvannet). Den 12.08. fløy en gluttsnipe mot sør over Fossum.

Sildemåke




Sildemåken oppholder seg regelmessig i Bogstadvannet om sommeren. Første observasjonen i 2001 var 08.04, og den siste 03.09. Fra mai til begynnelsen av august ble et par sett stort sett daglig. I juli var det også en tiggende ungfugl her. Den kunne fly, så det er uklart om den var resultatet av hekking i Bogstadvannet

Gråmåke




Gråmåke ble sett mest hyppig i april-august. Om sommeren fløy gråmåkene daglig inn til Bogstadvannet fra fjorden. Merkelig nok ble den ikke observert i månedene september og oktober begge årene. I november og desember derimot ble den igjen forholdsvis vanlig, før isen la seg på Bogstadvannet. Enkelte overflygende eksemplarer ble sett gjennom vinteren.

Fiskemåke



Fiskemåken ble sett nesten daglig, så lenge Bogstadvannet var isfritt. På sommeren hekker den i Bogstadvannet og bruker bl.a. noen gamle stolper ute i vannet som plass til rede. Ellers i året ser man den også rundt vannet eller i flokker på jordene etter pløying og våronn.


Hettemåke



Alkekonge

En alkekonge ble sett svømmende i Bogstadvannet om kvelden 02.11.2000. Den kom helt inn til stranden nede ved sagen og kunne observeres på ca. 2 meters hold. Som for lomvi, dreier det seg vel om et strøksempplar som har fløyet inn fra Oslofjorden.

Ringdue



Første observasjon i 2001 var 20.03. Deretter ble den sett nesten alle observasjonsdager frem til slutten av september og litt mer sporadisk til midten av oktober. Siste observasjon var 24.10.2000 og 21.10 året etter. I august-september holder store flokker av duer til på jordene rundt Fossum.

Tyrkerdue

Tyrkerduen er svært urban og beveger seg ikke gjerne så langt ut på landet som til Fossumområdet. Den holder imidlertid till på Røa og de observasjoner som er gjort i den aktuelle perioden er ved Griniveien nær broen over Lysakerelva (01.04 og 26.05.2001). Tidligere har jeg den sett en gang ved Listua.


Gjøk

Gjøk ble bare notert én gang i løpet av observasjonsperioden. En gjøk ble hørt rope fra østsiden av Bogstadvannet 04.06.2001.

Spurveugle


Spurveuglen kan ses sporadisk i området enkelte vintre. Den er bl.a. sett i hagen tidligere, og ved rensing av fuglekasser på Lathusåsen ble det et år funnet lager av døde meiser, som tyder på at spurveuglen hadde oppholdt seg der. I den aktuelle observasjonsperioden, ble spurveuglen bare sett én gang, ved Gryta 26.12.2000.

Kattugle




En kattugle ble sett jagende om kveldene ved sagen og i kanten av jordet ved Haugen flere ganger i oktober og november 2000. Senere på vinteren ble den hørt ropende flere kvelder ulike steder i Lathusområdet. I februar ble et par sett sammen ved Haugen og det så ut til å kunne gå mot hekking, dersom de kunne finne et egnet bosted. I mars ble imidlertid en kattugle funnet død, hengende i en kraftledningsstolpe ved Kråkebråtan og deretter ble kattuglen ikke observert før i oktober.

Tårnseiler




Tårnseileren ble sett de fleste observasjonsdager fra midten av mai til og med august. Første observasjon i 2001 var 16.05 og siste 16.09. Året før ble tårnseileren sist sett 08.09. Tårnseileren holder bl.a. til ved Fossum gamle skole, hvor den hekker under taksteinene. Varme sommerkvelder råflyver de i store flokker rundt Fossum.

Grønnspekk




Grønnspekk holder til i området hele året, men gjør lite av seg på vinteren og blir ikke observert så ofte da. De hyppigste observasjonene er om våren, i mars-april når den etablerer revir, og i september-oktober. Grønnspekk har fast tilhold i parken på Bogstad, men er ofte over på andre siden av vannet, bl. a. rundt golfbanen. Mange hull i ospene ved golfbanen tyder på at den av og til hekker der. I 2001 begynte den å hakke et hull i en osp rett overfor sagen, men det ble aldri fullført.

Flaggspekk




Flaggspekk ble sett alle måneder med unntak for i januar 2001. De hyppigste observasjonene var i april-juni. I 2001 hekket den i skogen ved fossen i Lysakerelva (Ankerveien). Flaggspekk ble ofte sett på Lathusåsen, hvor den spiser kongler, og rundt bebyggelsen på Fossum. Den kommer av og til frem og spiser på fôringsplassen i hagen.

Svartspett




Svartspetten holder til i barskogen på Lathusåsen og lengre innover i marka. Den ble observert sporadisk i mars til oktober.

Sanglerke




I 2001 ble den første sanglerken på Fossum sett 1.4. Flere lerker holder til på Fossumjordene på sommeren og lerke ble notert de fleste observasjonsdagene i april-juni. Den siste sangen ble hørt 16.07. Ingen lerker ble sett i august, men i september-oktober dukket de opp igjen på trekk mot sør. Siste observasjonen i 2000 var 6.10 og året etter 7.10.

Låvesvale




Låvesvalen ble sett nesten alle observasjonsdager fra mai til september. Første observasjon 2001 var 03.05. Siste observasjon på høsten var 06.10 i 2000 og 22.09 året etter. Låvesvalen opptrer i flokker rundt sagen. Et stort antall holder till over tømmerlagret i august-september.

Taksvale




Taksvalen ble sett de fleste observasjonsdager i mai-august. I 2001 ble den først sett 29.04, dvs. noen dager før låvesvalen. Derimot forsvant den fra området tidligere enn låvesvalen begge årene. I 2000 ble den sist sett 09.09 og i 2001 den 03.09. Taksvalen opptrer ofte sammen med låvesvalen i flokker rundt sagen.

Sandsvale




Sandsvale ble observert sporadisk i perioden mai-august. Alle observasjoner var av fugler som jaktet over Bogstadvannet eller tømmerlageret ved sagen. Første observasjon i 2001 var 17.05.

Ravn




De fleste observasjonene av ravn ble gjort i april-mai, og da som regel på Lathusåsen eller nær Kråkedammen. Den oppholdt seg ofte i fjellveggen nordvest for Kråkedammen, men det ble tydeligvis ikke noen hekking der. Sannsynligvis hekker den lengre inn i marka. Den blir ofte sett i området rundt Triungsvannet

Kråke




Kråke ble sett neste alle observasjonsdager gjennom hele året. Den opptrer enkeltvis eller i flokker i hele området. I 2000 hekket et par i granskogen mellom sagen og Kråkebråtan og året etter i et tre på golfbanen rett overfor sagen.

Kaie




Kaie ble sett på våren og høsten, og mer sjelden på vinteren. Ingen observasjoner i juli-august tyder på at den ikke hekket i området. Kaien opptrer i par eller små flokker på Fossumjordene eller ved den gamle bebyggelsen på Fossum.

Skjære




Skjæren er blant de mest hyppig observerte fuglene. Det skyldes at den opptrer hele året rundt bebyggelsen på Fossum og er ofte den fugl man først ser når man går ut av døren.

Nøttekråke




Nøttekråken holder til på Lathusåsen. Likevel ble den ikke sett så ofte i vinterhalvåret. De hyppigste observasjonene ble gjort i august-oktober når nøttekråkene transporterer nøtter inn i skogen fra mer urbane strøk.

Nøtteskrike




Nøtteskriken ble observert alle måneder unntatt i februar. Det er trolig en tilfeldighet, men observasjonene på vinteren er sporadiske. September er den måned nøtteskriken er mest synlig i åpen terreng. Ellers ble den oftest sett i barskog på Lathusåsen.

Kjøttmeis




Kjøttmeisen opptrer rundt bebyggelsen på Fossum og henter mat på fôringsplassen i hagen hele året. Derfor er de en av de fugler som ble observert oftest. Den hekker de fleste somrene i en av fuglekassene i hagen.

Blåmeis




Blåmeisen er vanlig rundt bebyggelsen på Fossum og i løvskogsvegetasjon i området. Den ble imidlertid sett noe mindre hyppig enn kjøttmeisen, særlig på sommeren. Blåmeisen besøker fôringsplassen daglig i vinterhalvåret.

Svartmeis



Svartmeisen forekommer sparsomt på Lathusåsen og ble sett flere ganger høsten 2000. På våren ble den observert syngende noen ganger, første gangen 03.03. Den sang også i granskogen i Løvenskiolds hage et par dager. Svartmeisen ble ikke sett på sommeren eller høsten 2001. Svartmeisen beveger seg ikke gjerne langt fra barskogen, men den har vært sett på fôringsplassen i Ankerveien tidligere.

Toppmeis




Toppmeisen forekommer sparsomt på Lthusåsen og alle observasjoner ble gjort der. Den ble sett sporadisk gjennom hele året, men ikke i februar-mars. Det skyldes trolig at de områder hvor toppmeisen forekommer ble sjeldnere besøkt i denne perioden.

Løvmeis

Løvmeisen ble kun observert to ganger i observasjonsperioden. Begge observasjonene var i løvskogen ved Lysakerelva like nedenfor utløpet fra Bogstadvannet (20.10.2000 og 07.09.2001). Dette virker å være en egnet biotop for løvmeis, men likevel er det sjelden man ser den i dette området. Jeg kan bare huske å ha sett løvmeis i Fossumområdet et par ganger tidligere.

Granmeis




Granmeisen er den vanligste av "skogsmeisene" på Lthusåsen. Den ble sett alle årets måneder, men hyppigst på høsten, når årsungene drar rundt og leter etter føde. Da kommer de også ut av barskogen, bl.a. på hogstfeltene, men ellers er de som regel å se i granskog på Lthusåsen. Noen ganger tidligere år er granmeis sett ved føringsplassen i Ankerveien.

Stjertmeis


Stjertmeisen er sjelden i området, og ble bare sett én gang i observasjonsperioden. Det var 17.11.2001, når en flokk på 8 st. dro mot sør langs med Fossumveien. Den er tidligere observert i løvskogen ved Lysakerelva, som burde være en egnet biotop.

Spettmeis




Spettmeisen ble sett ganske ofte i hele observasjonsperioden. Den hekket i et hakkespetthull i en osp på golfbanen sommeren 2001, og oppholdt seg mest i området rundt Lysakerelvas øvre løp. Noen ganger besøkte den fôringsplassen i Ankerveien og på ettersommeren ble spettmeis sett ved Lathus.

Trekryper




Trekryperen ble sett sporadisk i observasjonsperioden. De fleste observasjonene ble gjort på Lathusåsen, men den er også observert i skogen ved Lysakerelva. Jeg har et inntrykk av at den har vært vanligere i området tidligere.

Fossefall



Fossekallen oppholder seg hele året langs med Lysakerelva og ble ofte sett på strekningen mellom de to fossene i øvre delen av elven. Noen ganger har den hekket ved fossen ved Ankerveien, enten under broen eller i skaret på sørsiden av fossen. I 2001 hekket det trolig lengre ned i elva og ble derfor ikke sett så ofte på sommeren

Gjerdsmett




Gjerdsmett ble sett eller hørt regelmessig fra slutten av mars til oktober 2001. Året før ble den også sett i november. De fleste observasjonene ble gjort langs Lysakerelva ovenfor Ankerveien. Her hekket den, og sangen ljomet mellom elvebreddene hele sommeren og høsten. Noen eksemplarer oppholder seg trolig her også på vinteren, men da gjør den lite av seg. Den kan imidlertid begynne å synge allerede i begynnelsen av mars dersom det er mildvær. Gjerdsmett er også ganske vanlig på hogstfeltene rundt Lathusåsen. Noen ganger har den vært sett i hagen.

Duetrost


Duetrosten kan man se sporadisk i området i trekkperioden om våren. Den opptrer ofte sammen med rødvinge-og måltrost bl.a. rundt golfbanen. I 2001 ble den sett 4 ganger i perioden 15-22.04. Den første observasjonen skjedde ved golfbanens kompost, som er et populært tilhold for trost og andre fugler på denne tiden. En uke senere ble en duetrost sett ved Kråkedammen. Høsten 2000 ble det også gjort en observasjon på Lathusåsen 24.09.

Gråtrost



Gråtrosten er meget vanlig i området og særlig langs med Lysakerelva. Den ble sett nesten alle observasjonsdager fra april til oktober. Første vårobservasjon i 2001 var 03.04. Gråtrosten opptrer i store flokker i trekkperiodene i april og september-oktober. Enkelte eksemplarer overvintrer og gråtrosten ble sett alle årets måneder.


Måltrost






Måltrosten er vanlig hekkfugl i granskog i området. Første observasjon på våren 2001 var 05.04. Den opptrer i blandende trostflokker i trekkperiodene, bl.a. på golfbanen. Tidlig i hekkingsperioden ble den sett eller hørt alle observasjonsdager. Etter at den sluttet å synge ble den registrert litt mer sporadisk.

Rødvingetrost




Rødvingetrosten er en meget vanlig hekkfugl i området, både i barrskog på Lathusåsen og løvskog rundt Fossumjordene, Bogstadvannet og golfbanen. I trekkperioden opptrer den i store flokker sammen med grå-og måltrost. I 2001 ble den først sett 06.04 (dagen etter måltrosten), men den holder ut litt lengre enn måltrosten om høsten. Siste observasjon var 19.11 i 2000 og 04.11 året etter.

Svarttrost




Svarttrosten er en vanlig hekkefugl i løv-og granskog i området. Noen eksemplarer oppholder seg i bebyggelsen på Fossum på vinteren og ble derfor observert nesten daglig gjennom hele året. Perioden med minst hyppige observasjoner var faktisk i august/september, dvs. mellom hekking og høsttrekk.

Stenskvett




Stenskvetten hekket trolig ikke i området og ble bare sett i trekkperiodene vår og høst. Første observasjon i 2001 var 12.05 på tømmerlageret. I september ble den også sett der, samt på Fossumjordene.

Buskskvett




Første observasjon av buskskvett i 2001 var 12.05. Denne sommeren hekket et par i krattet mellom Gryta og sagen, og buskskvett ble derfor sett hyppig fra mai-august. De siste eksemplarene ble sett i havreåkeren ved Fossum i begynnelsen av september.

Rødstjert



Det ble ikke sett en eneste rødstjert i området på våren 2001. Det er uvanlig. I trekkperioden bruker man se dem ganske ofte, og året før sang en hann noen dager på toppen av Lathusåsen. I perioden 29.07-12.08 ble imidlertid ungfugler av rødstjert sett flere ganger – alle ved Kråkedammen. Det kan kanskje tyde på hekking i nærheten.


Blåstrupe






Blåstrupe ble bare sett tre ganger, mellom 19-26.08 i 2001. Alle observasjonene ble gjort i buskvegetasjonen i kanten av Fossumjordet på sørsiden av sagen. Også tidligere er blåstruper på høsttrekk sett samme sted. Det ble altså ikke observert blåstrupe på våren dette året. Tidligere er blåstrupe på vårtrekk sett i hagen (19.05.1996).

Rødstrupe




Rødstrupa er en meget vanlig hekkefugl i løv og barskog i området. Første observasjon i 2001 var 04.04. Til tross for stor forekomst ble rødstrupa ikke observert på alle observasjonsdager på sommeren etter at den mest intensive sangperioden var slutt. På ettersommeren og høsten oppholder den seg i ris og kratt, særlig på hogstfeltene. Enkelte ganger kan man høre syngende rødstrupe på høsten. Det skjedde f.eks. 06.10.2001. Observasjonene avtok i hyppighet utover i oktober og de siste observasjonene ble gjort hhv. 04.11 og 27.10

Myrsanger




En myrsanger oppholdt seg i bringebærkrattet ved Gryta i én måned fra 15.06.2001. Det samme skjedde for øvrig året før. Den kunne høres syngende sent om kvelden, men også i dagslys om morgenen. Den ble altså ikke observert etter 15.07 og det er uvisst om den hekker. Det ble aldri sett mer enn ett eksemplar.

Gulsanger



Gulsangeren har i flere år sunget i løvskogen langs med Lysakerelva mellom fossene. I 2001 ble den først hørt 24.05. Deretter sang den daglig i ca. én uke. En måned senere var den tilbake og sang igjen i ca. én uke.


Munk



Munken er ganske vanlig i områder med løv-vegetasjon. De hyppigste registreringene er i


perioden når den synger. I august-september ble den mest sett i buskvegetasjon på hogstfelt, hvor den bl.a. spiser bær av rødhyll. Første observasjonen i 2001 var 12.05 og den siste 29.09.

Hagesanger




Hagesangere en forholdsvis vanlig i løvskog, bl.a. langs med Lysakerelva. Første observasjon i 2001 var 19.05. Deretter ble den registrert daglig frem til midten av juli. Etter at hagesangeren slutter å synge er den ikke så lett å legge merke til, men utover i august ble den ofte sett på jakt etter insektlarver i buskvegetasjon, også i hagen. Enkelte eksemplarer ble sett utover i september. Siste observasjon i 2001 ble gjort 22.09.

Tornsanger




Tornsangeren hekker flere steder hvor det er buskkratt, særlig bringebær i nærheten av åpen terreng og dyrket mark. I 2001 holdt et par f.eks. til i bringebærkrattet ved Gryta, og et annet ved steinørkenen mellom sagen og Lathus. Første observasjon i 2001 var 17.05. Senere ble tornsangeren registrert forholdsvis ofte frem til i midten av juli. Enkelte eksemplarer ble sett i august frem til 26.08.

Møller




Årets første møller hør man ofte syngende i hagen. I 2001 skjedde det 12.05. Deretter ble den hørt og sett sporadisk i området frem til slutten av juni, ofte på hogstfelt med løv-vegetasjon. Et eksemplar ble igjen sett om høsten, 15.09.

Løvsanger




Løvsangeren er en meget vanlig hekkefugl overalt hvor det er noe løv-vegetasjon. Den ble registrert de fleste observasjonsdager om sommeren. Første observasjon i 2001 var trolig 08.04, men forveksling med gransanger kan ikke utelukkes. Løvsangeren ble hørt syngende første gang 03.05. Utover i august ser man ofte unge løvsangere på jakt i løvkraut. Enkelte individer kan bli igjen utover i oktober. I 2001 ble en løvsanger sett i hagen 13.10 og året før var siste observasjon 15.10.

Gransanger




Gransangere ser man ofte når den trekker mot nord på våren. Hvis den ikke gir lyd fra seg er den imidlertid vanskelig å skille fra løvsangere. Den første noteringen i 2001 (14.04) på toppen av Lathusåsen er temmelig sikker. Den hadde en annerledes loddelyd enn løvsangeren. Senere i april ble det sett flere “lydløse” sangere som ble notert som gransangere pga. sine mørke ben. Ingen syngende gransangere ble registrert i området i hekkingstiden 2001, men tilløp til sang ble hørt fra et eksemplar på trekk 19.08.

Bøksanger




En bøksanger holdt til i tett granskog mellom barkfyllingen og Gryta i slutten av mai og begynnelsen av juni. Ved en anledning ble det også registrert syngende bøksanger på vestsiden av Lathusåsen. 17.07 sang en bøksanger ved Lysakerelva mellom fossene.

Fuglekonge




Fuglekongen er vanlig på Lathusåsen og andre steder hvor det er litt sammenhengende barskog. Observasjonene fordeler seg over hele året, men frekvensen var lavest i november og februar.

Grå fluesnapper



Grå fluesnapper ble sett fra 12.05 til 29.08 i 2001. De fleste observasjonene ble gjort i området langs med Lysakerelven mellom fossene. Observasjonsfrekvensen var høyest i slutten av juni. Senere ble streifende eksemplarer sett mange steder i området. I 2000 hadde et par sitt rede på en hylle under broen ved utløpet av Bogstadvannet. Her måtte jeg utføre en redningsaksjon i forbindelse med et voldsomt regnvær. Vannet hadde nesten skylt vekk redet og ungene hadde krøpet ut på broen. Én var allerede død og en annen i meget dårlig forfatning. Den ble tatt med hjem over natten. Jeg monterte en trekasse under broen hvor redet hadde vært og plasserte de gjenlevende ungene der. Senere kunde jeg konstatere ungene ble føret av foreldrene.


Svarthvit fluesnapper






I begynnelsen av mai drar det alltid en del svarthvite fluesnappere gjennom området for å sjekke hekkingsmulighetene. Den har hekket i hagen i Ankerveien. I 2001 ble den første observert 04.05, i hagen til Løvenskiold i Ankerveien. En hann sang senere en lengre tid like nedenfor fossen ved utløpet fra Bogstadvannet og de fleste observasjonene i mai og juni var i dette området. Senere på sommeren ble fluesnapper bare sett to ganger – den siste 14.08 ved veien opp mot Østervannet.

Jernspurv




Heiplierke




Heiplierken ble sett i trekkperiodene i april-mai og august-september. Den opptrådte da i flokker eller enkeltvis på jordene og golfbanen. Første observasjon i 2001 var 11.04. På høsten ble heiplierken sett siste gangen 07.10 begge årene.

Trepiplerke




De fleste observasjonene av trepiplerke ble gjort på Lathusåsen, hvor det sannsynligvis hekket noen par. Trepiplerken ble sett fra slutten av april til slutten av august. Den første observasjonen i 2001 var 29.04, og de siste 26.08 i 2000 og 25.08 året etter.

Linerle



Linerlen er både vanlig og i øyenfallende og ble sett nesten alle observasjonsdager fra midten av april til slutten av september. Det sikreste tilholdsstedet er tømmerlageret ved Bogstadvannet, hvor det alltid er noen linerler på sommeren og store flokker på høsttrekk i august-september. Første observasjon i 2001 var 03.04. Strøkeemplarer ble sett utover i oktober, og siste observasjon var 15.10 i 2000 og 14.10 i 2001.


Vintererle



Vintererlen ble som regel sett i nærheten av Lysakerelva mellom Bogstadvannet og Griniveien. Her hekker den trolig hvert år, men bostedet varierer. Mest populært er de stenlagte damkonstruksjonene ved utløpet av Bogstadvannet og ved den gamle møllen. I 2001 var det trolig den nedre boplassen som ble valgt, og besøkene i den øvre delen av elva, som ble omfattet av de fleste turene, var derfor litt mindre hyppige. Likevel – vintererlen ble sett regelmessig fra slutten av mars til slutten av september og deretter mer sporadisk til i begynnelsen av november. I september var den ofte å se sammen med linerler på tømmerlageret ved sagen. Navnet vintererle kan synes noe overdrevet, men vintererlen kommer som regel noe tidligere og reiser noe senere enn linerlen. Første observasjon i 2001 var 31.03 og den siste


13.10. Året før ble den siste vintererlen sett på
tømmerlageret 11.11.

Gulerle




Gulerlen ser man normalt bare i trekktiden og mest på høsten, da den opptrer sammen med linerler og heipiplerker. Den ble bare sett to ganger på våren 2001, den første 01.05. Mest vanlig var den i midten av august og de siste observasjonene ble gjort 10.09 i 2000 og 30.08 året etter.

Sidensvans




Forekomsten av sidensvans varierer mye fra år til år, og de to observasjonsårene var det ganske lite sidensvans å se i området. I 2000 ble små flokker av sidensvans sett på Fossum i slutten av oktober - begynnelsen av november. Året etter kom de noe tidligere, og ble bare sett i oktober. Andre steder i nærheten ble sidensvans sett også utover vinteren (feks. på Hovseter).

Tornskate



Tornskaten har de siste årene hekket med noen par på hogstfelter på Lathusåsen, bl.a. mellom Kråkedammen og Østernvannet. De fleste observasjonene er fra dette området. I 2001 ble den først sett 12.05 og siste gang 25.08

Stær




Stæren hekker regelmessig i området. Særlig populært er et lite treholt med ospetrær på golfbanen. Her har flaggspett og grønnspett laget mange hull, som utnyttes av stæren. Golfbanen er også et populært område å sanke mark på for stæren. Den første stæren ble sett 04.04 i 2001. Deretter oppholdt de seg i området frem til slutten av juli. I september – oktober ble det igjen gjort observasjoner av stær på høsttrekk. Den siste, et ensomt eksemplar ble sett på på jorderet sør for sagen 14.10.

Kjernebiter


Kjernebiter ble bare sett én gang i løpet av observasjonsperioden. Det var 17.06.01 som et eksemplar fløy lavt over hagen på Fossum. I følge Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus skal den hekke i nærheten, men det var første gangen jeg har sett den i området.

Grønnfink



Grønnfinken er vanlig i området hele året. Ved at den oppholder seg nær bebyggelsen er den også blandt de mest hyppig registrerte fuglene. Grønnfinken besøker fôringsplassen hele året dersom den får solsikkefrø, og særlig tidlig på våren kan besøket (og frøkonsumsjonen) være stort.


Stillits





Stillitsen ser man ganske ofte i området rundt sagan og golfbanen. Vanlig tilhold er veikanter og områder med tistel og annet ugrass, som feks. ved Gryta og sør for trelastlageret. Den hekket trolig begge årene i skogen mellom golfbanen og elva, og flokker med ungfugler ble sett i juli. De fleste observasjonene er fra april til september, men enkelte eksemplarer eller små flokker ble også sett tidligere og senere på året. Den eneste vinterobservasjonen ble gjort på julaften 2001.

Grønnsisik




Grønnsisiken er vanlig i området og ble sett nesten daglig i april til september. Noe lavere observasjonshyppighet var det imidlertid i august. Dette skyldes kanskje at de lokale fuglene har trukket seg litt unna, mens høsttrekket ikke kommet i gang enda. De to observasjonsårene var det lite grønnsisik å se på vinteren. Bare to ganger i januar og februar ble grønnsisik registrert. Jeg har en følelse av at grønnsisiken tidligere har vært mer vanlig på vinteren. Det kan kanskje ha sammenheng med tilgangen på mat, feks. orfrø.

Tornirisk




Tornirisen hekker ikke i området og blir ikke sett så ofte. Små flokker kan slå seg ned på flytting, men noen sikker observasjon ble ikke gjort våren 2001. Derimot ble en hann sett i strandkanten av Bogstadvannet ved sagen 25.06.01.

Gråsisik



Gråsisiken hekker trolig ikke i området, men opptrer i flokker om høsten. Det var få observasjoner på våren i 2001. Tidligere år har gråsisiken besøkt fôringsplassen på vinteren og våren. Det var mer gråsisik i området høsten 2001 enn året før. De første kom allerede i juli og flokker ble sett i området til i desember.


Dompap






Dompapen er ganske vanlig i området hele året, men forekomsten varierer litt fra år til år. Observasjonshyppigheten tyder på at det var mer dompap på høsten 2001 enn året før. Den trekker ofte frem mot bebyggelsen og de fleste observasjonene ble gjort i området Fossum-Lathus. Dompapen kan besøke fôringsplassen gjennom hele året, men mest tidlig på våren. Noen år, når dompap har hekket i granskogen ved Løvenskiolds villa har de kommet frem daglig for å spise solsikkefrø til langt ut på sommeren.

Rosenfink



Rosenfink blir sett og hørt i området hver vår, men det er usikkert om den har hekket her. I 2001 ble den først observert syngende i Løvenskiolds hage 27.04. Senere ble den sett ved flere anledninger, som regel nær Bogstadvannet. En hann spiste solsikkefrø på foringsplassen i hagen 20.05.


Korsnebb



Det er vanskelig å skille mellom gran- og furukorsnebb og derfor er de slått sammen her. Forekomsten av korsnebb i området er meget varierende. De to observasjonsårene var ingen gode


korsnebbår. Fra i juni 2001 ble små flokker imidlertid observert flygende over området, som regel på Lathusåsen. 22 desember ble to hanner sett på bakken i hagen. Det var trolig furukorsnebb.

Bokfink



Bokfink er en av de vanligste hekkefuglene i området og ble sett nesten alle observasjonsdager fra april til september. Første observasjonen i 2001 var 24.03. I tillegg til de stasjonære fuglene opptrer bokfinken i flokker på jordene vår og høst. På høsten ser man flokker av bokfink på nye hogstfelt, hvor de spiser frøene av hvassdåen.


Bjørkefink






Bjørkfink hekket trolig ikke innefor observasjonsområdet i de to observasjonsårene, men ble sett i trekkperiodene (april og september-oktober). Da opptrådte den ofte i flokker sammen med bokfink. Enkelte bjerkefinker ble også sett utover høsten og vinteren i 2001. Bjerkefinken besøkte foringsplassen flere ganger i november og desember det året. Første observasjon i 2001 ble ikke gjort før 16.04. To observasjoner på sommeren viser at det er ikke langt til hekkeplasser innover i marka. En liten gruppe bjørkefink ble sett ved Triungsvann i juli.

Gulspurv




Gulspurven er vanlig i området hele året, men observasjonsfrekvensen viser at forekomsten var lavest i februar. Gulspurven hekker flere steder i randsonen mellom dyrket mark og skog, samt på hogstfelter. På vinteren ser man ofte gulspurven rundt bebyggelsen og på foringsplasser.

Sivspurv




Sivspurv ble bare sett på våren og forsommeren. Første observasjonen ble gjort 12.04. I april ble sivspurv sett i buskvegetasjon rundt Fossumjordene eller i strasndvegetasjonen ved Bogstadvannet. Alle observasjoner senere var ved Bogstadvannet mellom sagen og badeplassen ved Kråkebråtan. Det var imidlertid ingen tegn til hekking, og den siste sivspurven ble sett 17.06.

Gråspurv



Gråspurven kan lett stikke seg bort i flokkene med pilfink som opptrer rundt Fossum. Av og til kommer gråspurven frem til fôringsplassen, men den er mye mindre vanlig enn pilfinken.

Pilfink



Pilfink var en av de hyppigst observerte fuglene. Det skyldes at den alltid oppholder seg ved bebyggelsen ved Ankerveien, særlig ved den gamle skolen. Her hekker flere par under taksteinene. I september driver ungfuglene rundet i store flokker i kornåkrene.

Kommentarer

Totalt ble 123 arter observert i perioden fra august 2000 til 31. desember 2001. Av disse ble 121 sett det første året. Bare orrfugl og stjermeis kom til den andre høsten. Hyppigheten av observasjoner av de 50 mest observerte artene er fremstilt i figuren på neste side. Listen toppes av kråke, pilfink, kjøttmeis og skjære. Disse artene ble observert på over 90 % av observasjonsdagene. Det betyr ikke at de er de vanligste fuglene i området, men at de er lett synlige og opptrer rundt bebyggelsen hele året. Blant fugler som ikke ble sett på vinteren ligger ringdue, fiskemåke og bokfink høyt på listen.


Om man ser på hvordan artsantallet på de ulike observasjonsdagene fordeler seg i løpet av året ser man at 7-15 arter er vanlig resultat fra januar til i slutten av mars. I begynnelsen av april stiger antallet bratt til et maksimum i mai-juni. På denne tiden ble det vanligvis sett mer enn 30 arter per dag. Enkelte dager ble det sett mer enn 50 arter. Fra i juli og frem til november var det en jevn nedgang i antall arter til de normale vinternoteringene på ca. 10-15 arter i desember.

Av fugler som ikke ble sett i observasjonsperioden, men som tidligere er observert en eller flere ganger i området kan nevnes:


- **Dvergalk:** forekommer på vårtrekk i april
- **Skogdue:** Kan inngå i flokkene av ringdue
- **Haukugle:** Sett én gang (5.11.1983)
- **Gråspett:** Holdt til på Lathusåsen i begynnelsen av 1980-årene. Den ble også sett fremme ved bebyggelsen på vinteren.
- **Dvergspett:** Har vært observert ulike steder i området, også i askene i Ankerveien. En liten spett ble sett flygende over sagen i juli 2002. Den hadde ikke rødt under stjerten og var trolig en dvergspett, men det ble ikke verifisert.

- **Vendehals:** Ble observert i juli 2000 ved Gryta.
- **Fjellerke:** Sett én gang på våren på jordet mellom Ankerveien og sagen (dato ikke registrert).
- **Kornkråke:** Observert noen ganger på våren.
- **Ringtrost:** Observert noen ganger på våren, senest 1999. Én gang i hagen.
- **Svart rødstjert:** Ett par ble sett på sagen 28.04.1996 og har visstnok hekket der tidligere.

Mange andre fugler burde sikkert vært nevnt her, men enten har jeg ikke sett dem i området eller så har jeg glemt det. Med tanke på at Oslofjorden leder mange fugler på vårtrekk inn mot Bærum og Oslo, skulle man tro at mange også passerer tilfeldig forbi Fossum. I forhold til området rundt Fornebu og Holterkilen som er en kjent lokalitet for trekkfugler om våren er det imidlertid betydelig mindre å se ved Fossum og Bogstadvannet. Dette skyldes kanskje at Sørkedalen, som ender opp i et stort sammenhengende skogområde er en lite attraktiv trekkroute. Mange av de fugler som trekker nordover langs med Oslofjorden fortsetter isteden trolig mer mot nordost innover Romerike.



De 50 hyppigst observerte fuglene i hele observasjonsperioden . Skalaen angir hvor mange % av det totale antallet observasjonsdager som hver art er registrert.



Antallet arter registrert per observasjonsdag i 2001.