

Fugler i Fossum-området 2005



Torsten Källqvist
2006

INNHold

BAKGRUNN	5
OBSERVASJONER.....	9
Storlom	9
Storskarv	9
Gråhegre	10
Stokkand	10
Krikkand	11
Brunnakke	11
Toppand	12
Bergand	12
Kvinand	12
Svartand	13
Laksand	13
Gravand	14
Grågås.....	14
Canadagås.....	15
Knoppsvane	15
Sangsvane	16
Musvåk	16
Fjellvåk.....	17
Spurvehauk.....	17
Hønehauk	18
Fiskeørn	18
Vandrefalk	18
Dvergfalk	19
Tårnfalk	19
Orrfugl	19
Vaktel	19
Vipe	20
Tjeld.....	20
Strandlo	21
Dverglo	21
Enkeltbekkaksin	21
Rugde.....	22
Storspove	22
Småspove.....	22
Grønnstilk	22
Skogsnipe	23
Strandsnipe	24
Gluttsnipe	24
Rødstilk	25
Brushane	25
Sildemåke	25

Gråmåke	26
Fiskemåke.....	27
Hettemåke.....	27
Makrellterne	28
Lomvi	29
Alkekonge	29
Ringdue	29
Skogdue	30
Tyrkerdue	30
Gjøk	30
Kattugle	31
Tårnseiler	31
Grønnspekk	32
Flaggspekk	33
Dvergspett	33
Tretåspett	34
Svartspett	34
Sanglerke	35
Låvesvale.....	36
Taksvale.....	36
Sandsvale.....	37
Ravn.....	38
Svartkråke.....	38
Kråke	39
Kaie	39
Skjære.....	40
Nøttekråke	41
Nøtteskrike	41
Kjøttmeis	42
Blåmeis	43
Svartmeis	43
Toppmeis	44
Granmeis	45
Stjertmeis	45
Spettmeis	46
Trekryper	47
Fossefall.....	47
Gjerdesmett	48
Gråtrost.....	48
Måltrost	49
Rødvingetrost	49
Svarttrost	50
Ringtrost	51
Steinskvett	51

Buskskvett	52
Rødstrupe.....	52
Myrsanger.....	53
Gulsanger.....	53
Munk	54
Hagesanger	54
Tornsanger.....	55
Møller	55
Løvsanger	56
Gransanger.....	56
Bøksanger.....	57
Fuglekonge	57
Grå fluesnapper	57
Svarthvit fluesnapper.....	58
Jernspurv	58
Heipiplerke	59
Trepiplerke	60
Linerle	60
Vintererle.....	61
Gulerle	62
Sidensvans	62
Tornskate.....	63
Varsler	63
Stær.....	64
Grønnfink	64
Stillits.....	65
Grønnsisik	66
Tornirisk	66
Gråsisik.....	67
Dompap	67
Rosenfink.....	68
Grankorsnebb	68
Bokfink.....	69
Bjørkefink.....	70
Gulspurv	70
Sivspurv.....	71
Gråspurv	72
Pilfink.....	72
KOMMENTARER.....	73

BAKGRUNN

I 2005 ble det gjennomført systematiske registreringer av fugler i forbindelse med daglige turer i nærområdet til Fossum. Opplegget var det samme som ved tilsvarende registreringer i 2000-2001 og som er beskrevet i en tidligere rapport. Turene som i stort sett ble foretatt alle dager, med unntak for noen korte avbrekk i forbindelse med reiser omfatter en kort lufterunde med hund alle hverdager ca. 07:30 fra Ankerveien 220 ned til Lysakerelva, oppover langs elva til Fossumveien og deretter tilbake til Ankerveien. På ettermiddagen, mellom kl 16 og 19 gikk jeg en lengre tur på 1-1½ time, som regel nordover langs med Lysakerelva og den vestre stranden av Bogstadvannet til badeplassen ved Kråkebråten. Utenom golfsesongen gjorde jeg ofte en sving inn på Bogstad golfbane. Dersom det var dagslys gikk turen videre mot vest opp mot Fløtmyra (også kalt Kråkedammen), så opp over Lathusåsen og ned mot Fossumbanen og jordene på begge sider av Ankerveien. I helgene ble det som regel en lengre tur på morgenen også med Bogstadvannet og Lathusåsen som mål. I tillegg ble det gjort tilfeldige observasjoner fra hagen eller i forbindelse med ferdsel i området. Alle arter som ble observert innenfor et område fra Bogstadvannet og Lysakerelva i øst (inkludert den vestre delen av Bogstad golfbane ved utløpet av vannet), Grini-veien i sør, Listuveien og Østernbekken i vest, og Østernsjøvann i nord ble notert.

I alt er det foretatt observasjoner 208 dager i 2005. I den lysere delen av året ble det som regel 5-7 observasjonsdager per uke, men i periodene januar-februar og november-desember ble det stort sett bare gjort observasjoner i helgene.

For å få et inntrykk av forekomsten av ulike arter gjennom året er andelen av observasjonsdager hver uke som ulike arter ble observert beregnet. Dersom en art er observert alle observasjonsdager i en uke får den frekvensen "1", mens frekvensen blir 0.2 dersom en art er observert én av fem observasjonsdager i løpet av en uke. Observasjonsfrekvensen av hver art er fremstilt som søylediagrammer som gir et inntrykk av forekomsten hver uke gjennom året.

På de følgende sidene vises noen bilder fra området.



Utsikt fra Grini gård mot nord mot Fossumjordet. Haugen sees like til venstre for midten og Fossum boligfelt lengst til høyere.



Satelittbilde over området. Bildet er trolig fra 2003 (Fra Google Earth)



Fløtmyra, også kalt Kråkedammen. Her hekket skogsnipe, enkeltbekkasin og krikvand.



Den innerste bukten av Bogstadvannet mot vest, hvor bekken fra Abbortjern renner inn. Dette var tilhold for grønnstilk, strandsnipe, dverglo og krikvand



Utsikt mot fjorden fra den sørvestlige delen av Lathusåsen




Blandet gran-og fureskog på nordhellingen av Lathusåsen.

OBSERVASJONER

Storlom

Storlom ble bare observert én gang i 2005. Den ble sett i Bogstadvannet 13.08.


Storskarv



Storskarv i Bogstadvannet 07.08. 2005

Noen storskarver har oppholdt seg i Bogstadvannet på sommeren de siste årene. I 2005 ble den første observert 18.06. Deretter hadde den fast opphold i Bogstadvannet og ble sett nesten hver observasjonsdag frem til 26.11. Som regel satt 2-3 skarver på stolpene som står igjen fra tømmerfløtingstiden ute i vannet, og i blant svømte de i vannet og dykket etter fisk. Som mest ble det sett seks storskarver i Bogstadvannet. Noen ganger fløy de innover marka mot vest, hvor de kanskje gikk ned i Triungsvannet. En storskarv ble sett i Østernvannet 26.11.


Gråhegre



Gråhegre ved Fløtmyra

Gråhegre ble først sett ved Fløtmyra 28.04. Det ble gjort forholdsvis hyppige observasjoner ved Fløtmyra eller i Bogstadvannet fra midten av juni til oktober. Som mest ble det sett 3 st. (06.07 og 13.08). Siste observasjon i Bogstadvannet var 19.11, like før isleggingen i begynnelsen av desember.

Stokkand






Stokkand i Bogstadvannet 19.06.2005

Stokkender holder til i Lysakerelva på vinteren, mest nede ved Griniveien, men noen ganger kommer de opp til Fossum og ligger i elva mellom fossene. Stokkanden hekker med flere par i Bogstadvannet og i Østernvann. Den ble sett nesten daglig fra mars til julig og hyppig utover høsten i Bogstadvannet til islegging.

Krikkand




Krikkand i Bogstadvannet, april 2005

Krikker raster ofte i Bogstadvannet på våren. Første observasjonen var 07.04, da 10 krikker lå i råken ved utløpet av Sørkedalselva. Noen par ble igjen over sommeren og ble ofte sett i den nordvestre delen av Bogstadvannet (f.eks. ett par 13.05, 3 hanner 18.05 og 2 hanner 19.06). Ett par ble observert i Fløtmyra 30.04 og senere ble det sett en hunn med unger der (7 unger 09.06 og 13 unger neste dag). 07.07 ble det sett en gruppe på 13, trolig ungfugler, i Bogstadvannet. Siste observasjon var 09.09.

Brunnakke

Brunnakke ble sett i Bogstadvannet ved én anledning (08.04).

Toppand




Toppand (Hemsedal juni 2005)

Toppand ble sett i Bogstadvannet hver uke i april og første uke i mai. Deretter ble det bare gjort to observasjoner (09.07 og 19.09).

Bergand

08.08 ble det observert tre hunner av Bergand i Bogstadvannet utenfor Kråkebråten.

Kvinand






Kvinand i Lysakerelva 28.03.2005

Utålmodige kvinender ventet i Lysakerelva fra 28.03 før isen var gått i Bogstadvannet. Deretter ble det sett kvinand i Bogstadvannet eller Lysakerelva de fleste dager frem til islegging i slutten av november. Det var flere kuller av kvinand i Bogstadvannet. De hekket også i en kasse på østsiden av Lysakerelva mellom fossene etter at kattugglen hade flyttet ut!

Svartand

10 hunner eller ungfugler og én svart hann av svartand lå i en tett samlet flokk midt ute på Bogstadvannet 17.10.2005.

Laksand



Laksand i Bogstadvannet 14.05.2005

Laksand ble først sett i Lysakerelva 27.03. Deretter ble laksender observert hver uke frem til midten av mai. En hunn med seks unger ble sett i Bogstadvannet fra 17.07. Siste observasjonen var 18.09.


Gravand



Gravand ved Fossum 21.05.2005

En gravand vandret rundt på et oversvømmet jorde ved Fossum 21.05. Dagen etter fløy en gravand over Fossum mot sør fra Bogstadvannet.


Grågås



Grågås i Bogstadvannet 11.07.2005

Første observasjonen av grågås var 02.04. Ett par ble sett i Bogstadvannet flere ganger i juli-august. Siste uken i september lå det store flokker av grågås i Bogstadvannet. Største antallet var 130 (29.09).


Canadagås



Canadagås (Falsterbo okt. 2005)

Canadagås ble sett i Bogstadvannet hver uke i april. Det var da bare ett par eller små flokker. Fra 13.08 til 07.09 ble det sett større flokker, som mest 50 st. 14.08. Siste observasjonen (6 st. i Bogstadvannet) ble gjort 26.11, like før islegging.

Knoppsvane





Knoppsvane i Bogstadvannet 11.06.2005

Knoppsvaner ble sett i Bogstadvannet i tre perioder; april (1 par), juni (2 par) og november (1-2 par). En ungfugl ble sett 27.10.

Sangsvane



Sangsvane (Reykjavik 2003)

Sangsvane ble bare sett to ganger i løpet av året. Det var 07.04 når tre st. lå i råken ved utløpet av Sørkedalselva og 22.05 (ett eksemplar i Bogstadvannet).

Musvåk

Musvåk og fjellvåk pleier man å kunne se på trekk i april langs med åskanten i nordvest. I 2005 så jeg imidlertid ingen våker på våren, kanskje fordi værforholdene ikke var gunstige de dager jeg hadde anledning å gjøre observasjoner. I stedet fikk jeg se en musvåk 13.08. Den kom seilende fra Lathusåsen mot øst.


Fjellvåk



En fjellvåk fløy lavt over huset på Fossum på ettermiddagen 16.09.

Fjellvåk (Falsterbo oktober 2005)


Spurvehauk



Spurvehauk ble observert all måneder med unntak for i januar. De hyppigste observasjonene var i august-september da den ble sett hver uke.


Spurvehauk på Fossum 03.09.2005

Hønehauk



Hønehauken hekket ikke vest for Bogstadvannet som den gjorde i 2000-2001. Den ble derfor ikke observert like ofte i 2005. Fra juni til desember ble hønehauk sett seks ganger i området. Én av observasjonene var 07.08. Fra badeplassen ved Kråkrbråtan ble jeg oppmerksom på at en fisketerne mobbet noe i et tre ved utløpet av Sørkedalselva. I teleskopet kunne jeg se at det var en ung hønehauk. Etter en stund ble den lei av mobbingen og fløy lengre inn i skogen.

Fiskeørn



Fiskeørn ble sett tre ganger i april-mai (19.04, 01.05 og 22.05). Alle observasjonene var ved Bogstadvannet.

Vandrefalk



En vandrefalk fløy mot nord langs med østsiden av Lathusåsen 04.05. Jeg fikk tatt noen bilder på langt hold.

Vandrefalk over Lathusåsen 04.05.2005

Dvergfalk

Dvergfalk ser man ofte på trekk i april, når den i lav høyde flyr langs med kanten av jordene på jakt etter småfugl. Dette skjedde 09.04. Dette året ble det også sett dvergfalk ved to anledninger i mai. 15.05 fløy en hunn over Bogstad golfbane og 28.05 så jeg en over Fossumjordet.

Tårnfalk



Tårnfalk vest for Bogstadvannet 22.05.2005

En hunn ble sett to ganger i mai (05.05 og 22.05) ved et hogstfelt mellom Fløtmyra og Abborrbekken. Jeg fikk tatt et bilde i dårlig lys. 21.07 fløy to tårnfalker mot sør over Strømstad. En hann ble mobbet av en spurvehauk over Fossumjordet ved Haugen 07.09.


Orrfugl

Orrfugl er vanlig rundt Triungsvannet og Hvitstenvannene lengre mot nord, men av og til kan man se orrfugl i nærheten av Østernvann. Jeg har t.o.m. hørt en spillende orrhane på Lathusåsen en gang i 80-årene. I 2005 så jeg orrfugl én gang. En hunn ble skremt opp i skråningen sørvest for Kråka 29.10.

Vaktel

21.06 ble jeg vekket av en vaktel klokken to på natten. Etter det hørte jeg den flere ganger på den øverste delen av Fossumjordet mot Ankerveien frem til 03.07. Senere hørte jeg vaktelen på samme jorde men nærmere Griniveien på morgenen 23.07.

Vipe



Vipe over Fossumjordet 26.06.2005

Den første vipe ble sett 28.03. Deretter ble vipe observert hver uke frem til 01.08. Vipen pleier å hekke noe lengre mot sørvest på jordene rundt Dæli, men ibland også på Fossumjordene. I 2005 var det hekking ved Haugen. Vipen liker seg ikke når gresset blir høyt og den flyttet seg i juli med én unge over Ankerveien til jordet ved sagen, hvor det var noen områder med dårlig vekst pga. oversvømmelse på forsommeren. Ungen vokste opp og ble sett siste gang 01.08.

Tjeld




Tjeld på Bogstad golfbane 26.04. 2005

En tjeld ble observert på Bogstad golfbane nær utløpet av Bogstadvannet 26.04.

Strandlo

Seks strandlo ble registrert på jordene ved Fossum 21.05, da mye nedbør hadde ført til dannelse av grunne dammer på jordene.


Dverglo



Dverglo nordvest i Bogstadvannet 06.06. 2005


Første observasjonen av dverglo var 22.04 i den innerste bukten nordvest i Bogstadvannet. Her ble det sett et eller to eksemplarer flere ganger frem til 09.07. Det kunne se ut som det var hekking på gang, men i slutten av mai og begynnelsen av juni var det meget høy vannstand i Bogstadvannet som følge av mye nedbør og vannkanten gikk langt opp i vegetasjonen slik at forholdene var lite egnet for dvergloen. Andre observasjoner av dverglo ble gjort på jorden ved Lathus (30.04 og 15.06) samt på tømmerlageret ved sagen (20.05).

Enkeltebekkaksin



Første observasjonen av enkeltbekkasin var 19.04 ved Fløtmyra. Deretter ble enkeltbekkasin sett och hørt spillende flere ganger ved Fløtmyra og rundt Kråka ved Bogstadvannet frem til midten av juni. En høstflyttende bekkasin ble skremt opp på jorden ved sagen 08.10.

Rugde



Rugden markerte som vanligt sitt revir ved spillflukt på mellom Fossumbanen og Lathus på kvel-den. Dette ble registrert fra 14.05 til 18.06.


Storspove

Storspoven ser och hör man som regel på trekk over området i april. I 2005 ble det bare gjort én observasjon 17.04.

Småspove

Småspove ble sett ved to anledninger. En flokk på seks gikk ned på et nyharvet jorde ved Fossum 08.05. Senere ble 10 st. sett ved utløpet av Sørkedalselva 16.05.

Grønnstilk






Grønnstilk nordvest i Bogstadvannet 11.05. 2005

En grønnstilk fluktspilte i den nordvestre grunne bukten av Bogstadvannet 18.05. I de følgende to ukene oppholdt det seg to grønnstilker samme sted. Etter dette steg vannstanden som følge av mye nedbør i slutten av mai-juni slik mudderstranden ble oversvømmet og grønnstilkene forsvant. Spillende grønnstilk ble også hørt fra andre siden Bogstadvannet, ved utløpet av Sørkedalselva, bl.a. 03.07. Senere ble grønnstilk igjen sett nordvest i Bogstadvannet (3 st. 17.07) og på tømmerlageret ved Fossum sag 29.07 – 01.08.


Skogsnipe



Skogsnipe ved Fløtmyra, juni 2005

Den første skogsnipen ble sett 18.04. I april-juni ble skogsnipen regelmessig registrert ved Fløtmyra og i området rundt Kråka ved Bogstadvannet. Siste observasjon var 07.08, da tre skogsniper ble sett i strandkanten av Bogstadvannet ved Kråkebråten.


Strandsnipe



Strandsnipe ved Østernvann 03.07. 2005

Strandsnipe ble sett første gangen 29.04. Den hekket flere steder i området (Bogstadvannet, Fløtmyra, Østernvann og ved Lysakerelva) og ble sett nesten daglig i juni og juli. De begynte å trekke ut i august og siste observasjon var 23.08.

Gluttsnipe



Gluttsnipen passerer området i trekkperiodene på våren og sommeren. I 2005 ble den sett første gangen 30.04. Største antallet ble sett 03.07, da en flokk på syv rastet ved utløpet av Sørkedalselva.

Rødstilk



Rødstilk, Hemsedal 20.06. 2005

En rødstilk oppholdt seg på jorden ved Fossum sag 20 og 21.05.


Brushane



Brushane, Bogstadvannet 03.07. 2005

En brushane ble observert ved utløpet av Sørkedalselva i Bogstadvannet 03.07. Jeg så den fra badeplassen ved Kråkebråten. Dersom det ikke hadde vært en hann i full sommerdrakt hadde jeg nok ikke kunnet bestemme den på så lang avstand. Jeg fikk tatt et bilde gjennom teleskopet som dokumentasjon.

Sildemåke






Sildemåke, Bogstadvannet 10.04. 2005

Sildemåke ble sett fra 04.04. Noen sildemåker holder til i Bogstadvannet hele sommeren, og de ble registrert nesten hver observasjonsdag i april-august. Siste observasjon var 07.09.


Gråmåke



Gråmåke i Bogstadvannet, juli 2005

Gråmåke ble sett alle måneder, og nesten daglig når Bogstadvannet var fritt for is. En liten flokk kommer ofte opp for å bade i vannet hver dag. De står gjerne på mudderbankene ved utløpet av Sørkedalselva når vannstanden ikke er for høy. På vinteren patrullerer enkelte gråmåker over området.


Fiskemåke



Fiskemåke ved Bogstadvannet 11.06. 2005

Fiskemåke ble først sett 02.04. Den hekket i Bogstadvannet, bl.a. ved sagen og ble observert nesten daglig til i begynnelsen av september. Siste observasjon var 21.09.

Hettemåke






Hettetmåker og fisketmåker ved Bogstadvannet 11.07.2005

Første observasjon av Hettetmåke var 08.04. 2005. På våren er den ofte å se sammen med andre måker på jordene rundt Fossum, og på sommeren holder den til i Bogstadvannet. Fra midten av juli til midten av august ble det ikke sett hettetmåke dette året. Siste observasjon var 02.11.


Makrellterne



Makrellterne ved Bogstadvannet 2004

Første observasjonen av makrellterne var 09.05. Deretter ble ett par sett ved Bogstadvannet sporadisk frem til i begynnelsen av august. Siste observasjon (en voksen + en ungfugl) ble gjort 07.08.

Lomvi




Lomvi i Bogstadvannet 3.10. 2005

Lomvi ble sett i Bogstadvannet flere ganger i en kort periode mellom 23.09 – 05.10. Bortsett fra 26.09, da det var to fugler var det en enslig lomvi som oppholdt seg ulike steder i vannet og ibland tok en flytur over vannet.

Alkekonge

Alkekonge ble sett ved én anledning. Det var 24.10 som en ensom fugl padlet rundt på en speilblank vannoverflate i kveldssolen.

Ringdue






Ringduer ved Fossum 21.09.2005

Ringdue har jeg ikke sett på vinteren i det aktuelle området, men i 2005 ble en ringdue hørt i skogen på Lathusåsen 06.03. Det var trolig en overvintrer, for storinrykket av ringdue kom først tre uker senere. Fra de siste dagene av mars til og med september ble ringdue sett daglig. I april-mai og i september ser man den i store flokker på jordene og på sommeren er den en vanlig hekkefugl i området. Fra begynnelsen av oktober så jeg stort sett bare enkelte fugler og siste observasjonen var 16.10.

Skogdue



Det er lett å overse skogduene i mengdene av ringduer og byduer som oppholder seg samtidig i området, men skogsdue ble sett på jordene ved Fossum ved flere anledninger mellom 30.03 og 30.05. Som regel var det ett par som holdt sammen.


Tyrkerdue

Et par tyrkerduer ble sett ved Listua 28.05. Også tidligere har jeg sett tyrkerduer her noen få ganger, men ikke andre steder innenfor området.

Gjøk

En ropende gjøk ble hørt på Fossum på kvelden 15.06. 13.08 fløy en gjøk lavt over jordet ved sagen og satte seg i et tre ved veien.


Kattuggle



Kattugglen ble hørt syngende 20.01 ved Lysakerelva i kanten av Bogstad golfbane. Selv om jeg ikke hørde den mer enn én gang hekket den der i en nyoppsatt kasse i en gran på østsiden av elven. Dette viste seg i midten av april, da to unger og en voksen holdt til i en gruppe høye grantrær nær kassen. I midten-slutten av mai ble kattugglen hørt et par ganger ved Lathus. Det var trolig den samme familien som beveget seg rundt i området. Kattuggle ble også observert på Fossum i august og oktober. I desember (19.12) ble syngende kattuggle hørt igjen, også denne gangen i kanten av golfbanen ved utløpet fra Bogstadvannet. Dette kan tyde på at ny hekking blir planlagt


Kattuggle ved Fossum (Lysakerelva) 17.04. 2005

Tårnseiler



Den første tårnseileren ble sett 16.05. Fra slutten av mai til begynnelsen av august ble tårnseilere sett nesten daglig. De hekker bl.a. i den gamle bebyggelsen ved Ankerveien og jakter over Fossum på sommerkveldene. En ensom tårnseiler fløy mot sør over Bogstadvannet 06.09. Ellers forlot de området siste uken i august.


Grønnspekk



Grønnspekk, Bogstad golfbane 26.03.2005

Grønnspekk forekommer i området hele året, men er ikke alltid like fremtredende. Bl.a. manglet det i 2005 observasjoner i noen uker i februar-mars og hele juni måned. De hyppigste observasjonene var i slutten av mars-mai når den hevdet revir på begge sider av elven ved utløpet fra Bogstadvannet. Utover høsten ble det gjort spredte observasjoner av grønnspekk forskjellige steder i området, også i skogen på Lathusåsen.

Flaggspett




Flaggspett på Fossum 28.03. 2005

Flaggspetten er den vanligste hakkespetten i området og i 2005 ble den sett gjennom hele året. Observasjonsfrekvensen var imidlertid høyere i første halvdel av året enn utover høsten og vinteren. Flaggspetten forekommer både på Fossum, langs Lysakerelva, ved Listua og i barskogen på Lathusåsen.

Dvergspett

Dvergspett ble bare sett to ganger i området i 2005. Første gang var 04.05, da en hann slo til og ropte noen ganger i en Bjørk ved Ankerveien på Fossum. Ti dager senere hørte jeg en dvergspett i skogen vest for Bogstadvannet ved munningen av Abborbekken. Dette ser ut til å være en egnet biotop for dvergspett, men jeg så eller hørte den ikke senere på sommeren.


Tretåspett



Tretåspett, Lathusåsen 14.08. 2005

Tretåspetten er ikke vanlig i området, men fra høsten 2004 er den blitt observert på Lathusåsen ved flere anledninger, noe som tyder på at den har hatt fast tilhold her en tid. I 2005 ble tretåspett sett fire ganger (07.04, 14.05, 23.07 og 14.08). Observasjonen 23.07 var av en hann, mens de øvrige var av en hunn.

Svartspett







Svartspett på Lathusåsen 24.03. 2005

Spredte observasjoner av svartspett ble gjort gjennom hele året 2005, som regel på, eller nord for Lathusåsen. De hyppigste observasjonene var i august/september, sannsynligvis fordi noen ungfugler da dro rundt i området.

Sanglerke




Sanglerke ved Fossum 01.05. 2005

Den første sanglerken ble sett på Fossum 20.03. Deretter ble den observert hver uke frem til slutten av juli. Flere larker sang i området; én på jordet nord for Ankerveien og flere (ca. 7) på jordet mellom Haugen og Griniveien.

Det ble ikke observert sanglerker i august men høsttrekkende larker rastet på jordene i september-oktober. Siste observasjonen var 17.10, da ca. 10 larker ble sett på jordet ved sagen.

Låvesvale




Låvesvalen ble først sett 30.04 over Bogstadvannet. Fra begynnelsen av mai til slutten av august ble låvesvaler sett hver observasjonsdag. Den oppholder seg særlig rundt Bogstadvannet og ved sagen. På sommeren jakter mange låvesvaler over kornåkrene ved Fossum. I august ser man mange svaler som jakter på insekter over tømmerlageret.

Siste observasjonen av låvesvale i 2005 var 02.10 ved Bogstadvannet.

Låvesvale ved Bogstadvannet 28.05. 2005

Taksvale






Taksvale på Fossum sag 2001

Første observasjonen av taksvale var 01.05. Deretter ble taksvalen sett de fleste dager frem til slutten av august. Siste observasjon var 04.09.

Taksvalen hekker på sagen og jakter sammen med låvesvale over jordene, sagen og Bogstadvannet hele sommeren. I mai ser man også ofte taksvalen over skogen vest for Bogstadvannet.


Sandsvale



Sandsvale over Bogstadvannet 24.06. 2005

Sandsvale ble sett første gangen 07.05 og sist 26.08. Den ble observert ganske regelmessig i juni og juli – alle ganger over eller nær Bogstadvannet. Som regel var det enkelte eller noen få individer sammen med andre svaler.

Ravn



Ravn ved Kråka 15.09. 2005

Det ble gjort spredte observasjoner av ravn i området gjennom året. Observasjonene på våren var fugler som fløy over skogen vest for Bogstadvannet. I september ble ravn sett forholdsvis ofte i nærheten av barkfyllingen innenfor badeplassen ved Kråka. Dette hang sammen med at et rådyr hadde dødt her. I månedskiftet november-desember ble ravnen sett ett par ganger ved sagens tømmerlager, hvor det av og til blir lagt ut slaktavfall som åte for revejakt


Svartkråke



Svartkråke på isen, Bogstadvann 02.04. 2005

En svartkråke ble sett sammen med andre kråker på isen av Bogstadvannet 02.04. Jeg fikk tatt et bilde på lang avstand.


Kråke



Kråke på Fossum 2004

Kråke ble observert nesten daglig gjennom hele året. Noen par hekker i området rundt Fossum. Utenom hekkeperioden ser man små flokker i kulturlandskapet. Tømmerlageret og sagen er også populært tilholdssted.

Kaie






Kaie på jordet ved sagen, Fossum, april 2005

Kaie ble sett forholdsvis regelmessig på våren og forsommeren 2005. Et eller flere par holdt til rundt Fossum og gikk ofte på jordet ved sagen. I en periode på sommeren (juli-august) ble det ikke gjort noen observasjoner, men i september-oktober ble kaier igjen sett hver uke. Deretter ble det gjort spredte observasjoner utover i november-desember.


Skjære



Ung skjære ved Kråkebråten 14.08. 2005

Skjære er en av de fugler man ser mest regelmessig i området. Den har fast tilhold rundt bebyggelsen ved Fossum hele året og den hekker flere steder i kulturlandskapet.


Nøttekråke



Nøttekråke på Lathusåsen 19.03. 2005

Nøttekråken holder til på Lathusåsen hele året men er ikke alltid like synlig. De hyppigste observasjonene var i april-september, som regel på Lathusåsen, men i september ble den også sett flygende over Fossum i forbindelse med innhøsting av nøtter.

Nøtteskrike






Nøtteskrike på Lathusåsen 16.10. 2005

Nøtteskriken ble observert gjennom hele året, som regel på Lathusåsen, men ofte også nærmere Bogstadvannet ved Strømstad og Kråkebråten.


Kjøttmeis



Kjøttmeis på Lathusåsen 19.03. 2005

Kjøttmeis er en av de aller hyppigst observerte fuglene i området. Det skyldes at den oppholder seg rundt bebyggelsen på Fossum og benytter fôringsplassen i hagen. Den er vanlig hekkefugl, ikke bare nær bebyggelse men også i skogen på Lathusåsen.


Blåmeis



Blåmeis ved Lysakerelva 02.04. 2005

Blåmeis ble observert gjennom hele året. Den oppsøker fôringsplassen i hagen, og er vanlig hekkefugl i hele området, særlig i kulturlandskapets randområder.

Svartmeis






Svartmeis på Lathusåsen 18.12. 2005

Svartmeisen ble sett gjennom hele året, men bare sporadisk på sommeren. Den har fast tilhold på Lathusåsen, men ble også sett i en liten granklynge vest for Lysakerelva ved Fossum og noen ganger på fôringsplassen i hagen i Ankerveien. Man legger mest merke til svartmeisen på våren når den synger, men i 2005 ble den sett regelmessig ved en fôringsplass på Lathusåsen på vinteren.


Toppmeis



Toppmeis på Lathusåsen 18.12. 2005

Toppmeis ble sett på Lathusåsen gjennom hele året. Den høyere hyppigheten i observasjonene på vinteren skyldes at jeg hadde etablert en fôringsplass i skogen, hvor den alltid var til stede.


Granmeis



Granmeis på Lathusåsen 17.12. 2005

Granmeisen holder til i barskogen på Lathusåsen hele året. På vinteren oppsøkte den fôringsplassen i skogen. Ellers var den mest synlig på våren da den sang, og i august-september da ungfuglene dro rundt i området, også i utkanten av skogen.

Stjertmeis






Stjertmeiser S.Ø. Østensjøvann 19.06. 2005

På våren ble ett par stjertmeiser sett to ganger (19.04 og 05.05) sør for Fløtmyra. Det ble tydeligvis hekking her for senere ble en familie med minst seks unger sett i samme område flere ganger. Siste observasjonen var 09.10 da en flokk på åtte stjertmeiser ble sett ved utløpet av Bogstadvannet.


Spettmeis



Spettmeis, Fossum 18.09. 2005



Spettmeis ble observert gjennom hele året og forekom flere steder i området. Den hekker hvert år i et litet holt med osper på Bogstad golfbane, i Løvenskiolds hage innerst i Ankerveien og på Listua, men holder også til på Lathusåsen. Spettmeisen oppsøkte også fôringsplassene i hagen og på Lathusåsen.

Trekryper



Trekrypene ble observert sporadisk i området gjennom hele året. Som regel ble den sett på Lathusåsen, hvor den følger med flokker av meiser på næringssøk i trærne. Enkelte ganger ble den også sett i skogen langs Lysakerelva og én gang (19.12) på veggen (!) på huset i Ankerveien.


Fossefall



Fossefall i Lysakerelva 05.05. 2005


Fossekallen ble sett i Lysakerelva mellom fossene ved utløpet og ved Ankerveien hver uke fra januar-mars. Deretter ble den observert litt mindre frekvent frem til i november. Dette skyldes at den ikke hekket i den øvre delen av Lysakerelva i 2005.

Gjerdsmett



Gjerdsmetten holder til i området hele året og noen overvintrer ved Lysakerelva. Man legger imidlertid mest merke til den når den synger, og det gjør den fra slutten av mars og helt til i august. Det er store variasjoner i bestanden av gjerdsmett fra år til år. Den var forholdsvis vanlig sommeren 2005 og ble hørt på flere hogstfelt på Lathusåsen samt ved Lysakerelva. Siste observasjonen ble gjort 11.12 i veikanten ved Lysakerelva.


Gråtrost



Gråtrost på Fossum 10.04. 2005

Gråtrosten er sjelden å se i området på vinteren, men i januar-februar 2005 ble den sett flere ganger. I slutten av mars kom flyttende gråtroster og deretter ble den sett daglig t.o.m. juli. Gråtrosten er en meget vanlig hekkefugl i løvskogen langs med Lysakerelva og i randsonen til dyrket mark. I august var gråtrosten litt mindre synlig, kanskje fordi den trakk innover i skogen for å spise blåbær, men på høsttrekket dro den forbi i store flokker og spiste av rognebær.


Måltrost



Måltrost ved Strømstad 10.07. 2005

Den første måltrosten ble sett 03.04. Fra begynnelsen av april t.o.m. juni ble måltrost sett eller hørt syngende stort sett hver dag. Den hekker i barskogen på Lathusåsen. Utover juli ble måltrosten mindre synlig. Den er ganske sky og tilbaketrukket, men ble sett i flokker sammen med rødvingetrost og gråtrost i september. Siste observasjon var 02.10.

Rødvingetrost






Rødvingetrost, Lathusåsen 10.07. 2005

Den første rødvingetrosten ble sett 02.04. Rødvingetrosten er en meget vanlig hekkefugl i området, både på Lathusåsen, i løvskogsområder langs med vassdragene og i kantsonene til dyrket mark. Den ble sett daglig i april-juni. I august sank observasjonsfrekvensen noe (se også gråtrost) men på høsttrekket ble den sett i flokker sammen med gråtrost og måltrost.

Svarttrost



Svarttrost ved Fløtmyra 17.06. 2005

Svarttrosten ble observert i 51 av årets uker. På vinteren holder noen individer til i hagene på Fossum og den hekker i alle skogbevokste områder.


Ringtrost



Ringtrost på Bogstad golfbane 22.04. 2005

En ringtrost ble sett på Bogstad golfbane 22.04.

Steinskvett



Steinskvett ved tømmerlageret, Fossum 17.05. 2005

Steinskvett ble sett ved flere anledninger i en kort periode i mai. Første observasjonen var 07.05. Som mest ble det sett fire fugler på sagens tømmerlager og syv på jorden sør for sagen 17.05. På høsten ble en steinskvett observert på tømmerlageret 09.09.


Buskskvett



Buskskvett ved Fossum 17.05. 2005

Buskskvett ble bare sett to ganger i løpet av våren på jordene ved Fossum. Første gang var 15.05. Senere ble en buskskvett observert i havreåkeren sør for sagan 16.08. I motsetning til for noen år siden hekket ikke busksvetten ved Gryta (ved utløpet av Bogstadvann) eller andre steder i området i 2005.

Rødstrupe



Rødstrupe på Lathusåsen 29.07. 2005

Rødstrupa ble først sett 27.03. Fra begynnelsen av april til begynnelsen av juli ble den sett og/eller hørt stort sett hver dag. Rødstrupa er en vanlig hekkefugl, både langs med vassdragene og i skogen på Lathusåsen. Utover august-september kneppet ungfugler i tette buskkratt på hogstfeltene men utover i oktober ble registreringene mer sporadiske. Siste observasjonen var 11.10. I 2004 sang (!) en rødstjert på Fossum en mildværsdag i desember (16.12). Ellers har jeg ikke sett overvintrende rødstrupe i området.



Myrsanger



Myrsanger ved Gryta, Fossum 02.07. 2005

En myrsanger sang en kort periode fra 26.06 til 06.07 i et bringebærkratt ved Gryta (ved utløpet av Bogstadvannet). Den har holdt til samme sted i flere år, men ble ikke sett i 2004. Jeg vet ikke om den har hekket her, men den korte tiden som den ble observert i 2005 tyder ikke på hekking dette året.


Gulsanger



Gulsanger ved Strømstad 26.06. 2005


Den første gulsangeren ble hørt ved Lysakerelva nede ved Griniveien 15.05. Frem til i begynnelsen av juli ble flere syngende fugler observert langs med Lysakerelva og Østernbekken. 26.06 sang en gulsanger mellom Strømstad og Lathusåsen.

Munk




Den første observasjonen av munk ble gjort 05.05. Munken er vanlig hekkefugl alle steder hvor det er løvvegetasjon; mellom Fossum og Listua, langs med vassdragene og på hogstfeltene på Lathusåsen. Den ble hørt de fleste observasjonsdager fra midten av mai til midten av juli. Etter at den sluttet å synge ble registreringene mer sporadiske, men varslende munker ble ofte hørt og sett på hogstfeltene i august og september. En etternøler ble sett i hagen på Fossum 19.11.

Hagesanger



Den første hagesangeren ble observert 11.05. Hagesangeren forekommer i samme terreng som munken men virker å være litt mindre vanlig. Den ble registrert de fleste observasjonsdager fra slutten av mai til midten av juli. Årets siste observasjon ble gjort 01.08.


Tornsanger



Tornsanger ved Gryta, Fossum 17.07. 2005


Den første tornsangeren ble observert 15.05. Tornsangeren hekker flere steder i området, f. eks. På strekningen Fossum- Haugen-Listua og sør for tømmerlageret ved sagen (Gryta). Det virket imidlertid som den var noe mindre vanlig i 2005 enn tidligere år. Den ble observert regelmessig fra midten av mai til midten av august. Siste observasjon var 13.08.

Møller



Møller ble observert første gang 15.05. Den ble senere hørt ganske regelmessig i mai-juni. De fleste observasjonene var i området rundt Kråka. Siste observasjon av møller var 17.07.


Løvsanger



Løvsanger på Lathusåsen 07.05.2005

Den første observasjonen av løvsanger ble gjort 28.04. Løvsangeren er en meget vanlig hekkefugl i hele området og ble sett daglig frem til begynnelsen av september. Siste observasjon var 02.10.

Gransanger



Syngende gransanger ble hørt første gangen 09.04. Deretter ble den hørt ganske regelmessig frem til i midten av juli. De fleste registreringene var i nærheten av Kråka hvor den trolig hekket.


Bøksanger



Bøksanger på Lathusåsen 10.07. 2005


Bøksanger ble observert første gangen 17.05. I begynnelsen av juli ble ett ivrig varslende par av bøkesangere med mat i nebbet observert noen ganger på Lathusåsen, rett ovenfor hoppbakkene på Fossumbanen, hvor det tydeligvis var hekking.

Fuglekonge




Fuglekongen holder til i skogen på Lathusåsen hele året, men i 2005 ble den ikke observert i januar og desember. Man legger lettest merke til den når den synger på våren, men høst og vinter ser man den ofte i selskap med meiser på næringsøk i skogen.

Grå fluesnapper



Første observasjon av grå fluesnapper var 16.05. Deretter ble den sett sporadisk frem til 27.08. De fleste observasjonene var langs med Lysakerelva, men den ble også sett på Lathusåsen.


Svarthvit fluesnapper



Den første svarthvite fluesnapperen for året ble sett 01.05. Den hekket ved bebyggelsen på Fossum, ved Haugen og i noen fuglekasser på Lathusåsen. Den siste ble sett 27.08.

Svarthvit fluesnapper, Fossum 20.05. 2005

Jernspurv







Jernspurv ved Gryta 04.09.2005

Jernspurv ble først sett 05.04. Den er ganske vanlig, særlig i områder med ung granskog. Jernspurven ble observert regelmessig i april-mai når den sang og litt mer sporadisk senere på sommeren. I september ble jernspurv sett ganske ofte, som regel på hogstfelt på Lathusåsen. Siste observasjon for året var 02.10.


Heipiplerke



Heipiplerke på Fossum 14.05. 2005

Heipiplerken hekker ikke i området, men ble observert i trekkperiodene vår og høst. Den første observasjonen ble gjort 09.04. I september rastet flokker av heipiplerke på jordene ved Fossum. Den siste ble sett 08.10.


Trepiplerke



Den første trepiplerken sang på Lathusåsen 30.04. I mai og juni ble syngende trepiplerker observert regelmessig flere steder på Lathusåsen, hvor det trolig hekket flere par. Deretter var den mindre synlig men enkelte observasjoner ble gjort i juli og august – den siste 07.08.

Trepiplerke på Lathusåsen 17.06. 2005

Linerle






Linerle ved Kråkebråten 17.05. 2005

Første observasjon av linerle i 2005 var 04.04. Fra begynnelsen av april til midten av september ble den sett i området alle observasjonsdager. Linerlen er en vanlig hekkefugl nær bebyggelse og langs strendene av innsjøer og vassdrag i området. I august-september samles mange linerler på tømmerlageret ved Bogstadvannet.

Vintererle



Vintererle i Lysakerelvat 2004

Vintererlen ble først sett ved Lysakerelva 25.03. Den hekker noen steder langs med elva og ble sett de fleste uker frem til midten av oktober. Siste observasjon var 06.11 da en enslig vintererle fløy mot nord over Bogstadvannet.

A photograph of a small bird, likely a Yellow Warbler, perched on a branch with green leaves. The bird has a bright yellow body and a black head and back. The background is a clear blue sky.


Gulerle ser man årlig i trekkperiodene vår og høst. I 2005 ble alle vårobservasjonene gjort i uke 20 og spesielt 20-21.05 da flokker av gulerler rastet på golfbanen og jordet ved Fossum sag. På høsten ble det bare gjort to observasjoner av gulerler som oppholdt seg sammen med linerler på sagens tømmerlager. Siste observasjon var 03.09.

Uke nr.	Antall publikasjoner
1	0,0
3	0,25
5	0,0
7	0,0
9	0,0
11	0,5
13	0,3
15	0,0
17	0,0
19	0,0
21	0,0
23	0,0
25	0,0
27	0,0
29	0,0
31	0,0
33	0,0
35	0,0
37	0,0
39	0,0
41	0,0
43	0,18
45	0,35
47	0,5
49	0,5
51	0,35
52	0,4



Sidensvans opptrer sporadisk i området på høsten og vinteren. Det var stor invasjon av sidensvans høsten 2004 og i 2005 ble små flokker på vei tilbake mot nord observert i mars. Sidensvansen var tilbake igjen i slutten av oktober og ble sett flere ganger i november-desember. De fleste observasjonene ble gjort på Fossum hvor de spiste epler og bær.

Tornskate



Tornskate på Lathusåsen 29.07. 2005

Den første tornskaten ble sett 21.05. Den hekket på noen hogstfelter på Lathusåsen (minst 3 par) og i juli-august ble ungfugler sett flere steder. Siste observasjon var 13.08.


Varsler



Varsler på Lathusåsen 02.04. 2005

I 2005 ble varsler observert to ganger i området. Første gangen var 02.04 på toppen av Lathusåsen. På høsten ble en varsler sett på tømmerlageret ved Fossum sag 02.10.


Stær



Stær ved redet på Bogstad golfbane 22.05. 2005

Den første stær ble sett 21.03. Flere par hekket på Bogstad golfbane, hvor det er mange gamle hakkespetthull i osper og i tillegg tett med fuglekasser. Også på vestsiden av Lysakerelva, i hagen til Løvenskiold hekket det stær. I mai patrullerte stærne jordene på Fossum etter mat til ungene. I slutten av juni forsvant stær fra området og deretter ble den bare sett et par ganger i oktober, den siste 24.10.

Grønnfink






Grønnfink, Fossum 10.04. 2005

Grønnfinken holder til i området hele året og ble sett alle uker i 2005. På vinteren oppsøker den fôringsplassen i hagen, og på sommeren er det en vanlig hekkefugl. Store flokker ble sett på jordene i august. Bl.a. ble en flokk estimert til ca. 200 individer sett i havreåkeren ved sagen 18.08.


Stillits



Stillits ved Fossum 25.06. 2005


Stillits hekker i området ved den øvre delen av Lysakerelva og den ble observert de fleste uker fra midten av mars til midten av september. I juli-september spiste små grupper av stillits frø av løvetann og tistel i veikantene i området rundt Fossum sag. Utover høsten ble det bare gjort spredte observasjoner, den siste 26.11, da 4 stillitser spiste kareborrefrø på stranden av Bogstadvannet.

Grønnsisik




Grønnsisik dykker av og til opp på fôringsplassen i hagen på vinteren. I 2005 ble en grønnsisik sett her 06.02. Innrykket av trekkende grønnsisik kom i begynnelsen av mars og deretter var den en vanlig fugl i området frem til slutten av august. Grønnsisik hekker helst i grantrær bl.a. på vestsiden av Lyskerelva ved Fossum og på Lathusåsen. I august ble den observert litt mindre regelmessig, men den ble mer synlig igjen i september. Siste observasjonen i 2005 var 27.11.

Tornirisk




Tornirisk hekket trolig ikke i området, men derimot litt lengre mot vest ved Nordby og Isi. Den ble bare observert sporadisk i begynnelsen av april, bl.a. en syngende hann ved Listua 01.04, og i juni-juli. Siste observasjon ble gjort 08.08.

Gråsisik



Det ble bare gjort noen spredte observasjoner av gråsisik under første halvåret 2005. Fra september dro noen mindre flokker gjennom området og i desember besøkte noen gråsisiker fôringsplassen i hagen ved et par anledninger.


Dompap



Dompap på Fossum 22.05. 2005

Dompapen oppholder seg i området hele året og oppsøker ofte fôringsplassene i hagen på Fossum og på Lathusåsen på vinteren. Den hekker på Lathusåsen. I 2005 hekket den ikke i granskogen vest for elva ved Fossum som den ofte har gjort tidligere, og den ble derfor ikke sett så ofte på sommeren. Høsten 2004 innvandret en østlig variant av dompap som istedet for den vanlige fløytelyden hadde noe som mest minnet om en elektronisk summetone. Disse fuglene ble tydeligvis igjen her for de ble hørt hele året 2005. Bl.a. hørte jeg ett par på Lathusåsen i juli, hvor den ene "snakket norsk", mens den andre var innvandrer.


Rosenfink



Rosenfink ved Fossum 21.05. 2005

Den første rosenfinken ble sett i hagen på Fossum 21.05. I noen uker deretter sang rosenfinker sporadisk ulike steder i området; på Fossum, langs med Lysakerelva og ved Listua. Noe senere hhv. 26 og 27 juni ble syngende rosenfink hørt nær Bogstadvannet ved Strømstad og Kråka.

Grankorsnebb






Grankorsnebb på Lathusåsen 26.03. 2005

Det var rikelig med granfrø i 2005 og grankorsnebb ble sett regelmessig på Lathusåsen i januar til april. I mai ble observasjonene mer sporadiske og etter det ble korsnebb bare sett én gang i juli og én gang i september.


Bokfink



Bokfink på Lathusåsen 14.05. 2005

Den første bokfinken ble sett i hagen på Fossum 21.03. Fra slutten av mars til begynnelsen av oktober ble bokfink observert alle dager. Bokfinken er en vanlig hekkefugl i hele området. På høsten oppholdt seg flokker med bokfink med innslag av bjørkefink på hogstfeltene på Lathusåsen.


Bjørkefink



Bjørkefink ved Fossum 10.04. 2005

Bjørkefink ble hovedsakelig observert i forbindelse med trekkperiodene i mars-april og september-oktober. Første observasjonen var 26.03. En bjørkefink ble sett ved føringsplassen i hagen ved to anledninger i desember.

Gulspurv






Gulspurv, Fossum 2004

Gulspurven opptrer i området hele året. På vinteren ser man sporadisk små flokker i kulturlandskapets randsone. På sommeren hekker den vanlig i samme biotop, men også på hogstfelt i skogen på Lathusåsen. Observasjonshyppigheten varierte gjennom året i 2005 og var høyest i mars-juli. I desember ble gulspurv bare sett én gang.


Sivspurv



Sivspurv, Hemsedal 30.06. 2005

Sivspurv ble først observert 17.04. Utover forsommeren ble sivspurv registrert flere ganger ved Bogstadvannet i området rundt Kråka og ved Fløtmyra, (bl.a. en syngende 30.05). Den kan ha hekket begge disse stedene. I tillegg hekket noen par i "deltaet" ved utløpet av Sørkedalselva i Bogstadvannet. Siste observasjonen ble gjort 06.07.


Gråspurv



Gråspurv på Fossum 09.10. 2004

Gråspurv ble observert alle uker i 2005. Observasjonsfrekvensen var høy det meste av året men noe lavere i januar-februar og august-september. Gråspurven hekket i de gamle gårdene og skolen på Fossum (Ankerveien) og på Listua. Den var også en vanlig gjest på fôringsplassen i hagen.

Pilfink





Pilfink, Fossum 28.11. 2004

Pilfinken var en av de mest hyppig observerte fuglene i 2005. Det skyldes at den oppholder seg ved bebyggelsen på Fossum hele året. Den hekker i fuglekasser, og under takstein på gamle hus, bl.a. på skolen i Ankerveien. Store flokker spiser i kornåkrene på høsten.

KOMMENTARER

Totalt ble det registrert 124 arter i området i 2005, dersom man regner svartkråke som en egen art. Dette er omtrent likt antallet som ble notert fra august 2000 – desember 2001 (123 arter)¹. I forhold til den foregående perioden manglet imidlertid sikre observasjoner av arter som smålom, toppdykker, kortnebbgås, lercefalk, fasan, trane, heilo, svartterne, spurveugle, duetrost, rødstjert, blåstrupe og kjernebiter i 2005. I stedet ble bergand, fjellvåk, vaktel, tjeld, grønnstilk, rødstilk, brushane, skogdue, tretåspett, svartkråke, ringtrost og varsler sett i 2005. Disse forskjellene skyldes trolig mest tilfeldigheter, siden de fleste av disse artene bare ble observert én eller noen få ganger. Et unntak er kanskje grønnstilk, som ikke ble sett i 2000-2001, men som kanskje hekket ved Bogstadvannet i 2005, og vaktel som ble hørt flere ganger i 2005. Den har blitt vanligere i området de siste årene. Kjernebiter som ble sett én gang på Fossum i 2001 holder til noen km lengre mot vest rundt Nordby og Ila og ble også sett der i 2005. Lercefalk som ble observert ved utløpet av Bogstadvannet i juni 2001 holdt også til i området mellom Kråka og Fossum sag på vestsiden av Bogstadvannet sommeren 2004. Jeg tror jeg så den her også i 2005, men observasjonen er usikker.

Observasjonsfrekvensen for de femti oftest observerte artene i 2005 er vist i figur 1. Antallet observasjonsdager var 208 i 2005. Det er omtrent samme som ved tilsvarende undersøkelse i 2001 (220 observasjonsdager). Fordelingen av disse dagene over året var også omtrent den samme, d.v.s. med flest dager (5-7) per uke fra mars-september og færre (oftest to) i november-februar. Observasjonsfrekvensene for det to årene bør derfor kunne sammenliknes for å identifisere arter som var mer eller mindre vanlige i 2005 enn fire år tidligere. Frekvensen, er beregnet som prosentandelen av det totale antallet observasjonsdager som en art er registrert. Det fremgår av figur 1 at pilfink, skjære og kjøttmeis ble sett over 95 % av observasjonsdagene. De arter som viste størst endring i observasjonsfrekvens fra 2001 til 2005 er sammenstilt i tabell 1 og 2. Bland artene som viste markert større observasjonsfrekvens i 2005 enn i 2001 var flere meiser (spettmeis, granmeis og toppmeis). Årsaken til dette var trolig at jeg i 2005 hadde etablert en fôringsplass på Lathusåsen som ble frekventert av fremfor alt meiser og dompap i januar-mars og i

¹ Bydue er ikke medregnet


desember 2005. Det er vel tvilsomt hvorvidt fôringen bidro til å øke bestanden av meiser i skogen, men de ble lettere å observere.

Den største endringen i observasjonsfrekvens var for gråspurv, som økte fra 14 % i 2001 til 90 % i 2005. Årsaken er at gråspurven de siste årene har etablert seg som hekkefugl ved bebyggelsen i Ankerveien på Fossum. I 2001 var den bare en sporadisk besøker på fôringsplassen i hagen.



Lerkefalk ved Kråka, juli 2004.

Gråmåke ble observert gjennom hele året i 2005. I 2001 ble det gjort færre observasjoner på vinteren og av en eller annen grunn heller ingen i september-oktober. Grønnspekk ble registrert omtrent dobbelt så ofte i 2005 som i 2001. Dette skyldes fremfor alt høyere observasjonsfrekvens i april-mai og kan tyde på flere hekkende par i nærheten. Tornskaten viste også en økning i forhold til 2001. Den hadde allerede da begynt å hekke på hogstfelter i skogen, men det er trolig at bestanden har økt noe de siste årene. Omtrent en dobling av observasjonene av trepiplerke tyder på at også den var vanligere i 2005. Den økede observasjonsfrekvensen for skogsnipe, strandsnipe og enkeltbekkasin er vanskelig å forklare. Alle artene holdt til på de samme lokalene i 2001 som i 2005 og disse ble besøkt omtrent like regelmessig begge årene. Krikkand var klart vanligere i området i 2005 enn i 2001, med flere registreringer på sommeren og konstatert hekking i Fløtmyra. I 2001 ble krikker bare sett i Bogstadvannet i trekkperiodene, vår og høst.



Figur 1. De 50 hyppigst observerte fuglene i 2005. Skalaen angir hvor mange % av det totale antallet observasjonsdager som hver art er registrert.

Den kraftige økningen i observasjonsfrekvens av storskarv gjenspeiler at den i de siste årene har fått fast tilhold i Bogstadvannet i sommerhalvåret. I 2001 var det kun én individ som hold til der noen uker i mai-juni. I 2005 ble mellom to og seks storskarver sett i Bogstadvannet nesten hver dag fra juni til november.

Tabell 1. Arter med høyere observasjonsfrekvens i 2005 enn i 2001

Art	Observasjonsfrekvens (%)	
	2001	2005
Gråmåke	41.8	67.8
Kaie	28.6	37.0
Spettmeis	26.4	53.8
Strandsnipe	22.3	33.7
Granmeis	20.5	35.1
Nøttekråke	20.5	31.3
Gråspurv	14.1	89.5
Grønnspekk	12.7	24.5
Tornskate	9.5	15.9
Trepiplerke	7.3	13.5
Skogsnipe	6.6	18.3
Krikkand	5.9	16.3
Storskarv	5.9	44.7
Grankorsnebb	5.5	17.8
Toppmeis	5.0	24.5
Enkeltbekkasin	3.6	11.1
Gransanger	3.6	12.0
Svartmeis	3.2	26.0
Vipe	3.2	23.1
Sidensvans	1.4	4.8
Dverglo	0.9	7.7
Stjertmeis	0.5	3.4
Grønnstilk	0.0	6.7

Tabell 2. Arter med lavere observasjonsfrekvens i 2005 enn i 2001


Art	Observasjonsfrekvens (%)	
	2001	2005
Gulspurv	90.0	72.6
Fiskemåke	68.6	55.3
Dompap	60.9	41.8
Laksand	32.3	20.2
Gråsisik	27.3	9.6
Grågås	23.2	6.7
Makrellterne	21.8	7.2
Canadagås	20.9	13.0
Grå fluesnapper	20.5	8.7
Buskskvett	16.4	1.4
Hønsehauk	9.5	2.9
Gulerle	7.3	2.9
Myrsanger	6.8	1.9
Rødstjert	2.7	0

Grankorsnebben er avhengig av tilgangen på grankongler, og hadde et bra år i 2005 med trolig hekking på Lathusåsen. Vipen ble sett betydelig oftere i 2005 enn i 2001. Det har sammenheng med at den hekket på jorden sør for Haugen i 2005. Den er vanligere litt lengre mot sørvest ved Dæli, hvor flere par pleier å oppholde seg, og i 2001 ble det bare gjort sporadiske observasjoner av disse når de kom innenfor observasjonsområdet på sommeren. Også dverglo ble sett oftere i 2005. De fleste observasjonene var i den indre, norvestre bukten av Bogstadvannet, som bør kunne være en egnet hekkingslokalitet. Det ble imidlertid trolig ingen hekking p.g.a. høy vannstand i juni. Det så også ut til å kunne bli hekking av grønnstilk samme sted og grønnstilk ble sett flere ganger i 2005, mens den ikke ble observert i 2001. Den høyere observasjonsfrekvensen av stjertmeis skyldes at den hekket nær Fløtmyra i 2005, og at en familjegruppe dro rundt i området på sommeren-høsten.

Arter som ble observert mindre hyppig i 2005 enn i 2001 er fremstilt i tabell 2. Årsaken til lavere observasjonsfrekvens av gulspurv i 2005 ser ut til å være færre observasjoner i september og desember sammenlignet med i 2001. I hekkingsperioden ble gulspurv sett stort sett hver dag begge årene. Fiskemåken hekket i Bogstadvannet begge årene, men det ser ut til at de forlot området tidligere på høsten i 2005 enn i 2001. Også laksand hekket i Bogstadvannet begge årene. Årsaken til færre observasjoner i 2005 kan ha vært at de oppholdt seg mer i den delen av vannet som ikke kunne observeres fra den vestre stranden. Makrellterne som hadde fast tilhold i Bogstadvannet i mai-august 2001, ble sett betydelig mer sporadisk i 2005. Det var også færre besøk av grågås og canadagås. Buskskvett, som hekket mellom tømmerlageret og Gryta i 2001, ble bare observert noen få ganger på trekk i 2005. Myrsangeren som sang i samme område begge årene oppholdt seg der betydelig lengre i 2001 enn i 2005. Hønsehauken hekket ikke i eller nær observasjonsområdet i 2006, og ble derfor sett mer sjelden enn i 2001 da noen ungfugler dro rundt i området vest for Bogstadvannet på sommeren. I rapporten av observasjonene i 200-2001

ble det påpekt at rødstjert ble sett sjelden i forhold til hva som var vanlig tidligere. Det ser ut til at tendensen har fortsatt, og i 2005 ble ingen observasjoner av rødstjert gjort.

Varisjonen gjennom året i antall arter registrert for hver observasjonsdag er fremstilt i figur 2. Fra januar-mars var antallet arter som regel mellom seks og tolv. Fra slutten av mars øket antallet raskt til over 50 arter i midten av mai. Fra begynnelsen av juli sank antallet observerte arter jevnt utover til i desember. Utviklingen ligner meget på den i 2001, men da ble det observert noe fler arter i de første månedene og økningen i antallet registrerte arter på våren begynte noe tidligere.



Figur 2. Antall arter registrert per observasjonsdag i 2005